



دیجیتالیزه شده است

جناب آقای مهرزاد حمیدی

معاون محترم تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

جناب آقای دکتر مهدی جمالی نژاد

رئیس محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور

جناب آقای دکتر احمدی

مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جناب آقای محمد رضا جاوید

مدیر عامل محترم شرکت سهامی خاص سلامت الکترونیک مبین ایرانیان


جناب آقای مهندس باقرزاده

مدیر عامل محترم انجمن مدیران آموزشگاه اصناف

موضوع: ابلاغ پرتوکل فاصله گذاری اجتماعی در آموزشگاه های کنکور

با سلام و احترام

به پیوست راهنمای گام دوم کووید-۱۹ (ویروس) فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در آموزشگاه های علمی کنکور، فنی، حرفه ای، هنری و اصناف جهت استحضار ارسال می گردد. لذا رعایت بهداشتی مفاد راهنمای فوق به منظور جلوگیری از اشاعه بیماری کووید ۱۹ (کرونا ویروس) در کشور مورد انتظار می باشد.

دکتر علیرضا رئیسی
معاون بهداشت


رونوشت:

جناب آقای حسین ذوالقدری معاون محترم امنیتی و انتظامی و رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا وزارت کشور
 جناب آقای دکتر جمشیدی مشاور محترم وزیر در امور داروئی و دبیر ستاد تدبیر و پزوه وزارت بهداشت
 رئیس محترم دانشگاه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ... با سلام جهت نظرات مستمر
 جناب آقای حاجی علی صراف مسئول شبکه پیام دولت



^{۱۹} راهنمای کام دوم مبارزه با کرونا ویروس، فاصله‌گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در آموزشگاه‌های کنکور، زبان، فنی، هنری و اصافی

فہرست

۱	مقدمه
۲	دامنه کاربرد
۳	فاصله‌گذاری اجتماعی
۴	غربال‌گری، مراقبت و بازتوانی.
۵	۱. غربال‌گری شاغلین در همه‌گیری کووید-۱۹.
۶	۲. مراقبت از گروه‌های آسیب‌پذیر.
۷	۳. بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید-۱۹.
۸	۴. اقدامات کنترلی سلامت محیط و کار.
۹	۵. بهداشت و حفاظت فردی
۱۰	۶. بهداشت مواد غذایی
۱۱	۷. بهداشت ابزار و تجهیزات
۱۲	۸. بهداشت ساختمان
۱۳	۹. آموزش بهداشت
۱۴	۱۰. پیوست ها
۱۵	پیوست ۱: فرم خوداظهاری فرد جهت شروع به کار و حضور در محل آزمون
۱۶	پیوست ۲: روش درست شستشوی دست‌ها
۱۷	پیوست ۳: پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی
۱۸	مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی (PPE) توصیه شده
۱۹	مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی (PPE) توصیه شده
۲۰	پیوست ۴: گندزداهای سطوح
۲۱	جدول ۱- راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم
۲۲	جدول ۲- راهنمای تهییه مواد گندزد
۲۳	پیوست ۵: نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس

مقدمه

شنا سایی راه‌های انتقال عامل ایجاد کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه‌های انتقال این ویروس هنوز به طور دقیق مشخص نشده است ولی به عنوان یک اصل کلی و طبق آخرین اطلاعات، انتقال ویروس‌های تنفسی از انسان به انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان در محیط می‌باشد. براساس دادسته‌های کنونی این بیماری از یک طیف ملایم تا شدید با علایمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می‌تواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجر به ذات‌الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. در صد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به طور دقیق مشخص نشده است.

این ویروس می‌تواند در فاصله ۱ تا ۲ متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دست‌ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآلات، نرده پله‌ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است که به طور عمومی و مشترک استفاده می‌شود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست را با آب و صابون شستشو گردد.

دامنه کاربرد

این راهنمای جهت پیشگیری و کنترل کووید-۱۹ (کرونا ویروس) در آموزشگاه‌های علمی کنکور، زبان، فنی، حرفه‌ای، هنری و اصناف بوده و سایر قوانین، آینه‌نامه‌ها، مقررات، دستورالعمل‌های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای به قوت خود باقی است.

فاصله‌گذاری اجتماعی

یکی از راه‌های کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصله گذاری اجتماعی است. از آنجا که بسیاری از شاغلین و فراغیران در معرض بیماری کووید ۱۹ هستند و آموزشگاه‌ها یکی از اماکن تجمع محسوب شده که می‌تواند سبب انتقال بیماری گردد، در این راستا لازم است موارد زیر رعایت شود:

- رعایت حداقل فاصله اینم ۱ متر بین فراغیران، کارکنان در تمامی مبادی ورودی، خروجی، راهروها، محوطه، سالن‌ها و کلاس
- از تجمع فراغیران و دانش آموزان، دانشجویان در مقابل در ورودی و خروجی و سایر فضاهای آموزشگاه‌ها جلوگیری شود.

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و الازمات سلامت محیط و کار در آموزشگاه‌های کنکور، زبان، فنی، هنری و اصناف

- استفاده از کانال‌های مجازی اختصاصی برای اطلاع رسانی در مورد برنامه‌های کلاسی و ارائه موارد لازم، بسیار کمک کننده می‌باشد.
- رعایت فاصله حداقل یک متری بین کابین‌های الکترونیک، نیمکت و صندلی‌های، میزهای کار فراغیران در صورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد، بایستی فاصله یک تا دو متر (حداقل یک متر) و حداقل زمان ممکن رعایت گردد.
- از تجمع افراد در محوطه، لابی، آبدارخانه و سایر مکان‌های عمومی اجتناب گردد.
- رعایت فاصله ۱ تا ۲ متر بین میز یا صندلی در کلاس‌های درس، راهروها و سایر محل‌هایی که برای آزمون پایان دوره در نظر گرفته شده ضروری است.
- در صورت امکان تشکیل کلاس‌ها با ظرفیت ۵۰ درصدی حضور فراغیران انجام گردد.

غربال‌گری، مراقبت و بازتوانی

۱. غربال‌گری شاغلین در همه‌گیری کووید-۱۹

لازم است براساس طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در زمان ثبت نام فراغیران و شروع به کار مدرسین، فعالیت‌های زیر انجام پذیرد:

- ۱- همه موظف‌های ستدن قبل از ورود به محل اشتغال (فراغیران، کارکنان، رانندگان سرویس و امثال‌هم) فرم خود اظهاری که مبنی بر عدم وجود علائم تنفسی مرتبط با کووید-۱۹ یا وجود تماس نزدیک با بیمار است برداشته تکمیل نمایند (پیوست شماره ۱).
- ۲- بررسی روزانه علائم شاغلین: در صورتی که شاغل دارای علامت باشد، می‌بایست علائم فرد در سامانه وزارت بهداشت به آدرس salamat.gov.ir ثبت گردد و در صورت وجود هشدار مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت، از ادامه فعالیت شاغل در محل کار ممانعت به عمل آید و در صورت عدم دسترسی به سامانه فوق فرد علامت دار جهت ارزیابی به مراکز خدمات جامع سلامت ارجاع داده می‌شود. در صورتی که نیاز به قرنطینه خانگی برای این شاغلین وجود داشت ارائه گواهی پزشک معالج به مدیر الزامی است. این افراد باید پروسه‌های مربوط به تشخیص، درمان، نقاوت و بازگشت به کار را طی کنند.

۲. مراقبت از گروه‌های آسیب‌پذیر

دو گروه زیر با گواهی پزشک معتمد، به عنوان افرادی که در معرض ابتلا به بیماری کووید-۱۹ عارضه دار قرار دارند، در نظر گرفته شده است:



معاونت بهداشت

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در آموزشگاه‌های کنکور، زبان، فنی، هنری و اصناف

گروه الف - بیماران با بیماری زمینه‌ای:

- بیماری قلبی - عروقی
- فشارخون
- دیابت
- بیماری‌های تنفسی زمینه‌ای
- $BMI > 40$

گروه ب - بیماران با نقص ایمنی:

- تحت درمان با کورتیکواستروئید بیش از ۱۲/۵mg پردنیزولون در روز بیش از دو هفته
- شیمی درمانی
- بدخیمی‌ها
- پیوند اعضاء

موارد زیر برای کارکنان شاغل در نظر گرفته شود:

۱- در صورت امکان، فعالیت‌های کارکنان اداری این افراد تا پایان همه‌گیری، به صورت دورکاری صورت پذیرد.

۲- در صورت عدم امکان دورکاری، شرایط محیط کار برای این افراد به گونه‌ای فراهم گردد که حداقل تماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کار به محیطی با شرایط تهویه مناسب‌تر و کم جمعیت‌تر می‌تواند کمک‌کننده باشد.

۳- کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم نمایند.

۳. بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید-۱۹

تمامی شاغلین احتمال ابتلا به بیماری کووید-۱۹ با لازم است پس از طی دوران درمان و نقاوت، جهت بازگشت به کار براساس آخرین نسخه "راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا به کووید-۱۹" ابلاغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی قرار گیرد.

اقدامات کنترلی سلامت محیط و کار

۱. بهداشت و حفاظت فردی

- از دست دادن، روپوسی و کلیه اعمالی که مستلزم تماس فیزیکی و نزدیک شدن افراد به کمتر از فاصله مجاز (۱متر) باشد، خودداری شود.

- راهنمای گام دوم مبارزه با کرونا ویروس (کرونا ویروس) فاصله گذاری اجتماعی و ازامات سلامت محیط و کار در آموزشگاه های کنکور، زبان، فنی، هنری و انسانی رعایت کلیه نکات بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک و شستشوی دست ها، استفاده از مواد ضد عفونی کننده مورد تایید وزارت بهداشت و گندزدایی سطوح مطابق با دستورالعمل های مربوطه از سوی وزارت بهداشت الزامی توسط کارکنان و فراغیران الزامی است.
- کلیه فراغیران ملزم به استفاده از لوازم تحریر و ابزار شخصی (خودکار، مداد، پاک کن، ماشین حساب، گچ، وايت برد، آلات موسیقی، قلم، مرکب، ابزار کار با چوب و مواردی نظیر آن) هستند. و رد و بدل کردن اشیا، وسائل بین فراغیران ممنوع است.
- برای ثبت حضور و غیاب کارکنان ترجیحاً از سیستم تشخیص چهره استفاده شود (در صورت وجود).
- مسئولیت حضور و غیاب فراغیران در کلاس بر عهده مدرسین می باشد، به طوری که از وسائل وابزار مشترک برای ثبت دفتری استفاده نشود.
- کارت ورود به جلسه آزمون ترجیحاً به صورت الکترونیکی صادر شود.
- توزيع سوالات امتحانی باید توسط افرادی که صحت سلامت آنها مورد تایید پزشک معتمد باشد انجام پذیرد.
- از قراردادن سوالات و پاسخ نامه بر روی زمین خودداری گردد.
- پرسنل تطبیق دهنده عکس کارت آزمون با فراغیران ضمن رعایت فاصله ایمن ملزم به استفاده از ماسک می باشند.
- دست اندرکاران آماده سازی، توزیع کننده و فروشندهان مواد غذایی در بین کارکنان و فراغیران ملزم به دریافت کارت بهداشت می باشند.
- شستشوی دست ها به صورت مکرر به مدت حداقل ۲۰ ثانیه با آب و صابون.
- استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه کردن (در صورتی که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید).
- از تماس دست ها با چشم، بینی و دهان جدا خودداری شود.

۲. بهداشت مواد غذایی

- میان وعده غذایی و یا پذیرایی در بین فراغیران و کارکنان به صورت بسته بندی شده تحويل گردد.
- امکان رد و بدل نوشیدنی و خوراکی بین فراغیر ممنوع است.
- استفاده از پارچ آب ولیوان در داخل کلاس و کارگاه ها ممنوع بوده و به هر فراغیر یک بطری آب آشامیدنی بسته بندی جهت مصرف تحويل گردد.

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و الازمات سلامت محیط و کار در آموزشگاه‌های کنکور، زبان، فنی، هنری و اصناف بوفه‌های عرضه کننده مواد غذایی مجاز به عرضه به صورت بسته بندی می‌باشند.(در صورت وجود)

۳. بهداشت ابزار و تجهیزان

- تمامی سطوح دارای تماس مشترک (نظیر دستگیره در ، میله راه پله ، میز ، صندلی ، نیمکت ، و سایل الکترونیک، پشتی صندلی ها، ابزار کار کارگاهی ، آلات موسیقی) باید پس از پایان هر کلاس ابتدا نظافت و سپس گندزدایی گردد.
- مواد ضد عفونی کننده دست، به تعداد کافی و در قسمت‌های مناسب (در ورودی، سرویس‌های بهداشتی، راهروها، آسانسورها و موارد نظیر آن) تعبیه گردد.
- دو مرحله نظافت (با مواد شوینده) و گندزدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچ گونه اختلاطی بین شوینده و گندزدا ایجاد گردد.
- محلول گندزدایی کلره باید روزانه تهیه گردد (کارایی آن پس از گذشت ۲۴ ساعت کاهش می‌یابد).
- گندزدا با آب سرد تهیه گردد.
- گندزدایی سطوح با دستمالی که تو سطح محلول گندزدا آغشته شده، برای سطوح انجام می‌شود. ابتدا دستمال خیس گردد و با فشردن آب اضافی آن گرفته و بر سطوح کشیده می‌شود.
- در نمازخانه از استفاده مشترک مهر، سجاده، تسبیح، چادر و نظایر آن اجتناب گردد. این لوازم باید به صورت شخصی مورد استفاده قرار گیرند.
- برای تماس با دکمه‌های آسانسور، از وسایل یکبار مصرف (گوش پاک کن، خلال دندان، دستمال کاغذی) استفاده شود.
- در صورت در اختیار گذاشتن سرویس ایاب و ذهاب برای فراغیران حداکثر افراد سرزنشین در خودرو به استثناء راننده ۳ نفر در نظر گرفته شود.

۴. بهداشت ساختمان

- تهییه مناسب هوا در محیط‌های بسته از فضاهای مورد استفاده برای آموزشگاه ، سرویس‌های بهداشتی، صورت پذیرد.
- گندزدایی تمامی فضاهای مورد استفاده در آموزشگاه‌ها، سرویس‌های بهداشتی بایستی قبل و بعد از آزمون طبق پروتکل‌های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت انجام شود.

راهنمای گام دوم مبارزه با کرونا ویروس (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و الازمات سلامت محیط و کار در آموزشگاه‌های کنکور، زبان، فنی، هنری و اصناف

- لازم است کلیه سرویس‌های بهداشتی مجهز به صابون مایع و دستمال کاغذی باشد.
- فضاهای عمومی باید دارای تهویه مناسب باشد بطوری که هوای تازه همیشه جریان داشته باشد (به عنوان مثال استفاده از تهویه طبیعی با بازکردن در و پنجره‌ها و تعویض مرتب هوای).

نکات مهم

- رعایت گندздایی و چگونگی استفاده از مواد گندزدا بايستی طبق پروتکل‌های وزارت بهداشت عمل شود.
- در نظر گرفتن فضایی مجزا برای قرنطینه افراد مشکوک به کرونا ویروس الزامی است.
- در صورت وجود افراد مشکوک به علائم مثبت و عدم تکمیل فرم خود اظهاری توسط نامبردهای جدا سازی افراد مذکور در فضای قرنطینه در محل آزمون الزامی می‌باشد.
- پرسنل خدماتی جهت انجام نظافت و گندздایی فضاها م مختلف از لباس و حفاظت فردی استفاده نمایند.

آموزش بهداشت

- آموزش به صورت مجازی (از جمله شبکه‌های مجازی، وب سایت‌ها)
- در صورتی که آموزش از مسیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق چهره به چهره با رعایت فاصله حداقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف بلامانع است.

رسانه‌های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف

- نصب استند و بنر‌های اطلاع رسانی
- نصب پوسترهاي آموزشی
- در صورت امکان، ارسال پیامک‌های آموزشی به گوشی‌های همراه
- در صورت امکان، ارسال پیام‌های آموزشی در گروه‌های مجازی مربوطه
- در صورت امکان، انتشار تیزر، اینفوگرافی یا موشن گرافی در فضای مجازی
- در صورت امکان، استفاده از صفحات نمایشی (LED) جهت پخش پیام‌ها و تصاویر آموزشی

موضوعات مورد آموزش برای گروه‌های هدف

راهنمای گام دوم بارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و ازامات سلامت محیط و کار در آموزشگاه‌های کنکور، زبان، فنی، هنری و اسناد

- آشنایی با علایم ابتلا به این ویروس
- شناسایی افراد مستعد ابتلا
- آشنایی با نحوه انتقال بیماری
- آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی
- آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح
- آموزش آشنایی با نحوه پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی
- آشنایی با نحوه صحیح دفع یا گندздایی کردن وسایل آموزش نکات بهداشت فردی
- توصیه ماندن در خانه
- روش‌های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل
- آموزش فاصله‌گذاری اجتماعی
- معرفی سامانه ۱۹۰ و سامانه ۴۰۳۰

نمونه فعالیت‌های آموزشی

- نصب استند یا بنرهای آموزشی برای بکارگیری تمهیدات لازم در جهت مقابله با شیوع کرونا ویروس در محل کار
- نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا
- نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دست‌ها در محل کار خصوصا سرویس‌های بهداشتی و محل سرو غذا
- آموزش نحوه استفاده از محلول ضدغوفونی کننده دست به شاغلین
- نصب پوستر مرتبط با بیماری و توصیه ماندن در خانه در صورت وجود علائم
- نصب تابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری‌های تنفسی به تعداد کافی در محل؛
- آموزش توصیه‌های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج
- آموزش اقدامات لازم جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان
- نصب بنرهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری‌های تنفسی
- نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
- نصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن، درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردی



راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و الازمات سلامت محیط و کار در آموزشگاه‌های کنکور، زبان، فنی، هنری و اسناد

وزارت بهداشت، پژوهش و توانمندی های سلامت

معاونت بهداشت

- نصب بتر غربالگری و بیماریابی در محل نگهداری و درب ورودی ساختمان
- نصب بتر ثبت نام و غربالگری در سامانه salamat.gov.ir
- بارگذاری پیام‌های بهداشتی بر روی سایت و شبکه‌های مجازی
- نصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره تلفن ۱۹۰ جهت اعلام موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور
- نصب پوستر معرفی سامانه ۴۰۳۰



راهنمای کام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و الازمات سلامت محیط و کار در آموزشگاه‌های کنکور، زبان، فنی، هنری و اسناد

پیوست ها

پیوست ۱: فرم خوداظهاری فرد جهت شروع به کار و حضور در محل آموزشگاه

اینجانب دارای کد ملی به شماره شاغل دارای عنوان

شغلی اظهار می‌نمایم:

۱- در سه روز اخیر علائم زیر را نداشته‌ام:

تب لرز سرفه تنگی نفس گلودرد بدن درد احساس خستگی و ضعف

درد یا احساس سنگینی در قفسه سینه

۲- سابقه تماس نزدیک (فاصله کمتر از ۲ متر) با فرد مبتلا به کووید-۱۹ (کرونا ویروس) در دو هفته

اخیر را نداشته‌ام:

- مراقبت مستقیم فردی از افراد خانواده بیمار مشکوک / محتمل / قطعی کووید-۱۹ نموده‌است

- هر گونه تماس شغلی با فرد مبتلا به کووید-۱۹ در فضای بسته مشترک (تماس بیش از ۱۵ دقیقه در

فاصله کمتر از ۲ متر)

- همسفر بودن با فرد مبتلا به کووید-۱۹ در وسیله نقلیه مشترک

۳- اطلاعات سلامت و علائم تنفسی خود را در سامانه salamat.gov.ir ثبت کرده‌ام

اینجانب به کد ملی تعهد می‌نمایم در صورت بروز هرگونه علائم تنفسی فوق، مراتب

را به کارفرما / نماینده معرفی شده از طرف کارفرما، اطلاع دهم و نیز گواهی می‌کنم مجدداً در سامانه

ثبت نام نمایم و پاسخ کلیه پرسش‌ها را با هوشیاری، دقت و صداقت ثبت نموده‌ام و salamat.gov.ir

هرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خلاف واقع، به‌عهده اینجانب می‌باشد.

امضا

تاریخ

نام و نام خانوادگی



راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و ازایات سلامت محیط و کار در آموزشگاه‌های کنکور، زبان، فنی، هنری و انسانی

پیوست ۲: روش درست شستشوی دست‌ها


دست‌ها باید با آب گرم و صابون به مدت ۲۰ ثانیه به روش زیر شسته شوند:

- ۱- دست‌ها را مرطوب کنید.
- ۲- از صابون مایع استفاده کنید.
- ۳- کف دست‌ها را خوب به هم بمالید.
- ۴- انگشتان را بشوئید.
- ۵- مج‌ها را بشوئید.
- ۶- بین انگشتان را بشوئید.
- ۷- آبکشی کنید.
- ۸- با دستمال کاغذی خشک کنید (استفاده از حوله یکبار مصرف نیز مورد تایید است)
- ۹- شیر آب را با همان دستمال ببندید
- ۱۰- دستمال را در سطل زباله دردار بیندازید.

بررسی کارکرد
دست بسته باون میگیری

معافت بهداشت

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله گذاری اجتماعی و اجرامات سلامت محیط و کار در آموزشگاه های کنکور، زبان، فن، هنری و اسناد




تمددیت های را تحریک میکنیم گوشیده و پنهان
آن های را هم بموسی کنیم

دست بسته میباشد از پوست
دست بسته
کنکور و اسناد


دست بسته میباشد از پوست
دست بسته
ترکیبی هایی هست

روشی درست شستن دست ها


دست بسته




آن های درست های را هم بموسی کنیم



تمددیت های را هم بموسی کنیم




تمددیت های را هم بموسی کنیم




تمددیت های را هم بموسی کنیم
کنکور و اسناد




تمددیت های را هم بموسی کنیم




تمددیت های را هم بموسی کنیم



تمددیت های را هم بموسی کنیم



تمددیت های را هم بموسی کنیم



تمددیت های را هم بموسی کنیم


راهنمای گام دوم مبارزه با کرونا ویروس (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و ازامات سلامت محیط و کار در آموزشگاه‌های کنکور، زبان، فنی، هنری و اسناد

پیوست ۳: پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی

مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی (PPE) توصیه شده


نوع PPE استفاده شده بسته به سطح پیشگیری در عفونت‌های استاندارد، تماسی، قطره‌ای و هوابرد بسیار متنوع است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع از این وسایل باید به افراد آموزش داده شود.

۱. روپوش



- تنہ را از گردن تا زانوها، بازوها را تا انتهای مج دستان بپوشاند و دور کمر پیچاندہ شود.
- در پشت گردن و کمر گره میخورد.


۲. ماسک یا رسپیراتور



- اتصالات ایمنی یا نوارهای الاستیک در وسط سر و گردن قرار دهید.
- باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید.
- صورت و زیر چانه را به طور مناسب پوشش دهید.

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و ازایات سلامت محیط و کار در آموزشگاه‌های کنکور، زبان، فنی، هنری و اسناد


۳. عینک یا شیلد صورت



روی صورت و چشم‌ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.

•

۴. دستکش‌ها



تا روی مج را کامل بپوشاند که تا روی مج بند روپوش هم ادامه داشته باشد.

•

❖ استفاده از روش‌های کار ایمن برای محافظت از خود و محدود کردن انتشار آلودگی:

- دست‌ها را از چهره خود دور نگهدارید.
- با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید.
- دستکش‌ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنید.
- بهداشت دست را رعایت کنید.


راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و ازامات سلامت محیط و کار در آموزشگاه‌های کنکور، زبان، فنی، هنری و اسناف

مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی (PPE) توصیه شده

روش‌های مختلفی برای درآوردن ایمن PPE بدون آلوده کردن لباس، پوست یا غشاها مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. در اینجا یک مثال آورده شده است. قبل از خارج شدن از اتاق بیمار، تمام وسایل حفاظت فردی، به جز ماسک اگر استفاده شده است، درآورید. ماسک را بعد از ترک اتاق بیمار و بستن درب، از صورت خود خارج کنید.

PPE را به ترتیب مراحل زیر درآورید:

۱) دستکش



- اگر دستان شما هنگام درآوردن دستکش آلوده شده‌اند، بلا فاصله دستان خود را بشویید یا از یک ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.
- با استفاده از یک دست دستکش دار، قسمت کف دست دیگر را بگیرید و دستکش اول را از دست خارج کنید.
- دستکش درآورده شده را با دستکش نگه دارید. (شکل اول از سمت چپ)
- انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در میان دست ببرید و دستکش دوم را نیز خارج کنید. (شکل وسط)
- دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید.

۲) عینک یا شیلد صورت



- سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است.




 وزارت بهداشت، پرورش و توانمندی اجتماعی
 معاونت بهداشت

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و ازامات سلامت محیط و کار در آموزشگاه‌های کنکور، زبان، فنی، هنری و اسناد


- اگر دست شما در حین درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست‌های خود را بلافارسله بشویید و از یک ضدغونی کننده دست استفاده کنید.
- با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید.
- اگر وسیله قابل استفاده مجدد است، در مخزن مشخص شده برای بازیافت مجدد قرار دهید. در غیر این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

۳) روپوش



- اگر دست‌هایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده شده است، فوراً دستان خود را بشویید و از ضدغونی کننده دست استفاده کنید.
- بندھای روپوش را باز کنید و مراقب باشید که آستین‌ها هنگام رسیدن به بندھا با بدنه شما تماس نداشته باشد.
- روپوش را از گردن و شانه‌ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لمس کنید.
- روپوش را وارونه به‌طوری که داخل آن رو به بیرون باشد جمع کنید.
- به صورت فشرده شده و تاشده داخل ظرف زباله قرار دهید.

۴) ماسک



- قسمت جلوی ماسک آلوده است - دست نزنید.
- اگر در حین برداشتن ماسک، دستان شما آلوده شد، دست‌های خود را بلافارسله بشویید و از یک ضدغونی کننده دست استفاده کنید.




راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و ازامات سلامت محیط و کار در آموزشگاه‌های کنکور، زبان، فنی، هنری و اسناد

- ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای بالایی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن را از صورت جدا کنید.

- ماسک را در یک ظرف زباله دردار قرار دهید.

(۵) روپوش و دستکش




- اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، بلافضله دستان خود را با ضدعفونی کننده دست حاوی الکل بشویید.

- جلوی روپوش را بگیرید و از بدنه دور کنید تا بندها جدا شوند و فقط با دستان دستکش دار خارج روپوش را لمس کنید.

هنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و به صورت یک بسته فشرده کنید.

- همانطور که لباس را درمی‌آورید، به طور همزمان دستکش را نیز درآوردید. فقط قسمت داخلی دستکش و روپوش را با دست بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دستکش را درون یک ظرف زباله قرار دهید.
- بلافاصله بعد از درآوردن همه وسائل حفاظت فردی، دست‌ها را بشویید یا از یک ضدعفونی کننده الکلی استفاده کنید.



راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و ازمامات سلامت محیط و کار در آموزشگاه‌های کنکور، زبان، فنی، هنری و اسناف

پیوست ۴: گندزدایی سطوح

<p>از یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلر یا بر پایه الکل استفاده کنید.</p> <p>از پاشیدن و ریختن محلول‌های گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برق‌دار و مواد ناسازگار و با احتمال انفجار و آتش‌سوزی اجتناب شود.</p> <p>از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید. زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها ۱۰ تا ۶۰ دقیقه رعایت گردد.</p>	<p>نکات عمومی</p>
<p>۱. مواد گندزدا و ضدغوفونی بر پایه الکل دارای مجوز</p> <p>۲. مواد گندزدا و ضدغوفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم</p> <p>۳. مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن</p> <p>۴. سفیدکننده</p>	<p>مواد گندزدا</p>
<p>۱. الکل برای از بین بردن ویروس‌ها موثر است. اتیل الکل ۷۰ درصد یک میکروب کش با طیف گسترده است و به طور کلی از الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک (به عنوان مثال درپوش لاستیکی و یال‌های دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها) و گاهی سطوح خارجی تجهیزات (مثل استتوسکوب و ونتیلاتورها) استفاده می‌شود.</p> <p>۲. بهدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می‌گردد.</p> <p>۳. استفاده مکرر و طولانی از الکل به عنوان گندزدا می‌تواند باعث تغییر رنگ، تورم، سخت‌شدن و ترک‌خوردگی لاستیک و پلاستیک‌های خاص شود.</p> <p>۴. هنگام گندزدایی و نظافت، سالن‌ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجره‌ها باز گذاشته شوند و جهت تهویه بهتر است هوکش نیز روشن باشد.</p> <p>۵. در هنگام گندزدایی ملاحظات لازم به منظور جلوگیری از خطر برق‌گرفتگی در نظر گرفته شود.</p> <p>۶. گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.</p> <p>۷. محلول‌های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود (کارایی محلول پس از گذشت ۲۴ ساعت کاهش می‌یابد).</p>	<p>نکات مهم در خصوص مواد گندزدا و ضدغوفونی بر پایه الکل دارای مجوز</p>

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محيط و کار در آموزشگاه‌های کنکور، زبان، فنی، هنری و اسناد

۸. امکانات لازم برای شستشوی مرتب دست‌ها و استفاده از ماسک یکباره مصرف در طول شیفت (به ازاء هر شیفت حداقل ۲ ماسک) و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید فراهم شود.

نکات مهم در خصوص سفیدکننده ۱. گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفلوانزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلتی، غیر فعال می‌شود.

۲. گندزدایی سفیدکننده‌های خانگی (با ۱۰ تا ۶۰ دقیقه زمان تماس)، با هزینه کم و به‌طور گستردگی در دسترس است و برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می‌شود.

۳. با این حال سفیدکننده‌ها غشای‌های مخاطی، پوست و مجرای تنفسی را تحریک می‌کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه می‌شوند و به‌راحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان می‌دهند. بنابر این سفیدکننده‌ها باید با احتیاط مصرف گردد.

۴. استفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق‌سازی توصیه شده (قوی‌تر و ضعیف‌تر) می‌تواند اثرات آن را برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب‌دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.

۵. برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق شده رعایت موارد زیر ضروری است:

- استفاده از ماسک، پیش‌بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظت از چشم در برابر پاشیدن توصیه می‌شود.
- محلول‌های سفیدکننده در محل‌های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.

- سفیدکننده با آب سرد مخلوط گردد (آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می‌گردد و آن را ناکارآمد می‌نماید)

- از به کار بردن سفیدکننده‌ها به همراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش داده و می‌تواند باعث واکنش‌های شیمیایی خطیرناک شود. به عنوان مثال گازهای سمی در هنگام مخلوط کردن سفیدکننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی که برای تمیز کردن توالت استفاده می‌شود، تولید می‌گردد و این گاز می‌تواند باعث مرگ یا جراحت گردد. در صورت لزوم ابتدا از مواد

راهنمایی گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در آموزشگاه‌های کنکور، زبان، فنی، هنری و اسناد و

شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده از سفیدکننده برای

گندزدایی، کاملاً با آب بشویید.

سفیدکننده‌ها موجب خوردگی در فلزات می‌گردند و به سطوح

رنگ شده صدمه می‌زنند.

- از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفیدکننده به چشم وارد

گردد بالا فاصله باید به مدت ۱۵ دقیقه با آب شسته و با یک پزشک

مشورت گردد.

- سفیدکننده رقیق شده وقتی در معرض نور خور شید قرار می‌گیرد

گاز سمی آزاد می‌نماید؛ بنابراین سفیدکننده‌ها باید در مکان خنک و

دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

- هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می‌شود برای اطمینان از

اثربخشی آن از سفیدکننده‌هایی که اخیراً تولید شده خریداری نموده

و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

- اگر از سفیدکننده رقیق استفاده کنید محلول رقیق شده را روزانه و

تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ رقیق‌سازی قید شود و

محلول‌های تهیه شده بلا استفاده را بعد از ۲۴ ساعت دور بریزید. مواد

آلی موجب غیرفعال شدن سفیدکننده‌ها می‌گردد، بنابراین ابتدا سطوح

آغشته به مواد آلی باید تمیز شده و قبل از گندزدایی با ماده

سفیدکننده عاری از مواد آلی گردد.

- سفیدکننده رقیق شده را باید دور از نور خورشید و در صورت امکان

در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و ازامات سلامت محیط و کار در آموزشگاه‌های کنکور، زبان، فنی، هنری و اسناف

جدول ۱ - راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم

محلول اولیه: عمدۀ محلول‌های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم ۵ درصد معادل (PPM) ۵۰۰۰۰ کلر قابل دسترس

محلول تو صیه شده: محلول ۱:۱۰۰ از هیپوکلریت سدیم ۵ درصد تو صیه می‌شود استفاده از ۱ قسمت سفیدکننده به ۹۹ قسمت آب سرد لوله‌کشی (محلول ۱:۱۰۰ برای گندزدایی سطوح) برای دستیابی به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید. به عنوان مثال، برای آماده‌سازی سفیدکننده‌های حاوی ۲/۵ درصد هیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیدکننده استفاده کنید (یعنی ۲ قسمت سفیدکننده به ۹۸ قسمت آب)

کلر قابل دسترس بعد از رقيق‌سازی: برای سفیدکننده حاوی ۵ درصد هیپوکلریت سدیم یک محلول ۱:۱۰۰، کلر قابل دسترس در حدود ۰/۰۵ درصد یا ۵۰۰ پی ام خواهد بود

محلول‌های سفیدکننده شامل غلظت‌های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقدار متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت موردنظر حاصل گردد

زمان تماس برای کاربردهای متفاوت:

- سطوح غیرمتخلخل: بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می‌گردد
- گندزدایی از طریق غوطه‌ورکردن اقلام: زمان تماس ۳۰ دقیقه توصیه می‌شود (برای تی‌ها، دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن)

نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانند تمیزکردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات بدن قبل از گندزدایی یا غوطه‌وری)

جدول ۲ - راهنمای تهیه مواد گندزدایی

غلظت مورد نیاز	گندزدایی در دسترس	نسبت گندزدا به آب سرد
کلر قابل دسترسی ۵۰۰ پی ام یا ۰/۰۵ درصد	آب ژاول ۵ درصد (۵۰۰۰۰ پی ام کلر قابل دسترس دارد)	۱ واحد گندزدا ۹۹ واحد آب سرد

- ✓ هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را در سطل زباله بیندازید؛



- ✓ اگر علائم سرماخوردگی دارد در منزل استراحت کنید؛
- ✓ ویروس‌ها در هوای سرد و خشک انتقال سریع‌تری دارند و باید هوای محیط مرطوب نگهداشته شود؛
- ✓ سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید را گندزدایی نمایید؛




- ✓ سیستم ایمنی خود را با مصرف میوه و سبزیجات تازه تقویت نمایید؛




- ✓ به اطرافیان خود آموزش دهید؛

پیوست ۵: نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس


- ✓ قبل از خوردن و آشامیدن دست‌های خود را تا بالای مج به مدت حداقل ۲۰ ثانیه با آب و صابون مایع بشویید و در صورت عدم دسترسی به آب سالم از مواد ضد عفونی‌کننده بر پایه الکل استفاده نمایید؛



- ✓ از تماس با افرادی که مريض هستند خودداری کنید. از روبوسی و دستدادن با افراد دیگر بپرهیزید (فاصله ۱ تا ۲ متر از افراد بیمار حفظ شود)؛



- ✓ افراد بیمار و مشکوک حتماً از ماسک استفاده نمایند؛



- ✓ از دست‌زنن به چشم، بینی و دهان خودداری کنید؛

