

آیا میدانستید با عضویت در سایت جزوه بان میتوانید به صورت رایگان جزوایات و نمونه

سوالات دانشگاهی را دانلود کنید؟؟

فقط کافه روی لینک زیر ضربه بزنید

ورود به سایت جزوه بان

[Jozveban.ir](http://Jozveban.ir)

[telegram.me/jozveban](http://telegram.me/jozveban)

[sapp.ir/sopnuu](http://sapp.ir/sopnuu)

جزوات و نمونه سوالات پیام نور



@sopnuu

jozveban.ir

**98-99-1**



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- اولین درمانگاه روانشناسی جهت درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی تاسیس شد؟

۴. ویتمر

۳. بنیامین راش

۲. استانلی هال

۱. آلفرد بینه

۲- در کدامیک از دیدگاه های زیر، بهنجاری نتیجه نهایی سیستم های متعامل است؟

۲. بهنجاری به منزله کمال مطلوب

۱. بهنجاری به منزله فرایند رفتار

۴. بهنجاری به منزله سازش با توقعات خود و جهان بیرون

۳. بهنجاری به منزله سلامت

۳- در کدامیک از رویکردهای زیر، مفاهیم همچون اضطراب، ناخودآگاه، مکانیزم های دفاعی روانی و مراحل رشد روانی جنسی از مفاهیم کلیدی محسوب می شود؟

۴. الگوی زیست شناختی

۳. الگوی یادگیری

۲. الگوی شناختی

۱. الگوی روان پویایی

۴- نخستین و بنیادی ترین گام برای اجرای یک فرمول بندی دقیق از سنجش و ارزیابی اختلالات روانی کودکان چیست؟

۲. پیش آگهی و تعیین یک برنامه درمانی

۱. مشاهده رفتارهای فرد

۴. تداخل در فعالیت فردی و اجتماعی

۳. توانایی در اجرای یک مصاحبه بالینی

۵- کدام گزینه از ابزارهای نسبتاً گویا و فراغیر است که جهت ارزیابی کودکان با مشکلات خاص یادگیری کاربرد فراوان دارد؟

۲. آزمون روانی شناختی و کسلر

۱. آزمون هوش ریون

۴. آزمون پیشرفته تحصیلی

۳. آزمون هوش آفرد بینه

۶- کدامیک از اصل های زیر را می توان به سه درجه اتفاقی، گذرا و پایدار تقسیم بندی نمود؟

۴. اصل تداعی یک رفتار

۳. اصل شدت یک رفتار

۲. اصل فراوانی یک رفتار

۱. اصل شایستگی سنی

۷- بر اساس نظریه پیازه، کودکان در چه دوره ای در مرحله حسی - حرکتی به سر می بردند؟

۲. دوران شیرخوارگی و کودکی اول

۱. کودکی دوم

۴. کودکی سوم

۳. دوران بلوغ

۸- تاخیر در کدام شاخص زیر در اختلال رشد هماهنگی دیده نمی شود؟

۴. راه رفتن

۳. تکلم

۲. خزیدن

۱. نشستن

۹- درمان اختلال رشد هماهنگی عموماً ترکیبی از چه برنامه هایی می باشد؟

۲. کاردمانی به همراه آموزش اجتماعی

۱. برنامه های آموزش ادراکی، هیجانی و رفتاری

۴. گروه درمانی و آموزش های مهارتی

۳. برنامه های آموزش جسمانی و حسی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۰- کدام گزینه از علل زمینه‌ای اختلال در زبان بیانی در نظر گرفته می‌شوند؟

- ۱. صدمات ظریف مغزی و تاخیر در بالیدگی مغز
- ۲. فشار زبان و مشکلات کاربردی آن
- ۳. صدمات ارگانیکی و ساختاری
- ۴. آپراکسی گفتار

۱۱- کدام گزینه از ویژگی‌های اوتیسم می‌باشد؟

- ۱. این اشکال پس از یک دوره رشد عادی و در نتیجه یک بیماری عصبی یا جسمانی رخ می‌دهد
- ۲. این کودکان در تعامل اجتماعی، ارتباط دوطرفه و بازیهای سمبولیک و خلاق مشکل دارند
- ۳. کودکان دارای اختلال دیرتر از همسالانشان زبان باز می‌کنند
- ۴. مهمترین ویژگی بالینی در این افراد اشکال اساسی در درک و در بیان زبان است

۱۲- شیوع لکنت زبان در طول زندگی همه افراد حدود چند درصد می‌باشد؟

- |        |         |          |        |
|--------|---------|----------|--------|
| ۵٪ . ۴ | ۱۰٪ . ۳ | ۲.۵٪ . ۲ | ۱٪ . ۱ |
|--------|---------|----------|--------|

۱۳- کدام گزینه از جمله اختلالات تغذیه و خوردن است که در دوره رشد آغاز می‌شود؟

- ۱. نشخوارگری
- ۲. بی‌اشتهاایی روانی
- ۳. پرخوری
- ۴. اختلال خوردن نامعین

۱۴- اختلال هرزه خواری معمولاً بین چه سنینی شروع می‌شود؟

- |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ۴. ۱۸_۳۶ ماهگی | ۳. ۱۲_۳۶ ماهگی | ۲. ۱۲_۲۴ ماهگی | ۱. ۲۴_۴۸ ماهگی |
|----------------|----------------|----------------|----------------|

۱۵- کدام روش درمانی بعنوان موثرترین روش درمانی در موقع پرخوری شناخته می‌شود؟

- ۱. درمانهای روانشنختی
- ۲. درمانهای دارویی
- ۳. روان درمانی پویشی
- ۴. خانواده درمانی

۱۶- در کدامیک از انواع نارسایی‌های یادگیری مبتلایان به آن از نظر بهره هوشی، حافظه فعال و واژگان بهتر از متوسط عمل می‌کنند؟

- ۱. خوانش پریشی
- ۲. نارسایی زبان بیانی
- ۳. نارسایی ویژه ریاضی
- ۴. نارسایی‌های ارتباطی

۱۷- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولاً بین چه سنینی اتفاق می‌افتد؟

- |               |              |              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ۴. ۸_۱۰ سالگی | ۳. ۳_۵ سالگی | ۲. ۲_۷ سالگی | ۱. ۶_۸ سالگی |
|---------------|--------------|--------------|--------------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۸- پژوهش های پس از مرگ بر روی مغز مبتلایان به دیسلکسی، ناهنجاری در کدام ناحیه از مغز را نشان می دهد؟

۲. لوب گیجگاهی فوقانی

۱. مغز پسین نیمکره چپ

۴. بخش آهیانه ای - گیجگاهی

۳. لوب گیجگاهی میانی

۱۹- برای تشخیص اختلال بی اختیاری ادرار، دفع ادرار باید به چه صورت اتفاق بیفتد؟

۲. حداقل سه بار در هفته به مدت لااقل یک ماه

۱. حداقل یکبار در هفته به مدت دو ماه

۴. حداقل دوبار در هفته به مدت لااقل سه ماه

۳. حداقل دوبار در هفته به مدت دو ماه

۲۰- گزینه صحیح را مشخص کنید؟

۱. بی اختیاری مدفوع اولیه زمانی رخ می دهد که کودک حداقل شش ماه توانسته باشد مدفوعش را کنترل کند

۲. بی اختیاری ادراری ثانویه عمدتاً با تاخیر بلوغ و وزن پایین زمان تولد همراه است

۳. حدود نیمی از کسانی که دچار بی اختیاری مدفوع هستند، بی اختیاری ادرار را نیز نشان می دهند

۴. بر اساس مطالعات همه گیر شناسی مشخص شده که در سن ۵ سالگی شیوع بی اختیاری ادراری در پسران دو برابر نسبت آن به دخترهاست

۲۱- مهم ترین برنامه های درمان بی اختیاری ادراری یا شب ادراری کدام است؟

۱. استفاده از رفتاردرمانی با تاکید بر شرطی سازی کلاسیک

۲. مداخله های آموزشی و تربیتی

۳. دارودرمانی با استفاده از داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای

۴. درمان شناختی- رفتاری مرتبط

۲۲- نخستین روان پزشکی که در سال ۱۸۶۷ به طور جدی به کودکان خردسالی که مبتلا به اختلال شدید روانی همراه با انحراف، تاخیر و دگرگونی بارز در فرایندهای رشد بودند، توجه نمود چه کسی بود؟

۴. راتر

۳. لئوکانر

۲. هنری موزلی

۱. هانس آسپرگر

۲۳- شیوع کدام رفتار در کودکان در خودمانده در اوقاتی که آنها در سکان های سازمان نایافته تنها هستند، بیشتر است؟

۴. رفتار خودتحریکی

۳. رفتار اجتماعی

۲. رفتار خودجرحی

۱. رفتار خودجرحی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

- ۲۴- رویکردهای مداخله جویانه ای چون مدل سازی، تقویت، مدیریت خود و آموزش مستقیم مربوط به کدام یک از روش های درمان رفتاری-آموزشی می باشد؟

- ۱. درمان پاسخ محوری
- ۲. مداخله رفتاری فشرده اولیه
- ۳. مداخلات ارتباطی
- ۴. تحلیل رفتار کاربردی

- ۲۵- کدام یک از داروهای زیر سطح سروتونین خون را کاهش داده و در برخی از کودکان در خودمانده موثر است؟

- ۱. فن سیکلیدین
- ۲. هالوپریدول
- ۳. فن فلورامین
- ۴. ریتالین

- ۲۶- شیوع کدام اختلال تنها در دختران تشخیص داده شده است؟

- ۱. اختلال از هم پاشیدگی دوره کودکی
- ۲. اختلال آسپرگر
- ۳. در خودمانده
- ۴. اختلال رت

- ۲۷- حداقل سن شروع اختلال از هم پاشیدگی دوره کودکی چند سالگی است؟

- ۱. ۲ سالگی
- ۲. ۴ سالگی
- ۳. ۳ سالگی
- ۴. ۵ سالگی

- ۲۸- کدام اختلال از جمله رایج ترین و عمومی ترین مشکلات روانشناختی کودکان می باشد؟

- ۱. اختلال فراگیر مربوط به رشد
- ۲. نارسایی ذهنی
- ۳. نارسایی های یادگیری
- ۴. اختلال کمبود توجه

- ۲۹- معمولاً نخستین علامتی که در افراد مبتلا به ADHD فروکش نمی کند، کدام است؟

- ۱. پرتحرکی
- ۲. حواس پرتی
- ۳. مشکلات یادگیری
- ۴. اختلالات خلقی

- ۳۰- کدامیک از انواع درمانهای زیر مربوط به اختلال سلوک می باشد؟

- ۱. بازی درمانی
- ۲. درمان چندالگویی
- ۳. روان درمانی انفرادی
- ۴. درمان تغذیه ای

| شماره<br>سؤال | ياسخ صحيح | وضعية كليد |
|---------------|-----------|------------|
| ١             | د         | عادي       |
| ٢             | الف       | عادي       |
| ٣             | الف       | عادي       |
| ٤             | ج         | عادي       |
| ٥             | ب         | عادي       |
| ٦             | د         | عادي       |
| ٧             | ب         | عادي       |
| ٨             | ج         | عادي       |
| ٩             | ج         | عادي       |
| ١٠            | الف       | عادي       |
| ١١            | ب         | عادي       |
| ١٢            | د         | عادي       |
| ١٣            | الف       | عادي       |
| ١٤            | ب         | عادي       |
| ١٥            | الف       | عادي       |
| ١٦            | ج         | عادي       |
| ١٧            | ب         | عادي       |
| ١٨            | د         | عادي       |
| ١٩            | د         | عادي       |
| ٢٠            | ج         | عادي       |
| ٢١            | الف       | عادي       |
| ٢٢            | ب         | عادي       |
| ٢٣            | ب         | عادي       |
| ٢٤            | ج         | عادي       |
| ٢٥            | ج         | عادي       |
| ٢٦            | د         | عادي       |
| ٢٧            | الف       | عادي       |
| ٢٨            | د         | عادي       |
| ٢٩            | الف       | عادي       |
| ٣٠            | ج         | عادي       |

**97-98-3**



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- اولین درمانگاه روانشناسی جهت درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی تأسیس شد؟

۱. ویتمر ۲. هال ۳. هیلی ۴. مایر

۲- کج خلقی، عدم کنترل ادرار، انگشت مکیدن و خودارضایی در کدام دسته از واکنش‌های سازگاری کودکان قرار می‌گیرد؟

۱. اختلالات خلقی ۲. اختلالات اضطرابی ۳. اختلالات عادتی ۴. اختلالات عصبی

۳- کدام الگو بر انسان و فرایند‌های ذهنی وی تأکید نموده و مواردی همچون حافظه، فرایندهای یادگیری و فراموشی را مطرح می‌کند؟

۱. الگوی یادگیری ۲. الگوی شناختی ۳. الگوی رفتاری ۴. الگوی روانکاوی

۴- شیوه‌هایی که مصاحبه گر استفاده می‌کند تا رابطه درمانی را ایجاد نموده و اطلاعات را کسب نماید؟

۱. رابطه ۲. تشخیص ۳. وضعیت روانی ۴. تکنیک

۵- آزمون ادراکی فراتستیک در کدام دسته آزمون‌ها قرار می‌گیرد؟

۱. آزمون‌های بینایی ۲. آزمون‌های شنوایی ۳. آزمون‌های روانی ۴. آزمون‌های رشد

۶- اساس تشخیص اکثر اختلالات بر کدام مورد زیر است؟

۱. وضعیت روانی ۲. مشاهده مستقیم ۳. ارزیابی شخصیت کودک

۴. آزمون‌های روانی

۷- سیستم عصبی حرکتی در کودکان با اختلال رشد هماهنگی چگونه می‌باشد؟

۱. بخشی از آن تخریب شده است ۲. همه این سیستم تخریب شده است

۳. سیستم عصبی حرکتی سالم می‌باشد ۴. در دوران نوزادی سالم است اما به مرور تخریب می‌شود

۸- مهارت‌های کودکان در زمینه ذخیره لغات، استفاده از زمان‌های مناسب افعال، ساخت جملات پیچیده کدام مورد زیر پایین تر از حد مورد انتظار می‌باشد؟

۱. لکنت زبان ۲. اختلال زبان بیانی ۳. اختلال زبان دریافتی ۴. اختلال اتیسم

۹- مهمترین مشکل کدام اختلالات کودکان نقص در برقراری ارتباط است؟

۱. عقب ماندگی ۲. اختلالات اضطراب جدایی ۳. اختلالات عادتی ۴. اوتیسم یا اختلالات فرآگیر رشد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۰- کدام تست برای تشخیص اختلال در زبان بیانی از رایج ترین تست‌ها می‌باشد که برای ارزیابی اصول زبان مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

۴. تست بینه

۳. تست باطری

۲. وکسلر

۱. بندر گشتالت

۱۱- در کدام اختلال کودک به طور مداوم قادر نیست اصول تکلمی برخی حروف بی صدا را به نحوی متناسب با رشد بکار گیرد؟

۴. اختلال زبان دریافتی

۳. اختلال زبان بیانی

۲. لکنت زبان

۱. اختلال واج شناختی

۱۲- شیوع لکنت زبان در طول زندگی همه افراد چند درصد می‌باشد؟

۴. ۱۰ درصد

۳. ۵ درصد

۲. ۳ درصد

۱. ۱۲ درصد

۱۳- کدام فرضیه بر آن استوار است که اختلال در زبان بیانی به رشد غیرطبیعی ساختار مغز در بخش مربوط به روند حافظه می‌باشد؟

۴. نقص در دستور زبان

۳. صدمات ظریف مغزی

۲. نقص در ساختار

۱. نقص روندی

۱۴- کدام یک از موارد زیر در دسته اختلالات خوردن بزرگسالان قرار می‌گیرد؟

۴. پیکا

۳. بی اشتهایی روانی

۲. هرزه خواری

۱. نشخوارگی

۱۵- هرزه خواری معمولاً بین چه سنینی شروع می‌شود؟

۴. ۸-۱۲ ماهگی

۳. ۲-۳ سالگی

۲. ۱۲-۲۴ ماهگی

۱. ۱۸-۲۴ ماهگی

۱۶- الگوی خانوادگی در هم تنیده توسط چه کسی مطرح شد؟

۴. فروید

۳. ویتمر

۲. یونگ

۱. مینوچین

۱۷- ویژگی اساسی کدام اختلال برگرداندن مکرر غذا و جویدن مجدد آن در یک دوره حداقل یک ماهه است؟

۴. نشخوارگری

۳. پرخوری

۲. بی اشتهایی روانی

۱. هرزه خواری

۱۸- کدام روش درمانی زیر در مورد مبتلایان به اختلال پرخوری موفقیت آمیزتر است؟

۴. دارو درمانی

۳. بین فردی

۲. رفتار دیالکتیکی

۱. رفتاری-شناختی

۱۹- به نظر برخی از متخصصین اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس کدام عامل است؟

۲. عوامل خانوادگی

۱. نحوه مطالعه

۴. مشکلات تدریس معلمان

۳. مشکلات خواندن

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

-۲۰- علت اصلی خوانش پریشی وجود ناهنجاری در کدام بخش مغز است؟

۲. ناحیه آهیانه ای

۱. ناحیه پیشانی

۴. ناحیه گیجگاهی-آهیانه ای

۳. ناحیه پس سری

-۲۱- نارسایی در کدام اختلال به دلیل ناتوانی در پردازش اعداد مبنا می باشد؟

۴. اختلال ریاضی

۳. اختلال آواشنختی

۲. اختلال خواندن

۱. لکت زبان

-۲۲- در کدام اختلال نارسایی در سیالی گفتار به اندازه ای است که بر پیشرفت تحصیلی یا شغلی و یا ارتباطات اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد؟

۴. اختلال ریاضی

۳. اختلال نوشتاری

۲. آواشنختی

۱. لکت زبان

-۲۳- حداقل سن برای تشخیص اختلال بی اختیاری ادرار چه سنی است؟

۴. ۲ سالگی

۳. ۴ سالگی

۲. ۳ سالگی

۱. ۵ سالگی

-۲۴- در کدام اختلال بچه هرگز دوره طولانی از کنترل مدفوع را تجربه نکرده است؟

۲. بی اختیاری مدفوع ثانویه

۱. بی اختیاری مدفوع

۴. بی اختیاری مدفوع اولیه

۳. بی اختیاری مدفوع ثالث

-۲۵- کدام مورد زیر از علل روانشنختی ابتلا به بی اختیاری مدفوع نیست؟

۲. تنبیه

۱. سوء رفتار جنسی

۴. اجتناب از درد هنگام حرکات روده

۳. ابتلا به اختلال روانی

-۲۶- مؤثرترین و مشهورترین برنامه درمان بی اختیاری شب ادراری کدام گزینه می باشد؟

۲. رفتار درمانی

۱. دارو درمانی

۴. رفتاری-شناختی

۳. دستگاه حساس به ادرار(تشک)

-۲۷- کدام اختلال فراگیر رشد مربوط به جنس مؤنث است؟

۴. بیش فعالی

۳. اتیسم

۲. رت

۱. آسپرگر

-۲۸- کودکان مبتلا به کدام اختلال هم‌زمان دچار اختلال اسکیزوفرنی نیز می شوند؟

۴. رت

۳. آسپرگر

۲. بیش فعالی

۱. در خودمانندگی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشنده تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۹- برخی افراد مبتلا به اختلال آسپرگر ممکن است الگوهای رفتاری کدام اختلال را نشان دهند؟

۱. اختلال وسوس فکری-عملی  
۲. اختلال شخصیت مرزی  
۳. اختلال اسکیزوفرنی  
۴. اختلال رت

۳۰- بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری سه مشکل اصلی کدام اختلال است؟

۱. اتیسم  
۲. بیش فعالی  
۳. رت  
۴. آسپرگر

| شماره سؤال | پاسخ صحيح | وضعیت کلید |
|------------|-----------|------------|
| ۱          | الف       | عادی       |
| ۲          | ج         | عادی       |
| ۳          | ب         | عادی       |
| ۴          | د         | عادی       |
| ۵          | الف       | عادی       |
| ۶          | د         | عادی       |
| ۷          | ج         | عادی       |
| ۸          | ب         | عادی       |
| ۹          | د         | عادی       |
| ۱۰         | ج         | عادی       |
| ۱۱         | الف       | عادی       |
| ۱۲         | ج         | عادی       |
| ۱۳         | الف       | عادی       |
| ۱۴         | ج         | عادی       |
| ۱۵         | ب         | عادی       |
| ۱۶         | الف       | عادی       |
| ۱۷         | د         | عادی       |
| ۱۸         | الف       | عادی       |
| ۱۹         | ج         | عادی       |
| ۲۰         | د         | عادی       |
| ۲۱         | د         | عادی       |
| ۲۲         | الف       | عادی       |
| ۲۳         | الف       | عادی       |
| ۲۴         | د         | عادی       |
| ۲۵         | د         | عادی       |
| ۲۶         | ج         | عادی       |
| ۲۷         | ب         | عادی       |
| ۲۸         | الف       | عادی       |
| ۲۹         | الف       | عادی       |
| ۳۰         | ب         | عادی       |

**97-98-2**



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- انگشت مکیدن و مدرسه گریزی جزء کدام واکنش های سازگاری کودکان است؟

۱. خلقی-عادتی      ۲. عادتی- خلقی      ۳. خلقی- اضطرابی      ۴. اضطرابی- خلقی

۲- مهمترین ابزار سنجش، تحقیق، مداخله و ارزیابی در مورد کودکان کدام است؟

۱. مشاهده      ۲. نقاشی      ۳. مصاحبه      ۴. بازی

۳- ویژگی مشترک همه انواع روان درمانی های کودکان چیست؟

۱. تکنیک      ۲. تشخیص      ۳. رابطه      ۴. وضعیت روانی

۴- تشخیص بهنگاری از نابهنگاری در کودکان نسبت به بزرگسالان چگونه است؟

۱. ساده و روان تر      ۲. دشوار و پیچیده تر      ۳. مهمتر و حساس تر      ۴. اولویت دار تر و سخت تر

۵- اساس تشخیص بسیاری از اختلالات کودکان و نوجوانان چیست؟

۱. معاينه وضعیت روانی      ۲. روان آزمایی      ۳. شرح حال      ۴. بازی و نقاشی

۶- در سال اول زندگی کودک رشد کدام بعد سریع تر است؟

۱. جسمی      ۲. عصبی      ۳. شناختی      ۴. عاطفی

۷- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. ۱۰ درصد      ۲. ۵ درصد      ۳. ۱۲ درصد      ۴. ۱۵ درصد

۸- تست باطری از رایج ترین تست های تشخیصی کدام اختلال زبانی است؟

۱. بیانی      ۲. دریافتی- بیانی      ۳. ارتباطی نامشخص      ۴. واج شناختی

۹- نقص در تلفظ، ویژگی اصلی کدام اختلال زبانی است؟

۱. آواشناختی      ۲. ارتباطی نامشخص      ۳. دریافتی- بیانی      ۴. بیانی

۱۰- تکنیک تنفس دیافراگمی جزو مداخلات درمانی کدام اختلال ارتباطی است؟

۱. بیانی      ۲. لکنت زبان      ۳. ارتباطی نامشخص      ۴. آواشناختی

۱۱- خوردن مواد غیر خوراکی پس از چه سنی معمولاً نابهنگار تلقی می شود؟

۱. ۱۸ ماهگی      ۲. ۲۰ ماهگی      ۳. ۱۲ ماهگی      ۴. ۲۴ ماهگی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۲- مداخلات رفتاری مانند چکاندن آب لیمو در درمان شیرخوار دارای کدام اختلال تغذیه مفید است؟

۱. هرزه خواری      ۲. نشخوار      ۳. بی اشتهایی      ۴. پرخوری

۱۳- نقص اساسی در وظیفه هیپوتالاموس درباره کدام اختلال خوردن آمده است؟

۱. پرخوری      ۲. هرزه خواری      ۳. بی اشتهایی روانی      ۴. نشخوار

۱۴- پژوهش های اخیر در درمان بی اشتهایی روانی به چه داروهایی تاکید داشته اند؟

۱. ضد اضطراب      ۲. ضد افسردگی      ۳. خواب آور      ۴. اشتها آور

۱۵- کامل ترین نوع درمان بی اشتهایی روانی کدام است؟

۱. دارو درمانی      ۲. روان درمانی حمایتی      ۳. رفتار درمانی      ۴. خواندن

۱۶- اساسی ترین عامل شکست تحصیلی مربوط به کدام حوزه اکتسابات آموزشگاهی است؟

۱. محاسبه      ۲. نوشتن      ۳. شنیدن      ۴. خواندن

۱۷- معمولاً مکان اصلی درمان نارسایی های تحولی کجا است؟

۱. خانواده      ۲. مدرسه      ۳. کلینیک      ۴. مهد کودک

۱۸- بالاترین میزان شیوع نارسایی های یادگیری متعلق به کدام حوزه است؟

۱. خواندن      ۲. ریاضی      ۳. نوشتن      ۴. شنیدن

۱۹- اکثر کودکان در چه سنی توانایی کنترل مثانه را به دست می آورند؟

۱. ۱ تا ۳ سالگی      ۲. ۲ تا ۳ سالگی      ۳. ۳ تا ۵ سالگی      ۴. ۲ تا ۴ سالگی

۲۰- این اختلال دفعی با عوامل روانشنختی از قبیل جدایی والدین و یا عدم توافق آنها همراه است؟

۱. بی اختیاری ادرار اولیه      ۲. بی اختیاری دفع اولیه

۳. بی اختیاری ادرار ثانویه      ۴. بی اختیاری دفع ثانویه

۲۱- کدام اختلال دفعی با شیوه های فرزند پروری خشن و تنبیه گرایانه و میزان خصومت ارتباط دارد؟

۱. بی اختیاری ادرار اولیه      ۲. بی اختیاری دفع اولیه

۳. بی اختیاری ادرار ثانویه      ۴. بی اختیاری دفع ثانویه

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشنده تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۲- کانر شکل شدید آسیب شناسی روانی کودک را چه نامیده است؟

۱. اتیسم اولیه کودکی
۲. درماندگی آموخته شده
۳. اختلال ارتباط بیانی
۴. اختلال اضطراب اجتماعی

۲۳- میزان کدام اختلال دوران رشد کودکی در خانواده های دارای وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا بیشتر گزارش شده است؟

۱. زبان بیانی
۲. بی اختیاری ادرار اولیه
۳. درخودماندگی
۴. بی اشتھایی روانی

۲۴- اصطلاح "والدین سرد" در حیطه کدام اختلال مطرح شده است؟

۱. درخودمانده
۲. زبان بیانی
۳. لکنت زبان
۴. پرخوری

۲۵- کدام روش درمانی-آموزشی در درمان اختلال درخودماندگی جدید تر است؟

۱. تحلیل رفتار کاربردی
۲. مداخله رفتاری فشرده اولیه
۳. مداخلات ارتباطی
۴. درمان پاسخ محوری

۲۶- مهمترین مشکل توجه در کودکان کدام است؟

۱. توجه پایدار
۲. توجه انتخابی
۳. توجه فعال
۴. توجه مبسوط

۲۷- صاحب نظران معمولاً رفتار بدون تفکر را چه می نامند؟

۱. کم توجهی
۲. نوروزگرایی
۳. تکانشگری
۴. کم فعالی

۲۸- مداخله های مربوط به والدین شامل آموزش رفتاری و در صورت لزوم خانواده درمانی، در درمان کدام اختلال اهمیت بیشتری دارد؟

۱. سلوک
۲. نافرمانی مقابله ای
۳. درخودماندگی
۴. بی اشتھایی روانی

۲۹- در ارتباط با کدام روش های درمانی ADHD مطالعات بیشتری انجام شده است؟

۱. درمان دارویی
۲. درمان شناختی-رفتاری
۳. درمان چند الگویی
۴. خانواده درمانی

۳۰- سن معیار برای تشخیص نشانه های فقدان توجه و بیش فعالی چیست؟

۱. ۵ سالگی
۲. ۶ سالگی
۳. ۴ سالگی
۴. ۷ سالگی

| شماره سؤال | ياسخ صحيح | وضعیت کلید |
|------------|-----------|------------|
| ۱          | ب         | عادی       |
| ۲          | ج         | عادی       |
| ۳          | ج         | عادی       |
| ۴          | ب         | عادی       |
| ۵          | ب         | عادی       |
| ۶          | الف       | عادی       |
| ۷          | ب         | عادی       |
| ۸          | الف       | عادی       |
| ۹          | الف       | عادی       |
| ۱۰         | ب         | عادی       |
| ۱۱         | الف       | عادی       |
| ۱۲         | ب         | عادی       |
| ۱۳         | ج         | عادی       |
| ۱۴         | ب         | عادی       |
| ۱۵         | ج         | عادی       |
| ۱۶         | د         | عادی       |
| ۱۷         | ب         | عادی       |
| ۱۸         | الف       | عادی       |
| ۱۹         | ب         | عادی       |
| ۲۰         | ج         | عادی       |
| ۲۱         | د         | عادی       |
| ۲۲         | الف       | عادی       |
| ۲۳         | ج         | عادی       |
| ۲۴         | الف       | عادی       |
| ۲۵         | ج         | عادی       |
| ۲۶         | الف       | عادی       |
| ۲۷         | ج         | عادی       |
| ۲۸         | ب         | عادی       |
| ۲۹         | الف       | عادی       |
| ۳۰         | د         | عادی       |

**97-98-1**



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- انگشت مکیدن و مدرسه گریزی جزء کدام واکنش های سازگاری کودکان است؟

۱. خلقی-عادتی      ۲. عادتی- خلقی      ۳. خلقی- اضطرابی      ۴. اضطرابی- خلقی

۲- مهمترین ابزار سنجش، تحقیق، مداخله و ارزیابی در مورد کودکان کدام است؟

۱. مصاحبه      ۲. مشاهده      ۳. نقاشی      ۴. بازی

۳- در سال اول زندگی کودک ، رشد کدام بعد سریع تر است؟

۱. جسمی      ۲. عصبی      ۳. شناختی      ۴. عاطفی

۴- ویژگی مشترک همه انواع روان درمانی های کودکان چیست؟

۱. تکنیک      ۲. تشخیص      ۳. رابطه      ۴. وضعیت روانی

۵- تشخیص بهنجهاری از نابهنهجای در کودکان نسبت به بزرگسالان چگونه است؟

۱. ساده و روان تر      ۲. دشوار و پیچیده تر      ۳. مهمند و حساس تر      ۴. اولویت دار تر و سخت تر

۶- اساس تشخیص بسیاری از اختلالات کودکان و نوجوانان چیست؟

۱. معاينه وضعیت روانی      ۲. روان آزمایی      ۳. شرح حال      ۴. بازی و نقاشی

۷- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. ۱۰ درصد      ۲. ۵ درصد      ۳. ۱۲ درصد      ۴. ۱۵ درصد

۸- تست باطری از رایج ترین تست های تشخیصی کدام اختلال زبانی است؟

۱. بیانی      ۲. دریافتی- بیانی      ۳. ارتباطی نامشخص      ۴. واج شناختی

۹- نقص در تلفظ ویژگی اصلی چه اختلال زبانی است؟

۱. آواشناختی      ۲. ارتباطی نامشخص      ۳. دریافتی- بیانی      ۴. بیانی

۱۰- تکنیک تنفس دیافراگمی جزء مداخلات درمانی کدام اختلال ارتباطی است؟

۱. بیانی      ۲. لکنت زبان      ۳. ارتباطی نامشخص      ۴. آواشناختی

۱۱- خوردن مواد غیر خوراکی پس از چه سنی معمولاً نابهنهجای تلقی می شود؟

۱. ۱۸ ماهگی      ۲. ۲۰ ماهگی      ۳. ۱۲ ماهگی      ۴. ۲۴ ماهگی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشنده تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۲- مداخلات رفتاری مانند چکاندن آب لیمو در درمان شیرخوار دارای کدام اختلال تغذیه مفید است؟

۱. هرزه خواری      ۲. نشخوار      ۳. بی اشتها ی      ۴. پرخوری

۱۳- نقص اساسی در وظیفه هیپوتالاموس درباره کدام اختلال خوردن آمده است؟

۱. پرخوری      ۲. هرزه خواری      ۳. بی اشتها ی روانی      ۴. نشخوار

۱۴- پژوهش های اخیر در درمان بی اشتها ی روانی به چه داروهایی تاکید داشته اند؟

۱. ضد اضطراب      ۲. ضد افسردگی      ۳. خواب آور      ۴. اشتها آور

۱۵- کامل ترین نوع درمان بی اشتها ی روانی کدام است؟

۱. دارو درمانی      ۲. روان درمانی حمایتی      ۳. رفتار درمانی      ۴. خواندن

۱۶- اساسی ترین عامل شکست تحصیلی مربوط به کدام حوزه اکتسابات آموزشگاهی است؟

۱. محاسبه      ۲. نوشتن      ۳. شنیدن      ۴. خواندن

۱۷- معمولاً مکان اصلی درمان نارسایی های تحولی کجا است؟

۱. خانواده      ۲. مدرسه      ۳. کلینیک      ۴. مهد کودک

۱۸- بالاترین میزان شیوع نارسایی های یادگیری متعلق به کدام حوزه است؟

۱. خواندن      ۲. ریاضی      ۳. نوشتن      ۴. شنیدن

۱۹- اکثر کودکان در چه سنی توانایی کنترل مثانه را به دست می آورند؟

۱. ۱ تا ۳ سالگی      ۲. ۲ تا ۳ سالگی      ۳. ۳ تا ۵ سالگی      ۴. ۲ تا ۴ سالگی

۲۰- این اختلال دفعی با عوامل روانشنختی از قبیل جدایی والدین و یا عدم توافق آنها همراه است؟

۱. بی اختیاری ادرار اولیه      ۲. بی اختیاری دفع اولیه

۳. بی اختیاری ادرار ثانویه      ۴. بی اختیاری دفع ثانویه

۲۱- کدام اختلال دفعی با شیوه های فرزند پروری خشن و تنبیه گرایانه و میزان خصومت ارتباط دارد؟

۱. بی اختیاری ادرار اولیه      ۲. بی اختیاری دفع اولیه

۳. بی اختیاری ادرار ثانویه      ۴. بی اختیاری دفع ثانویه

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۲- کانر شکل شدید آسیب شناسی روانی کودک را چه نامیده است؟

۱. اتیسم اولیه کودکی
۲. درماندگی آموخته شده
۳. اختلال ارتباط بیانی
۴. اختلال اضطراب اجتماعی

۲۳- میزان کدام اختلال دوران رشد کودکی در خانواده های دارای وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا بیشتر گزارش شده است؟

۱. زبان بیانی
۲. بی اختیاری ادرار اولیه
۳. درخودماندگی
۴. بی اشتھایی روانی

۲۴- اصطلاح "والدین سرد" در حیطه کدام اختلال مطرح شده است؟

۱. درخودمانده
۲. زبان بیانی
۳. لکنت زبان
۴. پرخوری

۲۵- کدام روش درمانی-آموزشی در درمان اختلال درخودماندگی جدید تر است؟

۱. تحلیل رفتار کاربردی
۲. مداخله رفتاری فشرده اولیه
۳. مداخلات ارتباطی
۴. درمان پاسخ محوری

۲۶- مهمترین شکل توجه در کودکان کدام است؟

۱. توجه پایدار
۲. توجه انتخابی
۳. توجه فعال
۴. توجه مبسوط

۲۷- صاحب نظران معمولاً رفتار بدون تکرار را چه می نامند؟

۱. تکانشگری
۲. کم فعالی
۳. کم توجهی
۴. نوروز گرایی

۲۸- سن معیار برای تشخیص نشانه های فقدان توجه و بیش فعالی چیست؟

۱. ۵ سالگی
۲. ۷ سالگی
۳. ۶ سالگی
۴. ۴ سالگی

۲۹- در ارتباط با کدام روش های درمانی ADHD مطالعات بیشتری انجام شده است؟

۱. درمان دارویی
۲. درمان شناختی-رفتاری
۳. درمان چند الگویی
۴. خانواده درمانی

۳۰- مداخله های مربوط به والدین شامل آموزش رفتاری و در صورت لزوم خانواده درمانی، در درمان کدام اختلال اهمیت بیشتری دارد؟

۱. سلوک
۲. نافرمانی مقابله ای
۳. درخودماندگی
۴. بی اشتھایی روانی

| شماره سوال | پاسخ صحیح |  | وضعیت کلید |
|------------|-----------|--|------------|
| ١          | ب         |  | عادی       |
| ٢          | الف       |  | عادی       |
| ٣          | الف       |  | عادی       |
| ٤          | ج         |  | عادی       |
| ٥          | ب         |  | عادی       |
| ٦          | ب         |  | عادی       |
| ٧          | ب         |  | عادی       |
| ٨          | الف       |  | عادی       |
| ٩          | الف       |  | عادی       |
| ١٠         | ب         |  | عادی       |
| ١١         | الف       |  | عادی       |
| ١٢         | ب         |  | عادی       |
| ١٣         | ج         |  | عادی       |
| ١٤         | ب         |  | عادی       |
| ١٥         | ج         |  | عادی       |
| ١٦         | د         |  | عادی       |
| ١٧         | ب         |  | عادی       |
| ١٨         | الف       |  | عادی       |
| ١٩         | ب         |  | عادی       |
| ٢٠         | ج         |  | عادی       |
| ٢١         | د         |  | عادی       |
| ٢٢         | الف       |  | عادی       |
| ٢٣         | ج         |  | عادی       |
| ٢٤         | الف       |  | عادی       |
| ٢٥         | ج         |  | عادی       |
| ٢٦         | الف       |  | عادی       |
| ٢٧         | الف       |  | عادی       |
| ٢٨         | ب         |  | عادی       |
| ٢٩         | الف       |  | عادی       |
| ٣٠         | ب         |  | عادی       |

**96-97-3**



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- اولین فردی که به مطالعه کودکان عقب مانده و روش های آموزشی برای این کودکان پرداخت، کیست؟

۱. سکواین

۲. هال

۳. مایر

۴. بینه

۲- در گذشته اکثر اختلالات در چند گروه جای داده می شد؟

۱. ۵ . ۴

۲. ۳ . ۴

۳. ۲ . ۳

۴. ۱ . ۲

۳- تأکید دیدگاه آماری در تعیین بهنجاری بر کدام مورد است؟

۱. بایدها و ارزش های ایده آل جامعه

۲. وجود یا نبود علائم بیماری

۳. میانگین و شیوع علائم

۴. ملاک های فرهنگی

۴- "مدرسه گریزی، دزدی، خرابکاری و بد رفتاری" به کدام مقوله واکنش های سازگاری کودکان تعلق دارد؟

۱. اختلالات عادتی

۲. ویژگی های اضطرابی

۳. اختلالات شخصیت

۴. اختلالات خلقی

۵- کدام گزینه یکی از مفاهیم کلیدی الگوی روان پویایی محسوب می شود؟

۱. هورمون ها

۲. اضطراب

۳. فراموشی

۴. محرك های محیطی

۶- بازنگری چهارمین ویرایش کتابچه تشخیص و درمان اختلالات روانی انجمان روان پزشکی امریکا شامل چند محور ارزیابی است؟

۱. ۵ . ۴

۲. ۳ . ۴

۳. ۲ . ۳

۴. ۱ . ۲

۷- یکی از مهمترین روش ها برای سنجش افراد دچار معلولیت رشدی و یا کودکان خیلی خردسال چیست؟

۱. مشاهده رفتار

۲. مصاحبه بالینی

۳. بازی های غیر ساخت دار

۴. روان درمانی

۸- ثبات و پایایی علائم مشکل رفتاری در طول زمان نشانگر کدام اصل تشخیص رفتار نابهنجار است؟

۱. شدت رفتار

۲. تداوم رفتار

۳. فراوانی رفتار

۴. شایستگی سنی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۹- کدام یک از آزمون های زیر، آزمون بینایی است؟

۱. وکسلر  
۲. لینکلن- اوزرتسکی  
۳. بینه  
۴. بندر- گشتالت

۱۰- برای ایجاد یک رابطه درمانی کدام مورد زیر لازم است؟

۱. استفاده از نقاشی  
۲. به کار بردن تکنیک  
۳. ابزارهای نمایش  
۴. انجام مشاوره

۱۱- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمين زده می شود؟

۱. ۵ درصد  
۲. ۲ درصد  
۳. ۳ درصد  
۴. ۱۰ درصد

۱۲- اختلال رشد هماهنگی با کدام فعالیت تداخل پیدا می کند؟

۱. تکلم  
۲. شنیدن  
۳. هوش  
۴. پیشرفت تحصیلی

۱۳- ویژگی اصلی اختلال واج شناختی چیست؟

۱. اختلال خواندن  
۲. اختلال مختلط در زبان دریافتی  
۳. نقص در تلفظ  
۴. ورم مزمن گوش میانی

۱۴- کدام یک از عوامل زیر در سبب شناسی لکنت بیشترین مداخله را دارد؟

۱. تقاضاهای محیطی  
۲. مهد کودک ها  
۳. ژنتیک  
۴. استعداد بیولوژیک

۱۵- آپراکسی گفتار عموماً با چه چیزی مرتبط است؟

۱. فقدان شنوایی  
۲. فشار زبان  
۳. صدمه مغزی  
۴. عقب ماندگی ذهنی

۱۶- طبق برخی پژوهش ها، مؤثرترین و سریع ترین درمان اختلال نشخوار چیست؟

۱. درمان محیط روانی - اجتماعی  
۲. بهبود تعامل بین مادر و شیرخوار  
۳. دارو درمانی  
۴. درمان رفتاری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۷- اختلال تغذیه ای شیرخوارگی قبل از چند سالگی بروز می کند؟

۱. دو سالگی  
۲. سه سالگی  
۳. پنج سالگی  
۴. شش سالگی

۱۸- در مبتلایان به کدام نوع بی اشتها ای روانی، احتمال سوء مصرف مواد و اختلال شخصیتی وجود دارد؟

۱. مزمن  
۲. محدود کننده  
۳. تخلیه ای  
۴. حاد

۱۹- کدام داروها در کاهش علائم اختلال پرخوری تأثیر گذار بوده اند؟

۱. ضد اضطراب  
۲. ضد روان پریشی  
۳. ضد افسردگی  
۴. سایمپتیدین

۲۰- محدودیت در واژگان، دشواری در بازیابی کلمات یا ساختن جمله، از مشخصه های کدام نارسایی یادگیری است؟

۱. واج شناختی  
۲. نوشتن بیانی  
۳. زبان بیانی  
۴. محاسبه پریشی

۲۱- به نظر برخی از متخصصین اساسی ترین عامل شگفت تحصیلی در مدارس چیست؟

۱. مشکلات شنوایی  
۲. مشکلات خواندن  
۳. اختلال نوشتن  
۴. لکنت زبان عمومی

۲۲- میزان شیوع نارسایی ریاضی در کودکان مدرسه رو چقدر است؟

۱. پنج درصد  
۲. چهار درصد  
۳. سه درصد  
۴. یک درصد

۲۳- در کدام الگوی رفتاری برای درمان لکنت زبان از روش هایی مانند کنترل وابستگی و پرت کردن حواس استفاده می شود؟

۱. رفتارگرایی کلاسیک  
۲. گفتاردرمانگری  
۳. شناخت درمانگری  
۴. روان درمانگری

۲۴- اثربخشی کدام روش رفتاری درمان شب ادراری مورد تردید است؟

۱. استفاده از دستگاه های حساس و هشدار دهنده  
۲. آموزش روزانه اتساع مثانه  
۳. شرطی سازی کلاسیک



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشنده تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

**۲۵- عامل روانشناختی مؤثر بر بی اختیاری ادراری کدام است؟**

- ۱. مثانه بیش فعال
- ۲. تأخیر در شاخص های رشد فیزیکی
- ۳. بیماری های مزمن کلیوی
- ۴. بیکاری در خانواده

**۲۶- کودکان مبتلا به کدام اختلال زیر از تماس جسمانی و برخورد نگاه اجتناب کرده و ترجیح می دهند تنها باشند؟**

- ۱. از هم پاشیدگی
- ۲. اوتیسم
- ۳. رت
- ۴. آسپرگر

**۲۷- کدام شیوه درمان اختلال در خودمانندگی موجب رشد مهارت های ارتباطی می شود؟**

- ۱. دارو درمانی
- ۲. رفتار درمانی
- ۳. شیمی درمانی
- ۴. رژیم درمانی

**۲۸- کدام یک از اختلال های زیر بسیار نادر بوده و بیشتر در دختران دیده می شود؟**

- ۱. اوتیسم
- ۲. رت
- ۳. آسپرگر
- ۴. شخصیت اسکیزوئید

**۲۹- سه مشکل اصلی در اختلال کمبود توجه / بیش فعالی چیست؟**

- ۱. بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری
- ۲. برانگیختگی، بیش فعالی و تکانشگری
- ۳. پر جنبشی، بیش فعالی و تکانشگری
- ۴. بی توجهی، انحراف توجه و تکانشگری

**۳۰- کدام اختلال زیر "الگوی رفتار ضد اجتماعی غیر قابل کنترل کودک یا نوجوان" نامیده می شود؟**

- ۱. رفتار ایدایی
- ۲. سلوک
- ۳. نافرمانی
- ۴. بیش فعالی

| شماره سؤال | پاسخ صحيح | وضعیت کلید |
|------------|-----------|------------|
| ۱          | الف       | عادی       |
| ۲          | الف       | عادی       |
| ۳          | ج         | عادی       |
| ۴          | د         | عادی       |
| ۵          | ب         | عادی       |
| ۶          | د         | عادی       |
| ۷          | الف       | عادی       |
| ۸          | ب         | عادی       |
| ۹          | د         | عادی       |
| ۱۰         | ب         | عادی       |
| ۱۱         | الف       | عادی       |
| ۱۲         | د         | عادی       |
| ۱۳         | ب         | عادی       |
| ۱۴         | ج         | عادی       |
| ۱۵         | ج         | عادی       |
| ۱۶         | د         | عادی       |
| ۱۷         | د         | عادی       |
| ۱۸         | ج         | عادی       |
| ۱۹         | ج         | عادی       |
| ۲۰         | ج         | عادی       |
| ۲۱         | الف       | عادی       |
| ۲۲         | د         | عادی       |
| ۲۳         | الف       | عادی       |
| ۲۴         | ب         | عادی       |
| ۲۵         | د         | عادی       |
| ۲۶         | ب         | عادی       |
| ۲۷         | ب         | عادی       |
| ۲۸         | ب         | عادی       |
| ۲۹         | الف       | عادی       |
| ۳۰         | ب         | عادی       |

**96-97-1**



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- در دیدگاه بهنگاری به منزله فرآیند رفتار بهنگاری نتیجه نهایی چه مواردی است؟

۱. سیستم های ساختاری      ۲. سیستم های متعامل      ۳. سیستم های رابطه ای      ۴. سیستم های متعادل

۲- بر اساس نظر ساروک (2007) مشخصه اصلی اختلال مزمن روان نژندی چیست؟

۱. وسواس فکری      ۲. وسواس عملی      ۳. اضطراب      ۴. کژ کاری جنسی

۳- در سال (1390) برای عملکرد بهتر تحصیلی چه موردی تجویز می گردد؟

۱. ریتالین      ۲. فلوکستین      ۳. بنزدرين      ۴. باربیتورات

۴- از نظر باندورا علت اصلی بیماریهای روانی چیست؟

۱. نبود خویشتن داری      ۲. در ارتباط با دیگران      ۳. تجرب ارتباطی از وقوع عینی ارتباطات      ۴. اضطراب اساسی

۵- کدامیک از موارد زیر شامل ابعاد مصاحبه می باشد؟

۱. جداسازی      ۲. عملیاتی کردن      ۳. وضعیت جسمی      ۴. تشخیص

۶- در سنجش رفتاری، کدامیک از موارد زیر عنوان فن اصلی استفاده می گردد؟

۱. تشخیص      ۲. ارزابی      ۳. معاينه      ۴. مشاهده

۷- بنابر اصل شایستگی، برای تشخیص رفتارهای نابهنگار در فرآیند تحول باید چه مواردی را در نظر گرفت؟

۱. اصل فراوانی      ۲. ایفای نقش      ۳. انتظارات سنتی      ۴. کم جراتی

۸- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. ۶ درصد      ۲. ۵ درصد      ۳. ۸ درصد      ۴. ۴ درصد

۹- کدامیک از موارد زیر شامل نشانه هایی است که در سنین پیش از دبستان در اختلال رشد هماهنگی دیده می شود؟

۱. ضعف در نوشتن      ۲. مشکل در غذا خوردن      ۳. ضعف در بغل کردن      ۴. ناهمانگی حرکتی در تمام زمانها

۱۰- درمان اختلال رشد هماهنگی عموماً شامل چه برنامه هایی می باشد؟

۱. برنامه های آموزشی حسی      ۲. برنامه های آموزشی رفتاری      ۳. برنامه های آموزشی حرکتی      ۴. برنامه های آموزشی جسمانی و حسی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۳

۱۱- در چند درصد کودکان زیر ۳ سال ، تاخیرهای زبانی بسیار رایج است؟

۱. ۸ تا ۱۵ درصد      ۲. ۱۰ تا ۱۵ درصد      ۳. ۱۱ تا ۱۵ درصد      ۴. ۸ تا ۱۸ درصد

۱۲- پیش آگهی اختلال در زبان بیانی با کدام مورد زیر ارتباط دارد؟

۱. تشخیص اختلال      ۲. مداخله اختلال      ۳. طبیعت اختلال      ۴. شدت اختلال

۱۳- آپراکسی گفتار عموماً با چه صدمه‌ای مرتبط است؟

۱. صدمه عملکردی      ۲. صدمه مغزی      ۳. صدمه صوتی      ۴. صدمه دهانی

۱۴- در کودکان پیش دبستانی مبتلا به لکنت زبان بروز کدام مورد زیر شایع تر است؟

۱. اضطراب اجتماعی      ۲. فوبی از فضای بسته      ۳. ناخن جویدن      ۴. شب ادراری

۱۵- خوردن مواد غیر خوراکی پس از چه سنی معمولاً "نابهنجار تلقی می‌گردد؟

۱. ۱۳ ماهگی      ۲. ۱۸ ماهگی      ۳. ۱۴ ماهگی      ۴. ۲۴ ماهگی

۱۶- سن شروع نشخوارکنندگی معمولاً چند ماهگی است؟

۱. ۵ ماهگی      ۲. ۷ ماهگی      ۳. بین ۳ تا ۱۲ ماهگی      ۴. بین ۴ تا ۱۲ ماهگی

۱۷- پرخوری معمولاً در چه زمانی شروع می‌گردد؟

۱. فقط در اوایل نوجوانی

۲. در اوایل بزرگسالی

۳. در اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی

۱۸- کدام شیوه درمانی ، در درمان مبتلایان به اختلال پرخوری از پرداختن به موضوعات مربوط به وزن و شکل بدن اجتناب می‌کند؟

۱. بین فردی      ۲. دارو درمانی      ۳. شناختی-رفتاری      ۴. رفتار دیالکتیکی

۱۹- کدام نارسایی در ویرایش های قبلی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ، اختلال در تولید گفتار نام داشته است؟

۱. آواشناختی      ۲. لکنت زبان      ۳. زبان بیانی      ۴. دیسلکسی

۲۰- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولاً در چند سالگی اتفاق می‌افتد؟

۱. ۴ تا ۱۰ سالگی      ۲. ۵ تا ۷ سالگی      ۳. ۲ تا ۷ سالگی      ۴. ۳ تا ۸ سالگی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۳

۲۱- بر اساس دیدگاه رفتارگرایی کلاسیک لکنت زبان چگونه رفتاری است؟

۱. آموخته شده      ۲. رغبتی      ۳. شرطی      ۴. غیر شرطی

۲۲- شب ادراری اولیه عموماً با چه موردی همراه است؟

۱. تاخیر بلوغ و وزن بالای زمان تولد      ۲. تاخیر بلوغ و وزن پایین زمان تولد  
۳. ناخن جویدن      ۴. گریه نابهنه‌گام

۲۳- وقوع نارسایی دفع در نتیجه تعامل چه عواملی می‌باشد؟

۱. روحی و جسمانی      ۲. روانشناختی و جسمانی  
۳. روانشناختی و حرکتی      ۴. حرکتی

۲۴- کدام دارو در درمان بی اختیاری ادرار، مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

۱. ریتالین      ۲. کلوزاپین      ۳. توفرانیل      ۴. هالوپریدول

۲۵- اسکیزوفرنی در چه سنی در کودکان نادر است؟

۱. زیر ۷ سال      ۲. زیر ۸ سال      ۳. زیر ۵ سال      ۴. زیر ۶ سال

۲۶- روش‌های درمان گری اختلالات رت بر چه آموزش‌هایی متتمرکز می‌شوند؟

۱. مهارت‌های درمانی و تعديلی      ۲. مهارت‌های درمانی و کششی  
۳. مهارت‌های خودیاری و ارتباطی      ۴. مهارت‌های دیگران یاری و ارتباطی

۲۷- اختلال در خودمانندگی معمولاً در چه سنی ظاهر می‌گردد؟

۱. قبل از ۵ سالگی      ۲. قبل از ۴ سالگی      ۳. قبل از ۷ سالگی      ۴. قبل از ۳ سالگی

۲۸- اختلال کمبود توجه/بیش فعالی روی کدام مشکل اصلی زیر متتمرکز است؟

۱. کم فعالی      ۲. تکانش گری      ۳. بی تکلیفی      ۴. توجه زیاد

۲۹- کدامیک از شیوه‌های زیر جزء روش‌های رفتاری است؟

۱. مجاورت      ۲. کنترل فرد      ۳. مهارت حل مسئله      ۴. بازی درمانی

۳۰- طبق نظریه روانکاوی کلاسیک، علت اختلال نافرمانی مقابله جویانه چیست؟

۱. تعارضات حل نشده در دوران مقعدی      ۲. تعارضات حل نشده در دوران دهانی  
۳. تعارضات حل نشده در دوران آلتی      ۴. تعارضات حل نشده در دوران کمون



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۳

پیغام نهاده سوالات شامل تمامی نیمسال ها فقط بازنمایی می‌باشد.  
Soalatpnu.ir

| شماره<br>سؤال | باسخ صحيح | وضعیت کلید |
|---------------|-----------|------------|
| ١             | ب         | عادی       |
| ٢             | ج         | عادی       |
| ٣             | ج         | عادی       |
| ٤             | الف       | عادی       |
| ٥             | د         | عادی       |
| ٦             | د         | عادی       |
| ٧             | ج         | عادی       |
| ٨             | ب         | عادی       |
| ٩             | الف       | عادی       |
| ١٠            | د         | عادی       |
| ١١            | ب         | عادی       |
| ١٢            | د         | عادی       |
| ١٣            | ب         | عادی       |
| ١٤            | الف       | عادی       |
| ١٥            | ب         | عادی       |
| ١٦            | ج         | عادی       |
| ١٧            | ج         | عادی       |
| ١٨            | الف       | عادی       |
| ١٩            | الف       | عادی       |
| ٢٠            | ج         | عادی       |
| ٢١            | الف       | عادی       |
| ٢٢            | الف       | عادی       |
| ٢٣            | ب         | عادی       |
| ٢٤            | ج         | عادی       |
| ٢٥            | ج         | عادی       |
| ٢٦            | ج         | عادی       |
| ٢٧            | د         | عادی       |
| ٢٨            | ب         | عادی       |
| ٢٩            | الف       | عادی       |
| ٣٠            | الف       | عادی       |

**95-96-3**



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شرطه تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ -

۱- اولین فردی که به مطالعه کودکان عقب مانده و روش های آموزشی برای این کودکان پرداخت که بود؟

۱. ادوارد سکواین  
۲. ویلیام هیلی  
۳. آلفرد بینه  
۴. آدولف مایر

۲- اختلال مزمنی است که مشخصه‌ی اصلی آن اضطراب می‌باشد و ممکن است به صورت علائمی چون وسواس فکری و عملی و غیره بروز کند.

۱. روان پریشی  
۲. سندروم های مغزی  
۳. اختلال های شخصیت  
۴. روان نژنی

۳- مدرسه گریزی، دزدی، خرابکاری، بدرفتاری و غیره در کدام طبقه از اختلالات طبقه بندی جدید قرار دارد؟

۱. اختلالات خلقی  
۲. اختلالات عادتی  
۳. اختلالات اضطرابی  
۴. اختلالات شخصیتی

۴- کدام یک از نظریه پردازان مکتب روان پویایی، معتقد است که شخصیت کودک تحت تاثیر چگونگی مقابله وی با اضطراب اساسی است که از احساس جدایی ناشی می‌شود؟

۱. فروید  
۲. آدلر  
۳. کارن هورنای  
۴. سالیوان

۵- کدام یک از گزینه‌های زیر از ویژگی‌های الگوی شناختی می‌باشد؟

۱. در این دیدگاه محرک‌های محیطی با رعایت قوانین محرکی و پاسخی می‌توانند هر گونه رفتاری را در انسان ایجاد کند

۲. این رویکرد به عوامل درونی بروز رفتار توجه دارد

۳. در این دیدگاه به نقش عوامل بدنی در ایجاد بیماری‌های روانی تأکید می‌شود

۴. این دیدگاه بر انسان و فرایندهای ذهنی وی تأکید می‌کند

۶- اولین و بنیادی ترین گام در سنجش و ارزیابی اختلالات روانی کودکان چیست؟

۱. توانایی اجرای یک مصاحبه‌ی بالینی جامع  
۲. توانایی برقراری یک ارتباط صحیح بین کودک و مصاحبه‌گر  
۳. سنجش وضعیت روحی و روانی کودک  
۴. شناخت توانایی‌ها و نقاط ضعف کودک

۷- اصلی ترین فن در سنجش رفتار چیست؟

۱. مصاحبه  
۲. پرسشنامه  
۳. مشاهده  
۴. گرفتن آزمون

۸- از چه ابزاری جهت ارزیابی کودکان با مشکلات خاص یادگیری استفاده می‌شود؟

۱. آزمون وکسلر  
۲. آزمون برتری طرفی  
۳. آزمون رشد حرکتی لینکلن - اوزرتسکی  
۴. آزمون های پیشرفته تحصیلی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ -

۹- طبقه بندی خصیصه های نابهنجار به دو طبقه‌ی درون ساخت و برون ساخت توسط چه کسی صورت گرفت؟

۴. وکسلر

۳. فروید

۲. ایکن باخ

۱. آنا فروید

۱۰- کدام اصل برای تشخیص رفتارهار نابهنجار در فرآیند تحول رشد، انتظارات سنی را در نظر گرفت؟

۴. اصل تداوم

۳. اصل شدت

۲. اصل شایستگی

۱. اصل فراوانی

۱۱- بر اساس نظریه پیازه، کودکان در چه سنینی در مرحله‌ی حسی حرکتی قرار دارند؟

۲. دبستان

۴. دوره‌ی شیرخوارگی و کودکی اول

۱. پیش دبستان

۳. خردسالی

۱۲- مشخصه‌ی اولین سال زندگی کودک چیست؟

۲. به حرکت درآمدن

۴. وابستگی شدید به شیر مادر

۱. تولید زبان و گفتار

۳. رشد جسمانی سریع

۱۳- شیوع اختلال رشد هماهنگی در کودکان سنین مدرسه چند درصد تخمین زده شده است؟

۴. ۵ درصد

۳. ۶ درصد

۲. ۷ درصد

۱. ۸ درصد

۱۴- در کدام یک از انواع اختلالات، کودکان از جنبه‌ی هماهنگی حرکتی و پیشرفت تحصیلی به طور قابل ملاحظه‌ای از گروه همسن و سال خود ضعیف ترند؟

۲. اختلال اضطرابی

۴. اختلال فرآگیر مربوط به رشد

۱. اختلال ارتباطی

۳. اختلال رشد هماهنگی

۱۵- یکی از پیچیده‌ترین فرآیندهایی که انسان در طول حیات خود آن را تجربه می‌کند و می‌آموزد، چیست؟

۴. احساس

۳. هوش

۲. حرکت

۱. زبان

۱۶- استفاده‌ی مادر از الکل، کوکائین و نیکوتین باعث بروز کدام یک از علل اختلال رشد هماهنگی می‌شود؟

۲. وزن کم هنگام تولد

۴. سوء تغذیه در دوران پیش از تولد

۱. نارس بودن

۳. هیپوکسی

۱۷- کدام گزینه به عنوان علل زمینه‌ای اختلال در زبان بیانی در نظر گرفته می‌شود؟

۲. آپراکسی گفتار که عموماً با صدمه مغزی مرتبط است

۴. مشکلات ارگانیکی و ساختاری از قبیل شکاف کام و ...

۱. تاخیر در پیشرفت گفتار

۳. صدمات ظریف مغزی و تاخیر در بالندگی مغز

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شهه تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۲ -

-۱۸- مهم ترین مشکل این کودکان نقص در برقراری ارتباط است و در تعامل های اجتماعی، ارتباط دوطرفه و بازی های سمبولیک و خلاق نیز مشکل دارند.

۱. عقب ماندگی ذهنی

۲. اوتیسم

۳. اختلال شنوایی

۴. اختلال در زبان دریافتی

-۱۹- کدام یک از انواع اختلالات ارتباطی، ممکن است به صورت اکتسابی یا ناشی از رشد باشد؟

۱. اختلال در زبان بیانی

۲. اختلال ارتباطی نامشخص

۱. اختلال در زبان دریافتی- بیانی

۲. اختلال واج شناسی

-۲۰- لکت زبان معمولاً در چه گروه سنی شایع است؟

۱. خردسال

۲. نوجوانان

۳. تا سن ۱۲ سالگی

۴. جوانان

-۲۱- کدام گزینه از مشخصه های اختلال هول (پانیک) می باشد؟

۱. ترس از تنها بودن در اماكن عمومي

۲. همواره بلاfacسله در رویارویی با نشانه موقعیتی یا راه انداز یا به لحاظ پیش بینی آن روی می دهد

۳. حمله ی حاد شدید اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع

۴. میزان شیوع آن در جمعیت کلی ۷.۱۷ درصد می باشد

-۲۲- کدام یک از اختلالات اضطرابی در گروه اندکی از کودکان با عفونت استرپتوکوکی بتاهمولیتیک همراه باشد؟

۱. بازارهای یا آگورافوبیا

۲. اختلال هول

۳. اختلال تورت

۴. اختلال وسواس فکری - عملی

-۲۳- بر اساس کدام نظریه، اختلال وسواسی - جبری، نوعی واپس روی از مرحله ادبی به مرحله مقعدی رشد روانی جنسی تلقی می شد؟

۱. نظریه روان کاوی سنتی

۲. دیدگاه رفتارگرایی

۳. نظریه زیستی

۴. نظریه شناختی

-۲۴- کدام اختلال ارتباط نزدیکی با سندروم توره دارد؟

۱. اختلال رت

۲. اختلال هراس اجتماعی

۳. اختلال اضطراب اجتماعی

۴. اختلال وسواسی - جبری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - روانشناسی

- ۲۵- کدام یک از اختلالات اضطرابی پس از سانحه PTSD رخ می دهد؟

- ۱. اختلال اضطراب جدایی
- ۲. اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان
- ۳. اختلال وحشت زدگی
- ۴. اختلال اضطراب فراگیر

- ۲۶- کدام گزینه از خصوصیات افراد با خلق بالا می باشد؟

- ۱. پرش افکار
- ۲. احساس گناه
- ۳. دشوار شدن تمرکز
- ۴. افکار مرگ

- ۲۷- دوره‌ی افسردگی اساسی باید حداقل چقدر طول بکشد؟

- ۱. چهار هفته
- ۲. دو ماه
- ۳. سه هفته
- ۴. دو هفته

- ۲۸- کدام گزینه مربوط به افسردگی خوبی نمی باشد؟

- ۱. مشخصه‌ی آن وجود علائمی کم شدت تراز علائم افسردگی اساسی است

۲. فرد باید حداقل دو سال خلق افسردگی داشته باشد

۳. به اختلال دیس تایمی معروف است

۴. در این اختلال، خلق دائماً به شکل غیرطبیعی بالا، گشاده و تحریک پذیر است

- ۲۹- در بین اختلالات روان پزشکی، بالاترین شیوع طول عمر مربوط به کدام اختلال می باشد؟

- ۱. اختلال افسردگی اساسی
- ۲. اختلال دو قطبی محور I
- ۳. اختلال دو قطبی محور II
- ۴. اختلال سیکلوتاپیمی

- ۳۰- عوامل سایکودینامیک در افسردگی توسط چه کسی مطرح شد؟

- ۱. ملانی کلاین
- ۲. زیگموند فروید
- ۳. ادوارد بیبرینگ
- ۴. هاینتس کوهوت

- ۳۱- در طبقه بندی اختلال های تغذیه و خوردن، کدام گزینه از انواع اختلال های خوردن محسوب می شود؟

- ۱. هرزه خواری
- ۲. نشخوارگی
- ۳. بی اشتھایی روانی
- ۴. اختلال تغذیه ای اویل کودکی

- ۳۲- در مورد کودکانی که علت هرزه خواری آن ها والدین و روش های ارتباطی والدین با کودک است، کدام روش درمانی هرزه خواری مفید می باشد؟

- ۱. روش رفتاری
- ۲. روش محیطی
- ۳. روش های روانی و اجتماعی
- ۴. راهنمایی خانوادگی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شهه تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ -

**۳۳- سن شروع نشخوارگری معمولاً در چه زمانی اتفاق می‌افتد؟**

۴. ۳ تا ۱۳ ماهگی

۳. ۲ تا ۸ ماهگی

۲. ۵ تا ۱۰ ماهگی

۱. ۳ تا ۱۲ ماهگی

**۳۴- کدامیک از داروهای زیر در کاهش علایم اختلال پرخوری تاثیر گذراند؟**

۴. هالو پریدول

۳. ریتالین

۲. منومین اکسیداز

۱. فنوباربیتال

**۳۵- الگوی خانوادگی درهم تنیده توسط چه کسی نامگذاری شده است؟**

۴. مینوچین

۳. گاردنر

۲. اندرلیچ

۱. هارلسون

**۳۶- علت اصلی خوانش پریشی، وجود ناهنجاری هایی در کدام بخش از مغز است؟**

۲. پیش پیشانی - پس سری

۴. گیجگاهی - آهیانه ای

۱. گیجگاهی - پیشانی

۳. آهیانه ای - پیش پیشانی

**۳۷- بر اساس پژوهش های انجام شده، در سبب شناسی کدام نارسایی عوامل پیش از تولد نظیر اختلال جنین الكلی و وزن کم هنگام تولد نقش دارد؟**

۴. اختلال آواشناستی

۳. اختلال ریاضی

۲. اختلال بیان نوشتاری

۱. اختلال خواندن

**۳۸- مکان اصلی درمان نارسایی های تحولی معمولاً کجاست؟**

۲. محیط خانواده

۴. گفتاردرمانی

۱. محیط مدرسه

۳. کلینیک های روان درمانی

**۳۹- روش درمانی دیستار، در درمان کدام یک از اختلالات بکار می‌رود؟**

۴. نارسایی های یادگیری

۳. اختلالات اضطرابی

۲. نارسایی های خلقی

۱. نارسایی های تغذیه

**۴۰- کدام یک از انواع اختلالات یادگیری را دیسلکسی می‌گویند؟**

۴. نارسایی آواشناستی

۳. نارسایی زبان بیانی

۲. نارسایی خوانش پریشی

۱. نارسایی در محاسبه

# 1217243 - 95-96-3

| شماره سؤال | پاسخ صحيح    | وضعیت کلید |
|------------|--------------|------------|
| ۱          | الف          | عادی       |
| ۲          | د            | عادی       |
| ۳          | الف          | عادی       |
| ۴          | ج            | عادی       |
| ۵          | د            | عادی       |
| ۶          | الف          | عادی       |
| ۷          | ج            | عادی       |
| ۸          | الف          | عادی       |
| ۹          | ب            | عادی       |
| ۱۰         | ب            | عادی       |
| ۱۱         | د            | عادی       |
| ۱۲         | ج            | عادی       |
| ۱۳         | د            | عادی       |
| ۱۴         | ج            | عادی       |
| ۱۵         | الف          | عادی       |
| ۱۶         | ب            | عادی       |
| ۱۷         | الف، ب، ج، د | عادی       |
| ۱۸         | ب            | عادی       |
| ۱۹         | الف، ب، ج، د | عادی       |
| ۲۰         | الف          | عادی       |
| ۲۱         | ج            | عادی       |
| ۲۲         | د            | عادی       |
| ۲۳         | الف          | عادی       |
| ۲۴         | د            | عادی       |
| ۲۵         | ب            | عادی       |
| ۲۶         | الف          | عادی       |
| ۲۷         | د            | عادی       |
| ۲۸         | د            | عادی       |
| ۲۹         | الف          | عادی       |
| ۳۰         | ب            | عادی       |
| ۳۱         | ج            | عادی       |
| ۳۲         | الف، ب، ج، د | عادی       |
| ۳۳         | الف          | عادی       |
| ۳۴         | ب            | عادی       |
| ۳۵         | الف، ب، ج، د | عادی       |
| ۳۶         | د            | عادی       |
| ۳۷         | ج            | عادی       |
| ۳۸         | الف          | عادی       |
| ۳۹         | د            | عادی       |
| ۴۰         | ب            | عادی       |

**95-96-2**



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ -

۱- بهنجاری به منزله سلامت به چه معنی بکار برده می شود؟

- ۱. موفقیت آمیز بودن ملاک ها
- ۲. مناسب با تغییرات
- ۳. نبودن بیماری
- ۴. هماهنگی مطلوب بین اجزای گوناگون دستگاه روانی

۲- اختلال مزمنی که مشخصه اصلی آن اضطراب است در طبقه بندی قدیم جزء کدام دسته از اختلالات قرار گرفته است؟

- ۱. سندروم های مغزی
- ۲. روان پریشی
- ۳. روان نژندها
- ۴. اختلال شخصیت

۳- کدامیک از اختلالات زیر جزء اختلالات خلقوی می باشد؟

- ۱. کج خلقوی
- ۲. خرابکاری
- ۳. عدم کنترل ادارار
- ۴. انگشت مکیدن

۴- در کدامیک از الگوهای اختلال های روانی کودکان ، بر انسان و فرآیندهای ذهنی وی تاکید نموده و مواردی چون حافظه ، فرآیندهای یادگیری ، فراموشی از مفاهیم مطرح و اساسی این دیدگاه می باشد؟

- ۱. الگوهای شناختی
- ۲. الگوهای یادگیری
- ۳. روان پویایی
- ۴. زیست شناختی

۵- برای اجرای یک فرمول بندی دقیق از سنجش و ارزیابی اختلالات روانی کودکان ، توانایی در اجرای کدام یک از روش های زیر نخستین و بنیادی ترین گام است؟

- ۱. مشاهده
- ۲. پرسشنامه
- ۳. مصاحبه بالینی
- ۴. تحقیق میدانی

۶- شیوه هایی که مصاحبه گر استفاده می کند تارابطه درمانی ایجاد نموده و اطلاعات را کسب نماید بیانگر کدامیک از ابعاد مصاحبه می باشد؟

- ۱. رابطه
- ۲. تکنیک
- ۳. وضعیت روانی
- ۴. تشخیص

۷- در سنجش رفتاری کدامیک از روش های زیر به عنوان فن اصلی مورداستفاده قرار می گیرد؟

- ۱. پرسشنامه
- ۲. مصاحبه
- ۳. تحقیق میدانی
- ۴. مشاهده

۸- ثبات و پایایی علایم مشکل رفتاری در طول زمان بیانگر کدام اصل می باشد؟

- ۱. تداوم یک رفتار
- ۲. فراوانی یک رفتار
- ۳. شایستگی
- ۴. شدت رفتار

۹- کودکان سالمی که خوب تغذیه شوند از تولد تا یک سالگی چند درصد به قدشان اضافه می شود؟

- |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| ۱. ۰/۱۰ | ۲. ۰/۲۰ | ۳. ۰/۳۵ | ۴. ۰/۵۰ |
|---------|---------|---------|---------|

۱۰- اختلال مهارت های حرکتی معمولا در چه سنی مورد توجه قرار می گیرند؟

- ۱. ۵ تا ۱۱ سالگی
- ۲. ۳ تا ۵ سالگی
- ۳. ۱ تا ۳ سالگی
- ۴. بدو تولد تا یک سالگی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۱- اختلال در زمینه ذخیره لغات، استفاده از زمان های مناسب افعال، ساخت جملات پیچیده و به خاطر سپردن لغات بیان کننده کدامیک از اختلال های ارتباطی می باشد؟

- ۱. اختلال ارتباطی ناشخص
- ۲. اختلال ارتباطی نامشخص
- ۳. اختلال در زبان بیانی
- ۴. اختلال واج شناختی

۱۲- در کدامیک از اختلال های ارتباطی کودک تمایل دارد بسیار کوتاه و مختصراً صحبت نماید؟

- ۱. اختلال در زبان بیانی
- ۲. واج شناختی
- ۳. اختلال ارتباطی نامشخص
- ۴. اختلال در زبان دریافتی - بیانی

۱۳- کدامیک از موارد زیر جزء ملاک های تشخیص لکنت زبان نمی باشد؟

- ۱. تکرار اصوات یا سیلاب ها
- ۲. ذخیره محدود واژگان
- ۳. طولانی کردن اصوات
- ۴. عبارات تعجبی

۱۴- ترس کودک از جدایی از والدین در چه سنی اتفاق می افتد؟

- ۱. ۷ ماهگی
- ۲. سالگی
- ۳. ۱ سالگی
- ۴. ۹ تا ۱۲ سالگی

۱۵- حمله حاد شدید اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع بیانگر کدام اختلال می باشد؟

- ۱. اختلال وسواسی
- ۲. اختلال هراس
- ۳. اختلال هول
- ۴. اختلال استرس

۱۶- منظم کردن مکرر، بازبینی تکراری، تکرار نماز خواندن بدون علت واقعی بیانگر کدام اختلال می باشد؟

- ۱. اضطراب
- ۲. وسواس های عملی
- ۳. هراس
- ۴. اختلال هول

۱۷- سندروم توره با کدامیک از اختلال های زیر ارتباط نزدیک دارد؟

- ۱. وسواسی - جبری
- ۲. استرس
- ۳. اضطراب
- ۴. هراس

۱۸- «پاسخی انطباقی و بهنجار در برابر تهدید که ار گانیسم را برای گریز یا ستیز آماده می کند» بیانگر کدام گزینه است؟

- ۱. ترس
- ۲. هراس
- ۳. استرس
- ۴. اضطراب

۱۹- اضطراب جدایی معمولاً با کدام اختلال همراه است؟

- ۱. اضطراب
- ۲. استرس
- ۳. ترس
- ۴. هراس

۲۰- دوره هیپومانیا حداقل چه مدت طول می کشد؟

- ۱. دوهفته
- ۲. یک هفته
- ۳. ۵ روز
- ۴. چهار روز

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک  
**رشته تحصیلی/گد درس:** امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

-۲۱- نظریه درماندگی آموخته شده پدیده های افسردگی را مربوط به کدام عامل می دانند؟

- ۱. تحریف های شناختی خاص
- ۲. تجربه رویدادهای قابل کنترل
- ۳. تحریف های رفتاری
- ۴. تحریف های رفتاری

-۲۲- جذب مواد غیر خوراکی بالاتر از سن بینجارت نشانه کدام اختلال می باشد؟

- ۱. پرخوری
- ۲. هرزه خواری
- ۳. نشخوارگی
- ۴. بی اشتهايی روانی

-۲۳- استفاده از داروهای ضد روان پریشی نظیر هالو پریدول در درمان کدام اختلال مورد استفاده قرار گرفته و نتایج موفقیت آمیز نیز داشته است؟

- ۱. پرخوری
- ۲. هرزه خواری
- ۳. نشخوارگی
- ۴. بی اشتهايی

-۲۴- اختلال پرخوری در چه سنی بروز می کند؟

- ۱. ۱۵ تا ۱۹ سالگی
- ۲. ۱۰ تا ۱۵ سالگی
- ۳. ۵ تا ۱۰ سالگی
- ۴. ۲ تا ۵ سالگی

-۲۵- درمان رفتار دیالکتیکی یا جدلی در کدامیک از اختلال های زیر مورد استفاده قرار گرفته و تاثیر مثبت خود را نشان داده است؟

- ۱. نشخوارگی
- ۲. بی اشتهايی
- ۳. پرخوری
- ۴. خوردن نامعین

-۲۶- ساده ترین نشانه ای که با کمک آن می توان شکست کودک را در بسیاری از زمینه های تحصیلی پیش بینی کرد؟

- ۱. اختلال زبان بیانی
- ۲. نارسایی خواندن
- ۳. اختلال نوشتاری
- ۴. اختلال آوا شناختی

-۲۷- غلط های انشایی مضاعفی، عدم توجه به نقطه گذاری و جا انداختن گهگاه بخشی از کلمه، نشان دهنده کدامیک از اختلال های زیر می باشد؟

- ۱. بیان نوشتاری
- ۲. نارسایی خواندن
- ۳. زبان بیانی
- ۴. آوا شناختی

-۲۸- با توجه به تخمین های زده شده چند درصد از کودکان مدرسه رو به نارسایی در ریاضی مبتلا هستند؟

- ۱.٪۴
- ۲.٪۳
- ۳.٪۲
- ۴.٪۱

-۲۹- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولا در چه سنی اتفاق می افتد؟

- ۱. ۲ تا ۷ سالگی
- ۲. ۲ تا ۸ سالگی
- ۳. ۵ تا ۷ سالگی
- ۴. ۷ تا ۹ سالگی

-۳۰- شیوه کنترل سرعت گفتار یا کش دادن گفتار برای درمان کدام اختلال مورد استفاده قرار می گیرد؟

- ۱. بیان نوشتاری
- ۲. ریاضی
- ۳. لکنت زبان
- ۴. آوا شناختی

| شماره<br>سؤال | پاسخ صحيح | وضعیت کلید |
|---------------|-----------|------------|
| ۱             | ج         | عادی       |
| ۲             | ج         | عادی       |
| ۳             | ب         | عادی       |
| ۴             | الف       | عادی       |
| ۵             | ج         | عادی       |
| ۶             | ب         | عادی       |
| ۷             | د         | عادی       |
| ۸             | الف       | عادی       |
| ۹             | د         | عادی       |
| ۱۰            | الف       | عادی       |
| ۱۱            | ج         | عادی       |
| ۱۲            | د         | عادی       |
| ۱۳            | ب         | عادی       |
| ۱۴            | ج         | عادی       |
| ۱۵            | ج         | عادی       |
| ۱۶            | ب         | عادی       |
| ۱۷            | الف       | عادی       |
| ۱۸            | د         | عادی       |
| ۱۹            | الف       | عادی       |
| ۲۰            | د         | عادی       |
| ۲۱            | ج         | عادی       |
| ۲۲            | ب         | عادی       |
| ۲۳            | ج         | عادی       |
| ۲۴            | الف       | عادی       |
| ۲۵            | ج         | عادی       |
| ۲۶            | ب         | عادی       |
| ۲۷            | الف       | عادی       |
| ۲۸            | د         | عادی       |
| ۲۹            | الف       | عادی       |
| ۳۰            | ج         | عادی       |

**95-96-1**



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳ -

- اولین درمانگاه روانشناسی که توسط ویتمر در سال ۱۸۹۶، در پنسیلوانیا تاسیس شد، جهت درمان کدام موارد بوده است؟

۲. بزهکاری و لکنت زبان

۱. اختلالات یادگیری و خلقی

۴. روان نژندی و سندروم های معزی

۳. لکنت زبان و اختلالات یادگیری

-۲ در طبقه بندی ایکن باخ، کدام مورد زیر بنای داخلی دارد و زیر عنوان درون ساخت آمده است؟

۴. اعتیاد به الکل

۳. تهوع

۲. دزدی

۱. فرار از مدرسه

-۳ رشد طبیعی به کدام عامل بستگی دارد؟

۱. کنترل هیجانات توسط فرد

۲. محیط و کنترل احساسات توسط فرد

۳. تعامل عملکرد فرد در زمینه های شناختی، هوشی و فیزیکی حرکتی

۴. هماهنگی رشد و تفکیک رفتارهای عادی

-۴ شیوع اختلال در زبان بیانی در سن آغاز دبستان تقریباً چند درصد می باشد؟

۴. ۵ تا ۱۰ درصد

۳. ۳ تا ۷ درصد

۲. ۲ تا ۵ درصد

۱. ۱ تا ۳ درصد

-۵ اختلال آواشناختی با کدام اختلال تداخل پیدا می کند؟

۱. اختلال بیش فعالی

۳. اختلال اضطراب اجتماعی

-۶ کدام دیدگاه اولین مطالعات علمی را به خود اختصاص داده است؟

۴. شناختی

۳. روانکاوی

۲. رفتار گرایی

۱. زیستی

-۷ میزان شیوع مادام العمر اختلال وسواسی - جبری در جمعیت عمومی حدود چند درصد می باشد؟

۴. ۳ تا ۱۳ درصد

۳. ۵ تا ۱۰ درصد

۲. ۳ تا ۵ درصد

۱. ۲ تا ۳ درصد

-۸ کدام اختلال ارتباط نزدیکی با سندروم توره دارد؟

۴. وسواسی - جبری

۳. PTSD

۲. هراس

۱. آگورافوبی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک  
**رشته تحصیلی/گد درس:** امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ -

۹- افراد مبتلا به کدام اختلال معمولاً بیش از اندازه خواهان تایید بوده و نیازمند اطمینان بخشی مفرط درباره عملکردشان و سایر نگرانی هایشان هستند؟

۱. هراس اجتماعی      ۲. هراس      ۳. اضطراب جدایی      ۴. اضطراب فرگیر

۱۰- اختلال دو قطبی محور II، که گونه ای از اختلال دو قطبی می باشد، با کدام دوره ها مشخص می گردد؟

۱. مانیا و هیپومانیا      ۲. افسردگی و مانیا      ۳. افسردگی اساسی و هیپومانیا      ۴. مانیا و دیس تایمی

۱۱- روش های سازماندهی و تفسیر تجارب تعریف کدام عنصر شناختی محسوب می شود؟

۱. شخصی سازی      ۲. طرح کلی      ۳. تعمیم افراطی      ۴. انتزاع اختصاصی

۱۲- برای درمان کودکانی که علت هرزه خواری آنها والدین و روش های ارتباطی والدین با کودک است کدام روش مناسب تری می باشد؟

۱. روش محیطی      ۲. روش های روانی-اجتماعی      ۳. روش رفتاری      ۴. روان درمانی بیانی-حمایتی پویشی

۱۳- هارلسون و همکاران در سال ۲۰۱۰، برای درمان قطعی بی اشتهايی روانی کدام مورد را پیشنهاد کردند؟

۱. کار کردن با خانواده های مبتلایان      ۲. درمان شناختی - رفتاری      ۳. روان درمانی پویشی      ۴. دارو درمانی

۱۴- مبتلایان به کدام اختلال بر این باورند که فاقد مهارت های اجتماعی متناسب هستند؟

۱. بی اشتهايی روانی      ۲. پرخوری روانی      ۳. نشخوار گری      ۴. هرزه خواری

۱۵- کدام شیوه درمانی، درمان مبتلایان به اختلال پرخوری، از پرداختن به موضوعات مربوط به وزن و شکل بدن اجتناب می کند؟

۱. بین فردی      ۲. دارو درمانی      ۳. شناختی - رفتاری      ۴. رفتار دیالکتیکی

۱۶- در کدام مرحله خواب مغز یک نوع الگوی فعالیتی متمایزی از امواج آهسته تر به همراه خیزک های سریعی از امواج نشان می دهد؟

۱. اول      ۲. دوم      ۳. سوم      ۴. چهارم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شهه تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ -

- ۱۷- پانیک جزء علایم کدام اختلال خواب محسوب می شود؟

۴. خواب زدگی

۳. وحشت شباهه

۲. نارکولپسی

۱. آپنه

- ۱۸- بر طبق پژوهش های صورت گرفته با FMRI، کدام بخش از مغز بچه های کوچک مبتلا به دیسلکسی، فعالیت کمتری را در هنگام خواندن نسبت به کودکان عادی نشان می دهد؟

۲. لوب پیشانی فوقانی

۴. لوب پیشانی فوقانی

۱. لوب گیجگاهی تحتانی

۳. لوب پیشانی تحتانی

- ۱۹- کدام نارسایی در ویرایش های قبلی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، اختلال در تولید گفتار نام داشته است؟

۴. دیسلکسی

۳. زبان بیانی

۲. لکنت زبان

۱. آواشناختی

- ۲۰- کدام مورد به مکان اصلی درمان نارسایی های تحولی اشاره دارد؟

۴. مدرسه

۳. مرکز گفتار درمانی

۲. مرکز مشاوره

۱. خانواده

۴. الفایی

۳. آوایی-دیداری

۲. دیستار

۱. تاثیر عصبی

- ۲۱- در کدام روش، بر رابطه نماد با صدا تمکز می شود؟

۴. کلوزاپین

۳. ریتالین

۲. توفرانیل

۱. هالوپریدول

- ۲۲- کدام دارو در درمان بی اختیاری ادرار، مورد استفاده قرار می گیرد؟

۴. ۵۵ تا ۶۵ درصد

۳. ۴۵ تا ۵۰ درصد

۲. ۲۵ تا ۴۰ درصد

۱. ۳۰ درصد

- ۲۳- چند درصد از کودکان در خودمانده، کارکردی در حد کم توان ذهنی عمیق دارند؟

۴. ۵۵ تا ۶۵ درصد

۳. ۴۵ تا ۵۰ درصد

۲. ۲۵ تا ۴۰ درصد

۱. ۳۰ درصد

- ۲۴- سندروم X شکننده که یک بیماری ژنتیکی است با کدام اختلال ارتباط دارد؟

۲. در خودمانندگی

۴. آسپرگر

۱. از هم پاشیدگی کودکی

۳. رت

- ۲۵- داروی فن فلورامین، که در درمان برخی از کودکان در خود مانده موثر می باشد، باعث ایجاد کدام عملکرد در سطح خون می شود؟

۲. سطح سروتونین خون را افزایش می دهد.

۱. سطح نور اپی نفرین خون را کاهش می دهد.

۴. سطح سروتونین خون را کاهش می دهد.

۳. سطح دو پامین خون را کاهش می دهد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک  
**رشته تحصیلی/گد درس:** امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

-۲۶- کدام اختلال از طریق جهش هایی در ژن گردانی پروتئین میتل سی پی جی ایجاد می شود؟

۱. فراگیر رشد نامعین    ۲. آسپرگر    ۳. اوتیسم    ۴. رت

-۲۷- با توجه به نوارهای مغزی و اسکن های مغزی که از کودکان مبتلا به ADHD در مورد نقش عوامل عصبی -فیزیولوژیایی به عمل آمده است کدام مورد با افزایش انگیختگی همراه است؟

۱. کاهش درصد نوار دلتا    ۲. کاهش درصد نوار بتا    ۳. افزایش درصد نوار آلفا    ۴. افزایش درصد نوار دلتا

-۲۸- کدامیک از شیوه های زیر جزء روش های رفتاری است؟

۱. مجاورت    ۲. کنترل خود    ۳. مهارت حل مسئله    ۴. بازی درمانی

-۲۹- در برخی از کودکان مبتلا به اختلال سلوک میزان کدام آنزیم پایین است؟

۱. آنزیمی که سروتونین را به استیل کولین تبدیل کند.  
 ۲. آنزیمی که دوپامین را به سروتونین تبدیل کند.  
 ۳. آنزیمی که نور اپی نفرین را به دوپامین تبدیل کند.  
 ۴. آنزیمی که نور اپی نفرین را به نوراپی نفرین تبدیل کند.

-۳۰- کدام اختلال شامل الگوی پایداری از رفتارهای منفی گرایانه، خصومت آمیز و گستاخانه بدون وجود نقض جدی هنجارهای اجتماعی یا حقوق دیگران می باشد؟

۱. ADHD    ۲. ODD    ۳. سلوک    ۴. رفتار ایدایی نامعین

| رقم<br>السؤال | پاسخ صحيح    | وضعیت کلید |
|---------------|--------------|------------|
| ١             | ج            | عادی       |
| ٢             | ج            | عادی       |
| ٣             | ج            | عادی       |
| ٤             | ج            | عادی       |
| ٥             | د            | عادی       |
| ٦             | الف          | عادی       |
| ٧             | الف          | عادی       |
| ٨             | د            | عادی       |
| ٩             | د            | عادی       |
| ١٠            | ج            | عادی       |
| ١١            | ب            | عادی       |
| ١٢            | ب            | عادی       |
| ١٣            | الف          | عادی       |
| ١٤            | ب            | عادی       |
| ١٥            | الف          | عادی       |
| ١٦            | ب            | عادی       |
| ١٧            | ج            | عادی       |
| ١٨            | ج            | عادی       |
| ١٩            | الف          | عادی       |
| ٢٠            | د            | عادی       |
| ٢١            | الف، ب، ج، د | عادی       |
| ٢٢            | الف، ب، ج، د | عادی       |
| ٢٣            | ج            | عادی       |
| ٢٤            | ب            | عادی       |
| ٢٥            | د            | عادی       |
| ٢٦            | الف، ب، ج، د | عادی       |
| ٢٧            | الف          | عادی       |
| ٢٨            | الف، ب، ج، د | عادی       |
| ٢٩            | د            | عادی       |
| ٣٠            | الف، ب، ج، د | عادی       |

**94-95-3**



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / **کد درس:** امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳ - ۱۲۱۷۱۸۷ -

- انجام عملی برخلاف وجودان و ارزش‌های مورد قبول فرد مربوط به کدامیک از انواع اضطراب بر اساس نظر فروید می‌باشد؟

۴. سایکوتیک

۳. نوروتیک

۲. اخلاقی

۱. واقعی

- آزمون بندر گشتالت مربوط به کدام یک از آزمون‌های زیر می‌باشد؟

۲. ازمونهای پیشرفت تحصیلی

۱. ازمونهای شناوی

۴. ازمون رشد حرکتی

۳. ازمونهای بینایی

- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می‌شود؟

۴. ۲ درصد

۳. ۳ درصد

۲. ۷ درصد

۱. ۵ درصد

- کودک دارای این اختلال تمایل دارد بسیار کوتاه و مختصر صحبت نماید که با حذف کردن بعضی از اشکال دستور زبان مانند ماضی گذشته همراه می‌باشد؟

۲. لکنت زبان

۱. واج شناختی

۴. اختلال در زبان دریافتی - بیانی

۳. اختلال در زبان بیانی

- ویژگی اصلی کدام یک از اختلالات ارتباطی زیر نقص در تلفظ می‌باشد؟

۴. لکنت زبان

۳. آواشناختی

۲. موتیسم

۱. ارتباطی نامشخص

۴. اضطراب جدایی

۳. استرس پس از سانحه

۲. وسواسی - جبری

۱. پانیک

- ترس شدید از محرك یا موقعیتی که غالب مردم خطر خاصی در آن نمی‌بینند تعریف کدام اختلال زیر است؟

۴. هول

۳. وسواسی - جبری

۲. هراس اجتماعی

۱. هراس

- دروغ افسردگی اساسی باید لااقل چند هفته طول بکشد تا اختلال افسردگی اساسی محسوب گردد؟

۴. ۶ هفته

۳. ۵ هفته

۲. ۲ هفته

۱. ۳ هفته

- دوره مشخص از خلق که دائماً به شکل غیر طبیعی بالا، گشاده یا تحریک پذیر می‌باشد چه نام دارد؟

۴. خلق ادواری

۳. شیدایی

۲. هیپومانی

۱. افسردگی

- برگرداندن مکرر غذا به دهان بر اساس انقباض معده‌ای و نشخوار طولانی آن از ویژگی‌های اصلی کدام اختلال زیر است؟

۴. پر اشتهاي عصبي

۳. هرزه خواری

۲. نشخوار

۱. بي اشتهاي عصبي

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۱- اختلال تغذیه‌ای شیر خوارگی یا اوایل کودکی قبل از چند سالگی بروز می‌کند؟

۴. قبل از ۵ سالگی

۳. قبل از ۴ سالگی

۲. قبل از ۲ سالگی

۱. قبل از ۶ سالگی

۱۲- پژوهش‌های اخیر بر استفاده کدام یک از داروها در درمان بی‌اشتهاای عصبی تاکید کرده‌اند؟

۴. ضد التهاب

۳. محرك

۲. ضد افسردگی

۱. ضد اضطراب

۱۳- خواب به طور اختصاصی به چند مرحله تقسیم می‌شود؟

۵. ۴

۴. ۳

۳. ۲

۲. ۱

۱۴- نارکولپسی مربوط به کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

۴. بی‌خوابی

۳. خوابگردی

۲. وقفه تنفسی

۱. حمله خواب

۱۵- در نخستین هفته‌های زندگی، آهنگ بیداری - خواب از توالی چرخه‌های چند دقیقه‌ای تشکیل شده است؟

۴. ۲۵ دقیقه‌ای

۳. ۴۵ دقیقه‌ای

۲. ۷۰ دقیقه‌ای

۱. ۹۰ دقیقه‌ای

۱۶- کدام یک از مراحل خواب مربوط به نمایان شدن دوک‌ها می‌باشد؟

۴. سوم

۳. پنجم

۲. دوم

۱. چهارم

۱۷- بنا به نظر برخی متخصصین کدام یک از گزینه‌های زیر اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس به حساب می‌آید؟

۴. نارسایی خواندن

۳. نارسایی نوشتن

۲. نارسایی در محاسبه

۱. نارسایی زبان بیانی

۱۸- دیسکلکتو لی مربوط به کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

۴. نارسایی در شنیدن

۳. نارسایی در خواندن

۲. نارسایی در نوشتن

۱. نارسایی در محاسبه

۱۹- بیشترین وقوع لکنت زبان را در چند سالگی برآورد کرده‌اند؟

۴. ۵ سالگی

۳. ۲ سالگی

۲. ۷ سالگی

۱. ۳ سالگی

۲۰- بر اساس دیدگاه رفتار گرایی کلاسیک لکنت زیان چگونه رفتاری می‌باشد؟

۴. بازتابی

۳. شناختی

۲. اکتسابی

۱. ذاتی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

-۲۱ وقتی رفتارهای لجبازی و نافرمانی یا اختلال سلوک یا اختلال نافرمانی مقابله جویانه مطابقت ندارد تشخیص کدام اختلال داده می شود؟

- ۱. اختلال نافرمانی مقابله جویانه
- ۲. مبتلایان به اختلال کم توجهی بیش فعالی
- ۳. اختلال سلوک
- ۴. اختلال رفتار ایدایی نامعین

-۲۲ در کدام دوران اهمیت آموزش رسمی به مفهوم رشد برای اغلب کودکانی که دارای معلولیت های ذهنی یا جسمی بودند مورد توجه بیشتری قرار گرفت؟

- ۱. رنسانس در اروپا
- ۲. قرون وسطی
- ۳. دهه اول قرن بیستم
- ۴. رنسانس

-۲۳ ویژگی مشترک همه روان درمانی ها کدام مورد زیر است؟

- ۱. بررسی رویاهای
- ۲. تشخیص
- ۳. رابطه
- ۴. آزمون ها

-۲۴ کودکان دارای اختلال رشد هماهنگی به دلیل اینکه در بازی کردن و ورزش از سایر کودکان هم سن و سال خود ضعیف تر هستند از افسردگی رنج می بوند زیرا؟

- ۱. این کودکان ژنتیکی از افسردگی رنج می بوند.
- ۲. این کودکان به دلیل اختلال در سیستم عصبی حرکتی دارای افسردگی هستند.
- ۳. از طرف همسالان خود آنچنان که باید پذیرفته نمی شوند.
- ۴. به دلیل افسردگی والدین این کودکان نیز دارای افسردگی هستند.

-۲۵ اکثر کودکان کنترل مثانه را بین چند سالگی بدست می آورند؟

- ۱. ۱ تا ۲ سالگی
- ۲. ۲ تا ۳ سالگی
- ۳. ۳ تا ۴ سالگی
- ۴. ۲/۵ تا ۳/۵ سالگی

-۲۶ بر اساس DSM - IV - TR تقریباً چند درصد از کودکان ۵ ساله بی اختیاری مدفوع دارند؟

- ۱. ۴
- ۲. ۳
- ۳. ۲
- ۴. ۱

-۲۷ کدام مورد درمانی زیر، در درمان اختلال در خودماندگی باعث به دست آوردن نمرات برتر هوشی می شود؟

- ۱. شیمی درمانی
- ۲. رفتار درمانی
- ۳. رژیم درمانی
- ۴. دارو درمانی

-۲۸ کدام یک از اختلال های زیر بسیار نادر بوده و بیشتر در دختران دیده می شود؟

- ۱. آسپرجر
- ۲. اوتیسم
- ۳. رت
- ۴. از هم پاشیدگی دوران کودکی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مردمی کودک و شهه تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

-۲۹- مشخصه کدام یک از اختلال های زیر پسرفت باز در زمینه های متعدد عملکردی پس از ۲ سال رشد ظاهرها طبیعی می باشد؟

- ۱. رت
- ۲. از هم پاشیدگی دوران کودکی
- ۳. آسپرجر
- ۴. اوتیسم

-۳۰- رفتار بدون تفکر مربوط به کدام یک از نشانه های ADHD می باشد؟

- ۱. بی توجهی
- ۲. بیش فعالی
- ۳. عدم تمرکز
- ۴. تکانش گری

| شماره<br>سؤال | پاسخ صحيح | وضعیت کلید |
|---------------|-----------|------------|
| ۱             | ب         | عادی       |
| ۲             | ج         | عادی       |
| ۳             | الف       | عادی       |
| ۴             | د         | عادی       |
| ۵             | ج         | عادی       |
| ۶             | ب         | عادی       |
| ۷             | الف       | عادی       |
| ۸             | ب         | عادی       |
| ۹             | ج         | عادی       |
| ۱۰            | ب         | عادی       |
| ۱۱            | الف       | عادی       |
| ۱۲            | ب         | عادی       |
| ۱۳            | د         | عادی       |
| ۱۴            | الف       | عادی       |
| ۱۵            | ج         | عادی       |
| ۱۶            | ب         | عادی       |
| ۱۷            | د         | عادی       |
| ۱۸            | الف       | عادی       |
| ۱۹            | د         | عادی       |
| ۲۰            | ب         | عادی       |
| ۲۱            | د         | عادی       |
| ۲۲            | ب         | عادی       |
| ۲۳            | ج         | عادی       |
| ۲۴            | ج         | عادی       |
| ۲۵            | ب         | عادی       |
| ۲۶            | د         | عادی       |
| ۲۷            | ب         | عادی       |
| ۲۸            | ج         | عادی       |
| ۲۹            | ب         | عادی       |
| ۳۰            | د         | عادی       |

**94-95-2**



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷ -

۱- در طبقه بندی جدید اختلالات روانی کدام گزینه مربوط به اختلالات خلقی می باشد؟

۴. تیک های عصبی

۳. مدرسه گریزی

۲. انگشت مکیدن

۱. عدم کنترل ادرار

۲- در نظریه فروید اضطراب در ایجاد بیماری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و به سه نوع تقسیم می شود. عدم تعادل بین عناصر شخصیتی (من-نهاد-من برتر) جزء کدام نوع اضطراب است؟

۴. اضطراب شخصیتی

۳. اضطراب اخلاقی

۲. اضطراب نروتیک

۱. اضطراب واقعی

۳- از کدام گزینه به عنوان فن اصلی در سنجش رفتاری استفاده می شود؟

۴. طبقه بندی اختلالات

۳. ارزیابی شخصیت

۲. مشاهده رفتار

۱. مصاحبه بالینی

۴- شیوه هایی که مصاحبه گر استفاده می کند تا رابطه درمانی را ایجاد نموده و اطلاعات را کسب نماید؟

۴. وضعیت روانی

۳. تشخیص

۲. تکنیک

۱. رابطه

۵- کدام گزینه در همه گیرشناختی نشانه های اختلال رشد هماهنگی صحیح می باشد؟

۱. نشانه های آن در سنین ۱۱-۵ سال مورد توجه قرار می گیرد.

۲. در ۱۵٪ از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود.

۳. دخترها بیشتر از پسرها به این اختلال مبتلا می شوند.

۴. کودکان مبتلا در بازی و ورزش قوی تراز همسالان خود هستند.

۶- روش درمانی مناسب برای اختلال رشد هماهنگی می باشد؟

۲. برنامه های آموزش جسمانی

۱. برنامه های توانبخشی

۴. برنامه های آموزش جسمانی و حسی

۳. برنامه های آموزش حسی

۷- شیوع اختلال در زبان بیانی در چه سنینی ۷، ۴ در صد بر اورد شده است؟

۴. ۵-۶ سال

۳. ۲-۴ سال

۲. ۳-۵ سال

۱. ۴-۶ سال

۸- نوعی اختلال گفتاری است که مشکل عمده در آن عدم توانایی برقراری ارتباط به شکل آسان، با سرعت مناسب، و بطور پیوسته می باشد؟

۲. لکنت زبان

۱. اختلال در زبان بیانی

۴. اختلال واژ شناسی

۳. اختلال ارتباطی نامشخص

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک  
**وشته تحصیلی/گد درس:** امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

۹- نوعی از اختلالات زبانی که کودک در برقراری ارتباط، تعامل اجتماعی دو طرفه، بازی های سمبولیک و خلاق مشکل دارد.

۱. عقب ماندگی ذهنی      ۲. اختلال شنوایی      ۳. اوتیسم      ۴. اختلال بینایی

۱۰- از شایع ترین طبقات اختلالات روانی می باشد، به نحوی که از هر چهار نفر یک نفر واجد ملاک های تشخیصی آن است؟

۱. اختلالات اضطرابی      ۲. اختلالات مهارت‌های حرکتی      ۳. اختلالات ارتباطی      ۴. اختلالات خلقی

۱۱- ترس از تنها بودن در اماکن عمومی چه نوع اختلال روانی می باشد؟

۱. اختلال پانیک      ۲. اختلال وحشتزدگی      ۳. اختلال بازار هراسی      ۴. اختلال تورت

۱۲- مبتلایان به کدام اختلال اضطرابی، می ترسند که دیگران آنها را به عنوان افرادی مضطرب، ناتوان، آشفته یا گیج قلمداد کنند؟

۱. اختلال هراس اجتماعی      ۲. اختلال وسواس اجباری      ۳. اختلال اضطراب فراگیر      ۴. اختلال پانیک

۱۳- چه چیزی اساس عملکرد ما را تشکیل می دهد و بدون آنها ما انگیزه و توانی برای فعالیت های روزمره خود نداریم؟

۱. خلق و هیجان ها      ۲. تفکر و هیجان ها      ۳. خلق و شخصیت      ۴. هیجان ها و اختلالات

۱۴- به حالت ناراحتی فراگیر، نوعی احساس اندوه، غم و دلتگی گفته می شود. از جهت شیوع آن به سرماخوردگی بیماری های روانی تشبیه شده است؟

۱. افسردگی      ۲. شیدایی      ۳. اضطراب      ۴. اختلالات خلقی

۱۵- هارلسون و همکاران درمان قطعی بی اشتهایی روانی را چه روشی می دانند؟

۱. درمان شناختی-رفتاری      ۲. دارو درمانی      ۳. کار کردن با خانواده های مبتلایان      ۴. هارلسون و همکاران درمان قطعی بی اشتهایی روانی را چه روشی می دانند؟

۱۶- نوعی اختلال تغذیه ای است که در خلال نوجوانی بین ۱۵ تا ۱۹ سالگی بروز می کند؟

۱. اختلال نشخوار      ۲. اختلال هرزه خواری      ۳. اختلال بی اشتهایی روانی      ۴. اختلال پرخوری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۷- ویژگی مرحله سوم و چهارم خواب می باشد؟

- ۱. حرکات سریع چشم ها
- ۲. امواج سریع مغزی
- ۳. حالتی بین خواب و بیداری
- ۴. خواب عمیق

۱۸- نوعی از اختلال خواب که در آن تنفس شخص در خواب قطع می شود، این عارضه در اطفال و سالمندان بالای ۶۵ سال و افراد چاق رایج است؟

- ۱. آپنه
- ۲. بی خوابی
- ۳. خوابگردی
- ۴. حمله خواب

۱۹- بد ادراری های مکرر همراه با ترس به همراه یادآوری ترس ها در نیمه شب، علایم کدام اختلال خواب است؟

- ۱. اختلال حمله خواب
- ۲. اختلال وحشت در خواب
- ۳. اختلال خواب گردی

۲۰- مشکلات در کدام نارسایی یادگیری، اساسی ترین عامل شکست تحصیلی مدارس می باشد؟

- ۱. نارسایی خواندن
- ۲. نارسایی نوشتن
- ۳. نارسایی ریاضی
- ۴. نارسایی زبان بیانی

۲۱- کدام گزینه در خصوص کودکان دارای نارسایی ریاضی صحیح می باشد؟

- ۱. تشخیص نمادهای عددی
- ۲. دارای هوش بهر، و حافظه کوتاه مدت خوب
- ۳. رعایت توالی مراحل محاسبه
- ۴. مهارت در ادراک فضایی

۲۲- آغاز ناگهانی لکنت زبان در چه سنینی اتفاق می افتد؟

- ۱. ۲-۳ سالگی
- ۲. ۲-۷ سالگی
- ۳. ۵-۷ سالگی
- ۴. ۶-۱۱ سالگی

۲۳- این اختلال در برگیرنده خطاهایی در تولید آوا می باشد؟

- ۱. لکنت زبان
- ۲. نارسایی واژ شناسی
- ۳. نارسایی یادگیری
- ۴. نارسایی بیانی

۲۴- OCD مربوط به کدام یک از اختلال های زیر می باشد؟

- ۱. افسردگی
- ۲. بی اشتهای روانی
- ۳. اضطراب
- ۴. وسواس

۲۵- اکثر کودکان با بی اختیاری ادراری چه مشکلاتی دارند؟

- ۱. مشکلات روان شناختی
- ۲. مشکلات عاطفی
- ۳. مشکلات عضوی
- ۴. مشکلات فیزیولوژیکی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک  
وشته تحصیلی/گد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

۲۶- از روش های رفتاری برای درمان نارسایی ب اختیاری ادرار است؟

۱. تنبیه  
۲. آموزش اتساع مثانه  
۳. استفاده از داروهای ضد افسردگی  
۴. استفاده از مسهل ها

۲۷- کودکانی که به افراد و محیط واکنش نشان نمی دهند، و در آغوش والدینشان آرام نمی گیرند، دچار کدام اختلال روانی می باشند؟

۱. اختلال اوتیسم

۲. اختلال رت

۳. اختلال آسپرگر

۲۸- کودکان مبتلا به این اختلال تا حدود ۳ سالگی رشد طبیعی دارند؟

۱. رت

۲. اوتیسم

۳. اسپرگر

۲۹- مهمترین مشکل توجه در کودکان است و به فرد کمک می کند که محرک های دیگر را کنترل کند و فقط به یک محرک پاسخ دهد؟

۱. توجه پایدار

۲. توجه انتخابی

۳. بی توجهی

۴. کم توجهی

۳۰- از نشانه های بیش فعالی کودکان مبتلا به ADHD است؟

۱. غالباً زیاد حرف می زند.

۲. کارهایشان را با بی دقیقی انجام می دهند.

۳. غالباً اشیا انجام تکالیف را گم می کنند.

۴. غالباً فراموش کار هستند.

| شماره سوال | پاسخ صحيح | وضعیت کلید |
|------------|-----------|------------|
| 1          | ج         | عادی       |
| 2          | ب         | عادی       |
| 3          | ب         | عادی       |
| 4          | ب         | عادی       |
| 5          | الف       | عادی       |
| 6          | د         | عادی       |
| 7          | الف       | عادی       |
| 8          | ب         | عادی       |
| 9          | ج         | عادی       |
| 10         | الف       | عادی       |
| 11         | ج         | عادی       |
| 12         | الف       | عادی       |
| 13         | الف       | عادی       |
| 14         | الف       | عادی       |
| 15         | د         | عادی       |
| 16         | د         | عادی       |
| 17         | د         | عادی       |
| 18         | الف       | عادی       |
| 19         | ج         | عادی       |
| 20         | الف       | عادی       |
| 21         | ب         | عادی       |
| 22         | ب         | عادی       |
| 23         | ب         | عادی       |
| 24         | د         | عادی       |
| 25         | ب         | عادی       |
| 26         | ب         | عادی       |
| 27         | الف       | عادی       |
| 28         | ج         | عادی       |
| 29         | الف       | عادی       |
| 30         | الف       | عادی       |

**94-95-1**



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / **کد درس:** امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳ - ۱۲۱۷۱۸۷ -

۱- کدام یک از افراد زیر بر عقده حقارت معتقد بود.

۴. انا فروید

۳. یونگ

۲. آدلر

۱. فروید

۲- مواردی همچون حافظه، فرایندهای یادگیری، فراموشی، تصمیم‌گیری و ... از مفاهیم مطرح و اساس این دیدگاه می‌باشد.

۴. الگوی روان کاوی

۳. الگوی رفتاری

۲. الگوی یادگیری

۱. الگوی شناختی

۳- آخرین بعد از ابعاد مصاحبه بالینی کدام گزینه می‌باشد.

۴. تکنیک

۳. وضعیت روانی

۲. تشیخص

۱. رابطه

۴- ازمون بندر گشتالت مربوط به کدام گزینه می‌باشد.

۲. آزمون روان شناختی

۴. آزمون بینایی

۱. آزمون شناوی

۳. آزمون پیشرفت تحصیلی

۵- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می‌شود.

۴. ۵ درصد

۳. ۱۰ درصد

۲. ۱۵ درصد

۱. ۲۰ درصد

۶- کناره گیری اجتماعی و برخی اختلالات روانی مانند نارسایی توجه، بیش فعالی، دیسلکسی و اوتیسم عموماً با این اختلال همراه است.

۴. رشد دریافتی

۳. فرآگیر رشد

۲. رشد زبان بیانی

۱. رشد هماهنگی

۴. تنها

۳. موتسیم

۲. لکنت زبان

۱. اوتیسم

۷- مهمترین مشکل این کودکان نقص در برقراری ارتباط است.

۴. فرآگیر رشد

۳. دریافتی

۲. واج شناختی

۱. بیانی

۸- ویژگی اصلی این اختلال نقص در تلفظ می‌باشد.

۴. ۳-۲

۳. ۴-۳

۲. ۵

۱. ۶

۹- نقطه اوج لکنت زبان در چند سالگی است.

۴. بازار هراسی

۳. وحشت زدگی

۲. ترس از بلندی

۱. پانیک

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

-۱۱ OCD علامت اختصاری کدام اختلال می باشد.

۱. پانیک      ۲. وسواسی - جبری      ۳. رشد فراگیر      ۴. اضطرابی

-۱۲ کدام یک از اختلال های زیر ارتباط نزدیکی با سندروم توره دارد

۱. ترس      ۲. اضطراب      ۳. وسواسی جبری      ۴. رت

-۱۳ اضطراب نامناسبی است با سن ، شدید، ناتوان کننده که به دلیل جدایی از والدین دوری از خانه بروز می کند

۱. هراس      ۲. اضطراب جدایی      ۳. اضطراب فراگیر      ۴. اضطراب اجتماعی

-۱۴ بقراط مالیخولیا را به عنوان نوعی افسردگی ناشی از غلبه کدام مزاج ذکر کرده است.

۱. بلغم      ۲. سودا      ۳. دمو      ۴. صfra

-۱۵ کدام یک از اختلالات خلق به جهت شیوع به سرماخوردگی بیماریهای روانی نیز معرفی می شود.

۱. مانیا      ۲. افسردگی      ۳. دو قطبی      ۴. خلق ادواری

-۱۶ منظور از این اصطلاح جذب مواد غیر خوراکی بالاتر از سن بھنجار است.

۱. پر اشتهایی عصبی      ۲. بی اشتهایی عصبی      ۳. نشخواری      ۴. هزه خواری

-۱۷ این اختلال بر اساس بر انگیختی ناگهانی ، مقاومت نا پذیر و مهار شدنی نسبت به خوردن مشخص می شود و مدت آن محدود می باشد.

۱. بی اشتهایی روانی      ۲. اختلال پرخوری      ۳. هرزه خواری      ۴. نشخواری

-۱۸ خواب به طور اختصاصی به چند مرحله تقسیم می شود.

۱. ۲      ۲. ۳      ۳. ۴      ۴. ۵

-۱۹ اختلالی است که در آن تنفس اشخاص در خواب قطع می شود ، چون نای بسته می شود.

۱. آپنه      ۲. حمله خواب      ۳. بی خوابی      ۴. خوابگردی

-۲۰ این نارسایی در ویرایش های قبلی راهنمای تشخیصی و اماری اختلالات روانی (DSM) اختلال در تولید گفتار نام دارد.

۱. لکت زبان      ۲. نارسایی آواشناختی      ۳. نارسا خوانی      ۴. میان نوشتاری

-۲۱ کدام یک از سندرم های زیر بیشتر به سن بالای مادر ارتباط دارد.

۱. داون      ۲. X شکننده      ۳. تی ساکس      ۴. فنیل کتو نور یا

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

-۲۲ PkU مربوط به کدام یک از سندرم های زیر می باشد.

۱. داون      ۲. X شکننده      ۳. فنیل کتو نوریا      ۴. تی ساکس

-۲۳ کودکانی که از این بیماری رنج می برد معمولاً رشد کندی دارند، نارسایی ذهن داشته و هیکل کوچکی دارند.

۱. کرتینیسم      ۲. اکرومگالی      ۳. نانیسم      ۴. زیگانتیسم

-۲۴ بی اختیاری ادرار باید حداقل چند بار در هفته و به مدت لااقل چند ماه اتفاق بیافتد.

۱. ۱ بار - ۲ ماه      ۲. ۲ بار - ۳ ماه      ۳. ۳ بار - ۴ ماه      ۴. ۲ بار ۵ ماه

-۲۵ سن تقویمی برای بی اختیاری مدفوع کدام گزینه می باشد.

۱. ۲ سالگی      ۲. ۳ سالگی      ۳. ۴ سالگی      ۴. ۳ سالگی

-۲۶ عبارت است از اختلال در رفتار اجتماعی، تکلم، وزبان، رفتار تشریفاتی و اصرار بر یکنواختی، نا بهنجاریهایی در پاسخ به محیط فیزیکی، عاطفه نا مناسب

۱. موتسیم      ۲. اتیستیک      ۳. لکنت زبان      ۴. بیانی - دریافتی

-۲۷ این اختلال بسیار نادر بوده و بیشتر در دختران دیده می شود.

۱. اسپر گر      ۲. اوتسیم

۳. از هم پاشیدگی کودکی      ۴. رت

-۲۸ درمان این نوع اختلال به عملکرد انطباقی فرد مبتلا بستگی دارد.

۱. اسپر گر      ۲. رت      ۳. اسکیزوفرنی      ۴. افسردگی

-۲۹ در اختلال کم توجهی / بیش فعالی صاحب نظران معمولاً کدام گزینه را رفتار تفکر در نظر می گیرند

۱. بی توجهی      ۲. تکانش گری      ۳. بیش فعالی      ۴. کمبود توجه

-۳۰ این اختلال معمولاً به الگوی رفتار ضد اجتماعی غیر قابل کنترل کودک یا نوجوانان اطلاق می شود.

۱. رفتار ایدایی      ۲. بیش فعالی      ۳. نافرمانی      ۴. سلوک

| شماره<br>سؤال | ياسخ صحيح | وضعية كليد |
|---------------|-----------|------------|
| 1             | ب         | عادي       |
| 2             | الف       | عادي       |
| 3             | ب         | عادي       |
| 4             | د         | عادي       |
| 5             | د         | عادي       |
| 6             | ب         | عادي       |
| 7             | الف       | عادي       |
| 8             | ب         | عادي       |
| 9             | ج         | عادي       |
| 10            | د         | عادي       |
| 11            | ب         | عادي       |
| 12            | ج         | عادي       |
| 13            | ب         | عادي       |
| 14            | د         | عادي       |
| 15            | ب         | عادي       |
| 16            | د         | عادي       |
| 17            | ب         | عادي       |
| 18            | د         | عادي       |
| 19            | الف       | عادي       |
| 20            | ب         | عادي       |
| 21            | الف       | عادي       |
| 22            | ج         | عادي       |
| 23            | الف       | عادي       |
| 24            | ب         | عادي       |
| 25            | ج         | عادي       |
| 26            | ب         | عادي       |
| 27            | د         | عادي       |
| 28            | الف       | عادي       |
| 29            | ب         | عادي       |
| 30            | د         | عادي       |

**93-94-3**



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷ -

۱- کدام محور زیر بیماری فرد را بر اساس راهنمای DSM-IV TR ارزیابی نمی کند؟

- ۱. تشخیص بیماریها
- ۲. تشخیص اختلال شخصیت
- ۳. تشخیص بیماری های خانوادگی
- ۴. ارزیابی محیط اجتماعی فرد

۲- عدم تعادل بین عناصر شخصیتی من - نهاد - من برتر کدام نوع اضطراب را نشان می دهد؟

- ۱. اضطراب واقعی
- ۲. اضطراب نروتیک
- ۳. اضطراب اخلاقی
- ۴. اضطراب شناور

۳- از نظر فروید مکانیزم های دفاعی برای چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرند؟

- ۱. کاهش افسردگی
- ۲. کاهش اضطراب
- ۳. کاهش دردهای جسمی
- ۴. کاهش اختلالات

۴- کدام الگوی زیر در خصوص رشد شخصیت بر انسان و فرایندهای ذهنی وی تأکید می کند؟

- ۱. الگوی یادگیری
- ۲. الگوی روان پویایی
- ۳. الگوی زیست شناختی
- ۴. الگوی شناختی

۵- کدام دارو در حال حاضر بیش از ۶٪ داروهای تجویز شده برای کودکان را تشکیل می دهد؟

- ۱. بنزدرين
- ۲. فلوکسیدین
- ۳. ریتالین
- ۴. ایمی پرامین

۶- به چه دلیل مصاحبه را می توان مهم ترین ابزار سنجش ، تحقیق ، مداخله و ارزیابی دانست؟

- ۱. وجود عناصری مانند مشاهده و صحبت کردن و گوش دادن
- ۲. وجود عناصری مانند مشاهده و پرسش و گوش دادن
- ۳. وجود عناصری مانند دیدن و گوش دادن
- ۴. وجود عناصری مانند ارزیابی و صحبت کردن و گوش دادن

۷- کدام مورد زیر در سنجش رفتاری به عنوان فن اصلی استفاده می شود؟

- ۱. تکنیک
- ۲. آزمون
- ۳. رابطه
- ۴. مشاهده

۸- اساس تشخیص بسیاری از اختلالات شخصیت ، اختلالات رشدی و اختلالات هوشی کدام مورد زیر است؟

- ۱. مصاحبه
- ۲. تکنیک
- ۳. رابطه
- ۴. آزمون ها

۹- آزمون بندر گشتالت در کدام دسته از آزمون ها قرار می گیرد؟

- ۱. شنیداری
- ۲. بینایی
- ۳. پیشرفت تحصیلی
- ۴. حرکتی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۰- کدام موارد زیر در کودکانی که دچار اختلال رشد هماهنگی هستند بیشتر دیده می شود؟

- ۱. بیش فعالی - اوتیسم
- ۲. رت - اوتیسم
- ۳. بیش فعالی - ناتوانی ذهنی
- ۴. اختلالات تکلم و زبان - اختلالات بیش فعالی

۱۱- اختلال در زبان بیانی از نوع اکتسابی در نتیجه کدام مورد زیر می تواند بوجود آید؟

- ۱. بیماری اوتیسم
- ۲. بیماری عصبی
- ۳. بیماری وراثتی
- ۴. بیماری بیش فعالی

۱۲- مهمترین مشکل کودکان اوتیسم کدام مورد زیر است؟

- ۱. اختلال در بینایی
- ۲. اختلال در حرکت
- ۳. نقص در برقراری ارتباط
- ۴. اختلال شنیداری

۱۳- کدام مورد زیر با صدمه مغزی در ارتباط است؟

- ۱. آپرالکسی
- ۲. چاقی
- ۳. افسردگی
- ۴. اضطراب

۱۴- شیوع لکنت زبان در طول زندگی همه افراد و در جمعیت کلی به ترتیب حدود چند درصد برآورد شده است؟

- ۱. ۵ درصد و ۲ درصد
- ۲. ۳ درصد و ۶ درصد
- ۳. ۵ درصد و ۱ درصد
- ۴. ۴ درصد

۱۵- از نظر کدام دیدگاه شرایطی مانند مجاورت می تواند منجر به یادگیری علائم اضطراب در ارگانیزم موجود زنده شود؟

- ۱. شناختی
- ۲. زیستی
- ۳. رفتارگرایی
- ۴. روان پویشی

۱۶- کدام مورد زیر در بروز اختلال وسوس فکری و عملی دخیل هستند؟

- ۱. کژتنظیمی آدرنالین
- ۲. کژتنظیمی تیروکسین
- ۳. کژتنظیمی سروتونین
- ۴. کژتنظیمی دوپامین

۱۷- مدت دوره مانیا چقدر است؟

- ۱. لااقل یک ماه
- ۲. کمتر از دو ماه
- ۳. لااقل یک هفته
- ۴. کمتر از یک ماه و نیم

۱۸- کدام اختلال در بین اختلالات روانپزشکی بالاترین شیوع طول عمر (حدود ۱۷ درصد) را دارد؟

- ۱. اختلالات اضطرابی
- ۲. اختلالات خلقی
- ۳. اختلالات شخصیت
- ۴. عقب ماندگی ذهنی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

-۱۹- در کدام اختلال زیر اهمیت نوع تعامل بین شیرخوار و مراقب را نشان می دهد؟

- ۱. اوتیسم کودکی
- ۲. اختلالات تغذیه ای در دوره شیرخواری
- ۳. رت
- ۴. MR.

-۲۰- کدام اختلال زیر گذرا است و معمولاً چند ماه طول می کشد؟

- ۱. اوتیسم
- ۲. هرزه خواری
- ۳. رت
- ۴. MR.

-۲۱- کدام دسته از اختلالات زیر مشکلات خواب دارند؟

- ۱. افسردگی
- ۲. اوتیسم
- ۳. رت
- ۴. نشخواری

-۲۲- در کدام اختلال زیر تنفس اشخاص در خواب قطع می شود؟

- ۱. کابوس
- ۲. خوابگردی
- ۳. آپنه
- ۴. نارکولپسی

-۲۳- ویژگی هایی مانند جابجایی یا حذف حروف یا کلمات مشخص مربوط به کدام اختلال زیر است؟

- ۱. اوتیسم
- ۲. نارسایی خواندن
- ۳. نارسایی نوشتن
- ۴. نارسایی در محاسبه

-۲۴- نارسایی زبان بیانی از کدام سنین قابل تشخیص است؟

- ۱. ۵ تا ۷ سالگی
- ۲. ۴ تا ۶ سالگی
- ۳. ۳ تا ۴ سالگی
- ۴. ۲ تا ۳ سالگی

-۲۵- کدام بیماری زیر یک نوع اختلال متابولیکی محسوب می شود؟

- ۱. اوتیسم
- ۲. نشخواری
- ۳. آپنه
- ۴. تای سکس

-۲۶- نشانه هایی مانند چشمان کج، بینی کوتاه، پلک های افتاده از نشانگان کدام مورد زیر است؟

- ۱. فنیل کتونوریا
- ۲. کرتینیسم
- ۳. جنین الکلی
- ۴. تای ساکس

-۲۷- در درمان اختلال بی اختیاری دفع کدام داروهای زیر مورد استفاده قرار می گیرند؟

- ۱. داروهای ضد اضطراب
- ۲. داروهای ضد افسردگی
- ۳. ریتالین
- ۴. دیازپام

-۲۸- پژواک گویی تاخیری در کدام اختلال زیر دیده می شود؟

- ۱. تای ساکس
- ۲. اوتیسم
- ۳. فنیل کتونوریا
- ۴. آپنه

-۲۹- رژیم غذایی فاقد گلوتین و کازئین برای درمان کدام اختلال استفاده می شود؟

- ۱. نارکولپسی
- ۲. آپنه
- ۳. کرتینیسم
- ۴. در خود ماندگی

سری سوال: ۱: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

-۳۰- رایج ترین دارویی که برای کودکان دارای اختلال کم توجهی / بیش فعالی مورد استفاده قرار می گیرد کدام است؟

۴. آپرازولام

۳. دیازپام

۲. ریتالین

۱. فلوکسیدین

| شماره<br>سؤال | پاسخ صحیح | وضعیت کلید |
|---------------|-----------|------------|
| 1             | ج         | عادی       |
| 2             | ب         | عادی       |
| 3             | ب         | عادی       |
| 4             | د         | عادی       |
| 5             | ج         | عادی       |
| 6             | ب         | عادی       |
| 7             | د         | عادی       |
| 8             | د         | عادی       |
| 9             | ب         | عادی       |
| 10            | د         | عادی       |
| 11            | ب         | عادی       |
| 12            | ج         | عادی       |
| 13            | الف       | عادی       |
| 14            | ج         | عادی       |
| 15            | ج         | عادی       |
| 16            | ج         | عادی       |
| 17            | ج         | عادی       |
| 18            | ب         | عادی       |
| 19            | ب         | عادی       |
| 20            | ب         | عادی       |
| 21            | الف       | عادی       |
| 22            | ج         | عادی       |
| 23            | ب         | عادی       |
| 24            | د         | عادی       |
| 25            | د         | عادی       |
| 26            | ج         | عادی       |
| 27            | ب         | عادی       |
| 28            | ب         | عادی       |
| 29            | د         | عادی       |
| 30            | ب         | عادی       |

**93-94-2**





سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳ - ۱۲۱۷۱۸۷ -

- کدامیک از دیدگاه های زیر در خصوص بهنگاری به وجود یا عدم وجود علایم بیماری تاکید کرده است ؟

۴. آماری

۳. فرهنگی

۲. آرمان گر

۱. دیدگاه مرضی

- کدامیک از رفتارهای زیر جزء اختلالات عادتی محسوب می شود ؟

۴. خرابکاری

۳. استفاده از الکل

۲. مدرسه گریزی

۱. عدم کنترل ادرار

- در کدامیک از الگوهای اختلال های روانی کودکان، برآسان و فرآیندهای ذهنی وی تاکید شده و مواردی چون حافظه، یادگیری و فراموشی اساس این دیدگاه می باشد ؟

۴. زیست شناختی

۳. روان پویایی

۲. شناختی

- آخرین بعد از ابعاد مصاحبه بالینی کدامیک از گزینه های زیر می باشد ؟

۴. وضعیت روانی

۳. تکیک

۲. تشخیص

۱. رابطه

- تعداد و میزان انجام یک رفتار بیانگر کدام اصل می باشد ؟

۴. تداوم یک رفتار

۳. فراوانی یک رفتار

۲. شدت یک رفتار

۱. شایستگی سنی

- طبق طبقه بنده ایکن باخ کدامیک از رفتارهای مرضی زیر به عنوان خصایص "برون ساخت" تعریف شده اند ؟

۴. دزدی

۳. فوبی

۲. تمایل به کناره گیری

۱. تهوع

- چنانچه کودکی در حین اجرای فعالیت های روزمره که نیاز به هماهنگی حرکتی دارد به طور قابل ملاحظه ای پایین تر از حد مورد انتظار مقدار بمهρه هوشی و سن تقویمی خود عمل نماید نشاندهنده چه نوع اختلالی می باشد ؟

۴. یادگیری

۳. روانی

۲. رشد هماهنگی

۱. ارتباطی

- تاخیر های زبانی در چه سنی بسیار رایج است ؟

۴. ۱۰ سال به بالا

۳. کودکان ۴ تا ۶ سال

۲. آغاز دبستان

۱. کودکان زیر ۳ سال

- افرادی که دارای اشکال اساسی در درک و بیان زبان هستند دارای کدام اختلال ارتباط می باشند ؟

۴. لکنت زبان

۳. واج شناختی

۲. دریافتی - بیانی

۱. زبان بیانی

- عدم توانایی در برقراری ارتباط به شکل آسان و با سرعت مناسب و به طور پیوسته از مشخصات کدام اختلال می باشد ؟

۲. اختلال واج شناختی

۴. اختلال آمیخته در زبان دریافتی بیانی

۱. لکنت زبان

۳. اختلال در زبان بیانی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۱- کدامیک از اختلال های زیر بیشترین فراوانی را در سطح کل جمعیت در سال های اخیر نشان داده است ؟

۴. کمبود توجه

۳. اضطرابی

۲. ارتباطی

۱. مهارتی

۱۲- "احساس رنج آوری که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری که به شیئی نامعین وابسته است" تعریف کدام گزینه زیرمی باشد ؟

۴. وسواس

۳. اضطراب

۲. ترس

۱. نگرانی

۱۳- خانمی که به علت ترس از فضای بسته سوار آسانسور نمی شود دچار چه نوع اختلالی می باشد ؟

۴. اضطراب

۳. هراس

۲. ترس

۱. وسواس فکری

۲. دارو درمانی

۴. درمان ترکیبی

۱. حساسیت زدایی تدریجی

۳. درمان شناختی

۱۴- برای درمان اختلال جدایی کدامیک از موارد زیر رایج تر و موثرتر است ؟

۲. رفتاری

۴. درماندگی آموخته شده

۱. شناختی

۳. زیستی

۱۵- در کدامیک از نظریه های زیر افسردگی رابه تجربه رویداد های غیر قابل کنترل مربوط می کند ؟

۴. بی اشتهايی روانی

۳. نشخوار

۲. پرخواری

۱. هرزه خواری

۱۶- جذب مواد غیر خوراکی بالاتر از سن بهنجاری یعنی بالاتر از سنی که در خلال آن کودک هر چیز را به نشانه نخستین وسیله شناخت جهان به دهان می برد بیانگر کدامیک از اختلال های تغذیه می باشد ؟

۴. پرخواری

۳. خوردن

۲. نشخوار

۱. هرزه خواری

۱۷- کدامیک از اختلال های تغذیه ای زیر در کودکان بین ۳ماه تا ۱ سال و بزرگسالان دچار کم توانی ذهنی شایع تر است ؟

۴. نشخوار

۳. پرخواری

۲. خوردن

۱۸- در شیر خواران برای پایین آمدن کدام اختلال تغذیه به او اجازه می دهند تا هر قدر دلشان می خواهد غذا بخورند ؟

۴. بی اشتهايی

۳. هرزه خواری

۲. نشخوار

۱. بی اشتهايی

۱۹- کامل ترین نوع درمان بی اشتهايی روانی از دیدگاه پژوهشگران چیست ؟

۲. درمان شناختی - رفتاری

۴. خانواده درمانی

۱. دارو درمانی

۳. روان درمانی پویشی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

- ۲۰- کدامیک از داروهای زیر در کاهش علایم اختلال پرخوری تاثیر گذراند؟

۴. هالو پریدول

۳. ریتالین

۲. منو امین اکسیداز

۱. فنوباربیتال

- ۲۱- کدام مرحله از خواب راخواب عمیق می نامند؟

۴. سوم و چهارم

۳. سوم

۲. دوم

۱. اول

- ۲۲- خوابگردی غالباً در کدام مراحل از خواب اتفاق می افتد؟

۴. سوم و چهارم

۳. سوم

۲. دوم

۱. اول

- ۲۳- زمانی که فرد به جای طی کردن ۴ مرحله اولیه خواب یک راست وارد مرحله خواب حرکت سریع چشم می شود دچار کدام اختلال خواب می باشد؟

۲. کابوس و وحشت در خواب

۴. وقفه تنفسی در خواب

۱. خوابگردی

۳. حمله خواب

- ۲۴- مقاومت در برابر به بستر رفتن در فاصله چه سن به اوچ خود می رسد؟

۴. ۳ تا ۴ سالگی

۳. ۲ تا ۳ سالگی

۲. ۱ تا ۲ سالگی

۱. ۶ ماهگی تا ۱ سالگی

- ۲۵- بیشتر کودکان مبتلا به نارسایی یادگیری در کدام زمینه با مشکل اساسی رو به رو هستند؟

۴. ریاضی

۳. واج شناختی

۲. نوشتن

۱. خواندن

- ۲۶- کودکی که به جای "سیب زمینی" کلمه "تیب زمینی" را به کار می برد دچار کدام نارسایی یادگیری می باشد؟

۴. لکنت زبان

۳. آواشناختی

۲. زبان بیانی

۱. خواندن

- ۲۷- بیشترین میزان وقوع لکنت زبان در چه سنی بر آوردشده است؟

۴. ۵ سالگی

۳. ۴ سالگی

۲. ۳ سالگی

۱. ۲ سالگی

- ۲۸- اگر فردی دارای IQ بین ۳۵ تا ۵۵ باشد در کدام دسته از نارسایی های ذهنی قرار می گیرد؟

۴. عمیق

۳. متوسط

۲. شدید

۱. خفیف

- ۲۹- کدامیک از اختلالات زیر با گنجاندن ید در نمک های خوراکی قابل درمان می باشد؟

۴. سندروم X شکننده

۳. سوخت و سازی

۲. فنل کتونوریا

۱. کرتینیسم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک  
**وشته تحصیلی/گد درس:** امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

- ۳۰- بی اختیاری ادراری ثانویه غالباً با چه عواملی همراه می باشد؟

۴. ژنتیک

۳. اجتماعی

۲. روان شناختی

۱. زیست شناختی

- ۳۱- کدامیک از اختلال های زیر جزء اختلال فراگیر مربوط به رشد در کودکان نمی باشد؟

۴. سلوک

۳. اتیسم

۲. رت

۱. آسپرگر

- ۳۲- کدامیک از روش های درمان در خود ماندگی ، با اهداف ایجاد آرامش ، افزایش توجه ، کمک به تولید گفتار هدفمند و تقویت حرکات انجام می شود؟

۴. ماساژ درمانی

۳. موسیقی درمانی

۲. انزال درمانی

۱. حیوان درمانی

- ۳۳- کدامیک از اختلال های زیر تنها در دختران شناسایی شده است؟

۴. در خود ماندگی

۳. رت

۲. لکنت زبان

۱. آسپرگر

- ۳۴- کدامیک از اختلالات زیر در مردان شایع تر از زنان می باشد؟

۲. آسپرگر

۴. اختلال فراگیر رشد نامعین

۱. رت

۳. در خود ماندگی

- ۳۵- این اختلال شامل فعالیت ها ، علایق و رفتار های قالبی و تخریبی فراگیر و شدید در تعامل اجتماعی یا مهارت های ارتباطی است؟

۲. آسپرگر

۴. سلوک

۱. در خود ماندگی کودک

۳. فراگیر رشد نامعین

- ۳۶- کدامیک از اختلالات زیر رایج ترین و عمومی ترین مشکلات روان شناختی کودکان می باشد که در پسران شیوع بیشتری دارد؟

۲. کم توجهی

۴. نافرمانی مقابله جویانه

۱. در خود ماندگی کودک

۳. سلوک

- ۳۷- کدامیک از موارد زیر جزء نشانه های اصلی اختلال کمبود توجه نمی باشد؟

۴. افسردگی

۳. تکانش گری

۲. بیش فعالی

۱. بی توجهی

- ۳۸- رایج ترین داروی محرك جهت کودک بیش فعال کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

۴. منو امین اکسیداز ۱۳

۳. فنو باربیتال

۲. هالو پریدول

۱. ریتالین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک و شته تحصیلی / کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۱۸۷

- ۳۹- در کدامیک از اختلالات زیر کودک مرتب اعمال خشونت بار شدید انجام می دهد و ممکن است سبب آسیب جسمی به خود یا دیگران شود و اغلب حقوق دیگران را زیر پا می گذارد؟

- ۱. نافرمانی مقابله جوبانه
- ۲. سلوک
- ۳. کم توجهی
- ۴. آسپرگر

- ۴۰- از کوره در رفتن، خشمگین شدن و رنجیده خاطر و زود رنج بودن ازویژگی کدامیک از اختلال های زیر می باشد؟

- ۱. آسپرگر
- ۲. رت
- ۳. بیش فعال
- ۴. نافرمانی مقابله جوبانه

| شماره<br>سؤال | پاسخ صحیح | وضعیت کلید |
|---------------|-----------|------------|
| 1             | الف       | عادی       |
| 2             | الف       | عادی       |
| 3             | ب         | عادی       |
| 4             | ب         | عادی       |
| 5             | ج         | عادی       |
| 6             | د         | عادی       |
| 7             | ب         | عادی       |
| 8             | الف       | عادی       |
| 9             | ب         | عادی       |
| 10            | الف       | عادی       |
| 11            | ج         | عادی       |
| 12            | ج         | عادی       |
| 13            | ج         | عادی       |
| 14            | الف       | عادی       |
| 15            | د         | عادی       |
| 16            | الف       | عادی       |
| 17            | ب         | عادی       |
| 18            | ج         | عادی       |
| 19            | د         | عادی       |
| 20            | ب         | عادی       |
| 21            | د         | عادی       |
| 22            | د         | عادی       |
| 23            | ج         | عادی       |
| 24            | ب         | عادی       |
| 25            | الف       | عادی       |
| 26            | ج         | عادی       |
| 27            | د         | عادی       |
| 28            | ج         | عادی       |
| 29            | الف       | عادی       |
| 30            | ب         | عادی       |
| 31            | د         | عادی       |
| 32            | د         | عادی       |
| 33            | ج         | عادی       |
| 34            | ب         | عادی       |
| 35            | ج         | عادی       |
| 36            | ب         | عادی       |
| 37            | د         | عادی       |
| 38            | الف       | عادی       |
| 39            | ب         | عادی       |
| 40            | د         | عادی       |