

دفترچه شماره ۱

آزمون شماره ۱۱

جمعه ۹۰۹/۰۹/۹۷



404|D



آزمون‌های سراسری گایج

گزینه درست را انتخاب کنید.

سال تحصیلی ۹۸-۹۷

سوالات آزمون

پایه دهم تجربی

دوره‌ی دوم متوسطه

شماره داوطلبی:	نام و نام خانوادگی:
مدت پاسخگویی: ۱۳۵ دقیقه	تعداد سوالاتی که باید پاسخ دهید: ۱۲۵

عنوانین مواد امتحانی آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد سوالات و مدت پاسخگویی

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	شماره سوال	از	مدت پاسخگویی
۱	فارسی ۱	۱۰	۱	۱۰	۱ دقیقه
۲	عربی، زبان قرآن ۱	۱۰	۱۱	۲۰	۱ دقیقه
۳	دین و زندگی ۱	۱۰	۲۱	۳۰	۱ دقیقه
۴	زبان انگلیسی ۱	۱۰	۳۱	۴۰	۱ دقیقه
۵	ریاضی ۱	۲۰	۴۱	۶۰	۳۰ دقیقه
۶	زیست‌شناسی ۱	۲۰	۶۱	۸۰	۲۰ دقیقه
۷	فیزیک ۱	۲۰	۸۱	۱۰۰	۲۵ دقیقه
۸	شیمی ۱	۲۰	۱۰۱	۱۲۰	۲۰ دقیقه

برای اطلاع از شروع آزمون و زمان دقیق اعلام آن در کنال نیکرام گایج عضو شوید. [@Gajir](https://t.me/Gajir)





فارسی

404D

- در کدام گزینه به معنی درست واژه‌های «مخصوصه - ادیب - گشیل کردن - معاشرت» اشاره شده است؟
- ۱) بدختی - بسیاردان - برانگیختن - گفت و شنید
 - ۲) گرفتاری - توانا - جدا کردن - رفت و آمد
 - ۳) تنگنا - دانشمند - فرستادن کسی به جایی - الفت داشتن
 - ۴) غم بزرگ - بافرهنج - روانه کردن - نزدیک شدن
- معنی چند واژه روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟
- وُقُب: شکنجه / گُرده: پهلوان / گَلَّه: برآمدگی پشت پای اسب / غارب: پیشانی / طَمَانِيَه: آرامش و قرار / رندانه: زیرکانه / خیل: دسته / گَلَّه: آرامش یافتن»
- ۱) چهار
۲) سه
۳) دو
۴) یک
- در معنی واژه‌های کدام گزینه اشتباه وجود دارد؟
- ۱) رعناء: زیبا / حقارت: پستی / بیغوله: خواب کوتاه / بُحران: وضع غیرعادی
 - ۲) مُکاری: کسی که اسب و شتر و الاغ کرایه می‌دهد یا کرایه می‌کنند. / مُروت: جوان مردی / غوک: قورباغه / شوخ: آسودگی
 - ۳) زَقْعَه: نامه / درحال: بی‌درنگ / پلاس: جامه‌ای پشمینه و ستیر که درویشان پوشند. / بهایم: ستوران
 - ۴) قَیْم: سرپرست / خطابه: خطبه خواندن، عظُّ کردن / مُشَوْش: آشفته و پریشان / فَرَج: رهایی
- در کدام گزینه غلط املایی دیده می‌شود؟
- ۱) بـحـذـر بـاـش اـز جـهـان اـی نـور چـشمـاـ!
 - ۲) بـیـانـی کـه نـغـز اـسـت فـرـزـانـه دـانـد
 - ۳) زـاسـتـخـوـانـ نـیـاـکـانـ پـاـکـ مـاـ اـیـنـ خـاـکـ
 - ۴) سـفـرـ کـنـیـد اـزـ اـیـنـ قـرـبـتـ وـ بـهـ خـانـهـ روـیدـ
- در همه‌ی گزینه‌ها «واو ربط» وجود دارد، به جز
- ۱) روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست
 - ۲) شدم ر دست تو شیدای کوه و دشت اما
 - ۳) چه ساز بود که در پرده می‌زد آن مطربر
 - ۴) می بده تا دهمت آگهی از سر قضا
- اگر بخواهیم ابیات زیر را به ترتیب داشتن آرایه‌های «تشبیه - تلمیح - کنایه - جان‌بخشی» مرتب کنیم کدام گزینه درست است؟
- الف) فریاد که چون صورت دیوار ندارم
ب) دل زود توان کند زیاران مخالف
ج) در پرده‌ی شب نوش می‌تاب که دریافت
د) هر چند برآورده آن جان جهانم
- ۱) ج - الف - ب - د
 - ۲) الف - ج - ب - د
- کدام گزینه با عبارت «من هیچ فکر نمی‌کرم که به زودی خواهد رسید روزی که او نباشد.» تناسب معنایی ندارد؟
- ۱) اگر ز باد فنا ای پسر بیندیشی
 - ۲) کجا سالم و تور و فریدون کجاست
 - ۳) اگرچه سنبل زلفت به خون من تشنه است
 - ۴) اگر ملک سليمانت ببخشنند



- ۸- کدام گزینه با عبارت «اما من می‌دیدم که خود پیرمرد در این سفرهای هرساله به جستجوی تسلایی می‌رفت؛ برای غم غربتی که در شهر به آن دچار می‌شد.» ارتباط مفهومی دارد؟

از بنده جرم و عفو ز مولا غریب نیست
طفلی که بدآموز به مادر شده باشد
زهربی که ماز تلخی غربت کشیده‌ایم
در عالم انصاف به تنها بی من نیست

کدام گزینه با عبارت «سراپاش از درماندگی اش خبر می‌داد.» تناسب معنایی دارد؟

گردد چو سر زلفت سرگشته و سودابی
دارم ز آب چشم خود خاک رهت همواره تر
تارنگ بگوییدت جـوـای
هم به بـوـی تو زنـدـه گـرـدـمـ باـز

تن به دوزخ برد امسال آن که گـرـدنـ بـودـ پـارـ
آلـ سـرـیـ کـهـ خـاـکـ کـفـ پـایـ اوـ بـودـ
اـکـنـونـ نـظـاـرـهـ کـنـ کـهـ هـمـهـ خـاـکـ پـاـشـدـندـ
هـرـ رـوـزـ بـرـ سـرـیـ نـهـدـ اـبـنـ تـاجـ خـسـرـوـی

- (۱) آمرزش من از تو خدایا غریب نیست
(۲) زندان غربی شمرده دوش پـدرـ رـا
(۳) صبح وطن به شیر بـرـونـ آورـدـ مـگـرـ
(۴) هرچند که حسن تو در این شهر غریب است

- ۹- کدام گزینه با عبارت «سراپاش از درماندگی اش خبر می‌داد.» تناسب معنایی دارد؟

- (۱) آن را که بود در سر سودای سر زلفت
(۲) خاک رهـتـ گـشـتمـ ولـیـ اـزـ بـیـمـ گـرـدـ دـامـتـ
(۳) اـزـ درـدـ مـپـرـ رسـ زـنـگـ رـخـ بـیـنـ
(۴) گـرـ بـهـ بـوـیـ توـ جـانـ بـرـافـشـانـ

- ۱۰- مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟

- (۱) سر به خاک آورد امروز آن که افسر بود دی
(۲) هر سر سزای افسر زیین نمی‌شود
(۳) آن سروران که تاج سر خلق بوده‌اند
(۴) دل در جهان مبنـدـ کـهـ دورـانـ روـزـگـارـ

زبان عربی



عین الأصح والأدق في الجواب للترجمة أو المفهوم (۱۵ - ۱۱):

- ۱۱- «ما أجمل نفساً تخلص لـلله أربعين صباحاً و تذهب الحكمة من قلب صاحبه على لسانه.»:

- (۱) چـهـ چـیـزـ زـیـبـاتـ استـ اـزـ نـفـسـیـ کـهـ چـهـلـ صـبـحـ بـرـایـ خـداـ خـالـصـ کـنـیـ وـ حـکـمـتـ کـهـ اـزـ قـلـبـ بـرـ زـیـانـ صـاحـبـشـ آـشـکـارـ شـوـدـ.
(۲) کـدـامـ نـفـسـ زـیـبـاتـ استـ اـزـ آـنـ کـهـ چـهـلـ صـبـحـ بـرـایـ خـداـ خـالـصـ مـیـکـنـدـ وـ حـکـمـتـ رـاـ اـزـ قـلـبـ بـرـ زـیـانـ صـاحـبـشـ ظـاهـرـ مـیـکـنـدـ.
(۳) چـهـ زـیـبـاسـتـ نـفـسـیـ کـهـ چـهـلـ صـبـحـ بـرـایـ خـداـ خـالـصـ مـیـشـودـ وـ حـکـمـتـ اـزـ قـلـبـ بـرـ زـیـانـ دـارـنـدـ آـنـ آـشـکـارـ مـیـگـرـدـ.
(۴) چـهـ زـیـبـاسـتـ نـفـسـیـ کـهـ درـ چـهـلـمـینـ صـبـحـ بـرـایـ خـداـ خـالـصـ مـیـکـنـدـ وـ حـکـمـتـ کـهـ اـزـ قـلـبـشـ بـرـ زـیـانـ دـارـنـدـ آـشـکـارـ مـیـشـودـ.

- ۱۲- «هل تتناخى للمرة الأخرى الذين لا يستطيعون أن يكرعوا أفناء؟»: آـيـاـ

- (۱) بـارـ دـیـگـرـ باـکـسـانـیـ کـهـ نـمـیـ تـوـانـدـ اـمـانـتـ دـارـ باـشـنـدـ، رـازـ نـمـیـ گـوـیـ؟
(۲) دـیـگـرـ بـارـ باـکـسـانـیـ کـهـ رـازـ دـارـتـ نـمـیـ تـوـانـدـ باـشـنـدـ، سـخـنـ نـگـوـیـدـ؟
(۳) دـیـگـرـ بـارـ باـکـسـانـیـ کـهـ رـازـ دـارـتـ نـمـیـ تـوـانـدـ اـمـانـتـ دـارـ باـشـنـدـ، سـخـنـ نـگـوـیـدـ؟
(۴) دـیـگـرـ بـارـ باـکـسـانـیـ کـهـ نـمـیـ تـوـانـدـ اـمـانـتـ دـارـ باـشـنـدـ، سـخـنـ نـگـوـیـدـ؟

- ۱۳- «أُثْرِيدُ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْ أَجْوَرِ بَعْدِ الْمَوْتِ؟ فَاغْرِسْ تَخَلَاً، أَجْرُ نَهْرَاً وَ أَبْنِ مَسْجِدًا.»:

- (۱) آـيـاـ مـیـ خـواـهـیـ اـزـ پـادـاشـهـایـ بـعـدـ اـزـ مـرـگـ استـفـادـهـ کـنـیـ؟ـ پـسـ نـخـلـیـ رـاـ بـکـارـ، رـوـدـیـ رـاـ جـارـیـ کـنـ و~ مـسـجـدـیـ رـاـ بـناـکـنـ.
(۲) آـيـاـ استـفـادـهـ کـرـدـنـ اـزـ پـادـاشـهـایـ رـاـ بـعـدـ اـزـ مـرـگـ مـیـ خـواـهـیـ؟ـ پـسـ نـخـلـیـ رـاـ بـکـارـ، رـوـدـیـ رـاـ جـارـیـ کـنـ و~ مـسـجـدـیـ رـاـ بـناـکـنـ.
(۳) اـگـرـ بـخـواـهـمـ پـسـ اـزـ مـرـگـ اـزـ پـادـاشـهـاـ بـهـرـمـنـدـ شـوـمـ، دـرـخـتـیـ مـیـ کـارـمـ، رـوـدـیـ رـاـ جـارـیـ مـیـ کـنـمـ و~ مـسـجـدـیـ رـاـ مـیـ سـازـ.
(۴) آـيـاـ مـیـ خـواـهـیـ پـسـ اـزـ مـرـگـ اـزـ پـادـاشـ بـهـرـهـ بـبـرـیـ؟ـ دـرـخـتـیـ بـکـارـ، نـهـرـیـ جـارـیـ کـنـ و~ مـسـجـدـیـ بـسـازـ.

- ۱۴- عین الصحيح:

- (۱) مـيـتـانـ و~ خـمـسـةـ و~ ثـمـانـوـنـ نـاقـصـ مـقـيـاـ و~ تـسـعـةـ و~ تـسـعـيـنـ يـساـويـ ستـةـ و~ ثـمـانـيـنـ: دـوـبـیـتـ و~ بـیـسـتـ و~ پـنـجـ منـهـاـیـ صـدـ و~ نـوـدـ و~ نـهـ مـساـوـیـ اـسـتـ باـ هـشـتـادـ و~ شـشـ.
(۲) عـلـیـکـمـ بـالـسـیـاحـیـاـ چـیـثـ عـدـةـ مـرـاـتـ هـنـاـ لـاـنـ هـذـاـ السـعـبـ مـضـیـافـ جـدـاـ:ـ بـهـ گـرـدـشـ بـرـوـیدـاـ چـنـدـیـارـ بـهـ اـینـ جـاـ آـمـدـ زـیـرـاـ اـینـ مـرـدـ مـهـمـانـ نـوـازـ هـسـتـنـدـ.
(۳) لـاـ تـفـرـقـوـ و~ كـوـنـوـ مـعـ الـجـمـاعـةـ و~ اـعـلـمـوـ أـنـ الـوـجـعـ قـلـيلـهـ كـثـيـرـ:ـ پـرـاـكـنـدـهـ نـکـنـدـ و~ بـاـ جـمـاعـتـ باـشـیدـ تـاـ بـدـانـیـدـ نـادـانـیـ کـمـشـ هـمـ زـیـادـ اـسـتـ.
(۴) يـلـیـثـ نـوـحـ فـیـ قـوـمـهـ أـلـفـ سـنـةـ إـلـاـ خـمـسـیـنـ عـامـاـ و~ بـرـشـدـهـمـ: نـوـحـ نـهـصـدـ و~ پـنـجـاهـ سـالـ درـ [مـیـانـ] قـوـمـشـ درـنـگـ مـیـ کـنـدـ و~ آـنـهـ رـاـ رـاهـنـمـایـیـ مـیـ نـمـایـدـ.



۱۵- عین غیر الصحيح لمفهوم هذه الآية: (وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَعْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ)

- (۲) «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»
 (۴) از مكافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید جو ز جو

■ عین المناسب في الجواب عن الأسئلة التالية (۲۰ - ۲۰):

۱۶- أي عبارة يشير إلى ۴:۴۰؟

- (۱) السادسة إلا عشر دقائق. (۳) السابعة إلا عشرين دقيقة. (۴) السابعة إلا أربعين دقيقة.

۱۷- في أي عبارة جاء عدد ترتيب؟

- (۱) اكتسب فريقنا عشرين جائزة. (۲) هذه الآية سيعرض الجزء العاشر من المسلسل.

۱۸- زرع زارع تسع و تسعين شجرة. بعد سنوات تمر ثمانون منها و تتميز أنهاها عشرين صندوقاً. كم شجرة لها أنهاها؟

- (۱) تسعة عشرة (۲) تسعة و سبعون (۳) مئة (۴) ثمانون

۱۹- عين العبارة التي جاء فيها عد ترتيب و غير ترتيب على الترتيب:

- (۱) حصلت على خمس درجات حديدة في الصف الثالث. (۲) أخذ اللاعبيون ثلاثة جوائز فضية في المرحلة الأولى.

(۳) حصلت على المرتبة الثالثة في الصف الثاني من المدرسة الثانوية. (۴) في المرحلة الأولى، أخذ التلميذ أربعة جوائز ذهبية.

۲۰- انتخب عدداً صحيحاً للفراخ: «استلم السائحون مفاتيح لغزهم في الفندق»

- (۱)عاشرة (۲) عشرة (۳) الحادية عشرة (۴) العشرون



دین و زندگی

۲۱- با توجه به خلقت آسمانها و زمین برای انسان، خداوند کدام توانایی را در وجود انسان قرار داده است؟

- (۱) بهرهمندی (۲) شناخت (۳) درک (۴) فراغی

۲۲- علاقه به خصلت‌های خوب و بیزاری از خصلت‌های بد، از کدام آیهی شریفه برداشت می‌شود؟

- (۱) «إِنَّ هَذَيْنَاهُ السَّبَبُ إِلَّا شَاكِرًا وَإِنَّا كَفُورًا»
 (۲) «وَلَا أَقِيمُ بِالْقُلُوبِ مَا شِئْتُ»
 (۳) «وَمَا حَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا لِعَيْنٍ ...»
 (۴) «وَنَسِيَ وَمَا سَوَّاهَا فَاللَّهُمَّ هَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا»

۲۳- شیطان با استفاده از شراب و قمار، قصد دور کردن انسان از چه چیزهایی را دارد؟

- (۱) نماز و بهشت (۲) نماز یاد خدا (۳) بهشت یاد خدا (۴) عاقبت خوش و سعادت

۲۴- ویزگی‌های ابعاد جسمانی و غیرجسمانی انسان، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

- (۱) تحلیل پذیر - از دادن آگاهی (۲) تجزیه پذیر - از دست دادن حیات (۳) از دادن حیات - تجزیه ناپذیر

۲۵- طبق فرمایش رسول خدا (ص)، انسان برای چه چیزی خلق شده است؟

- (۱) عبادت کردن (۲) رسیدن به جهان آخرت (۳) زندگی در بهشت (۴) بقا

۲۶- از نظر رسول خدا (ص)، باهوش ترین مؤمنان، چه کسانی هستند؟

- (۱) کسانی که بهتر از دیگران خود را برای مرگ آماده می‌کنند. (۲) کسانی که دنیا را مزروعه آخرت می‌دانند.

(۳) کسانی که دنام به یاد جهنم و بهشت هستند. (۴) کسانی که نیام فی اذا ماتوا، إنْتَهُوا از رسول خدا (ص)، هنگام بیداری هر انسانی، چه زمانی دانسته شده است؟

- (۱) روحانیت با زندگی واقعی (۲) مرگ (۳) روحانیت با زندگی واقعی (۴) ورود به بهشت

۲۸- طبق آیه ۶۹ سوره‌ی مائدہ، کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشد، به چه چیزی مبتلا نمی‌شوند؟


- (۱) عذاب قبر (۲) نامیدی (۳) غمگین شدن (۴) مرگ بد

۲۹- نظر امام حسین (ع) درباره‌ی «مرگ و زندگی با ظالمان» هنگام انتخاب بین ذلت و شهادت، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

- (۱) آزادی - حقارت (۲) سعادت - ننگ (۳) آزادی - ننگ (۴) سعادت - حقارت

۳۰- منظور منکران معاد از واژه‌ی «دهر» در آیهی شریفه‌ی «وَمَا يَهْلَكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ...» چه بوده است؟

- (۱) گذشت روزگار (۲) مرگ و حیات (۳) دشمنان (۴) تنازع



زبان انگلیسی

404D

PART A: Grammar and Vocabulary

Directions: Questions 31-35 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet.

- 31- are my grandparents, and people over there are my friend's grandparents.
 1) These / those 2) This / those 3) These / these 4) This / these
- 32- Twenty-five years ago, there were no smartphones. But in a few years' time super smartphones everywhere.
 1) are 2) was 3) is being 4) will be
- 33- Our company is a lot of money, so something has to be done, or we will be in serious trouble soon.
 1) holding 2) making 3) losing 4) getting
- 34- This is the age of , and computers are playing a very important role in our everyday lives.
 1) information 2) expression 3) reception 4) organization
- 35- Before going anywhere in your car, you should always check the vehicle to make sure that it is to drive.
 1) natural 2) safe 3) clear 4) positive

PART B: Reading Comprehension

Directions: In this part of the test, you will read a passage. The passage is followed by five questions. Answer the questions by choosing the best choice, (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

It might seem that very few things can survive in the desert. Most plants and animals that you see in your town probably wouldn't. But there are many different types of plants and animals that are perfectly suited to the hot, dry climate.

In the desert, there is very little water. The plants and animals that live in the desert have special features for living with little water. Plants like the cactus have short leaves. These leaves trap and store water. The cactus also has spines on its leaves. This is to keep animals from taking its water.

Animals that live in the desert are often nocturnal. This means they sleep during the day. They come out to eat at night when it is cool. Other animals, like the camel, are awake during the heat of the day. They have special eyelashes that keep the sand out of their eyes. They have nostrils that can close to keep the sand out of their noses. They can go for many days without drinking. Many animals that live in the desert can get all the water they need from the foods they eat.

- 36- Which of these could be a good title for this passage?
 1) A Normal Animal in the Desert 2) Plant and Animal Life in the Desert
 3) How to Stay Cool in the Desert 4) Plants That Survive in the Desert
- 37- What makes camels unique or special animals?
 1) They are the only living mammals that can survive in deserts.
 2) They are awake at night when it's cool so that they can find food.
 3) They have special eyelashes and nostrils to help keep sand out of their bodies.
 4) They live under rocks when it's very hot in the desert.
- 38- Which of the following helps the cactus to keep animals from taking its water?
 1) short leaves 2) deep root
 3) water storage 4) spines on leaves
- 39- The underlined word "their" in the last paragraph refers to
 1) nocturnal animals 2) all desert animals 3) camels 4) nostrils
- 40- Animals that sleep during the day are called
 1) desert animals 2) desert creatures 3) camels 4) nocturnal



ریاضیات



404D

- ۴۱- اگر دنباله‌ی x, y, z, \dots یک دنباله‌ی هندسی باشد، حاصل ضرب کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین این جملات کدام است؟

۲۷ (۴)

۳۶ (۳)

۱۸ (۲)

۱۰۸ (۱)

$$- ۴۲- چندمین جمله از دنباله‌ی $\dots, \frac{1}{9}, \frac{1}{3}, 1, \dots$ برابر \(\frac{1}{729}\) است؟$$

۷ (۴)

۶ (۳)

۵ (۲)

۴ (۱)

- ۴۳- در مثلث ABC داریم $\hat{B} = 30^\circ$ و $\hat{C} = 45^\circ$. $AC = 4$. مساحت مثلث ABC کدام است؟

\(\sqrt{3} + 1\) (۴)

۸(\(\sqrt{3} + 1)\) (۳)

۲(\(\sqrt{3} + 1)\) (۲)

۴(\(\sqrt{3} + 1)\) (۱)


- ۴۴- در شکل زیر، نقطه‌ی Dلخواه M را در چه فاصله‌ای از نقطه‌ی A در نظر بگیریم، تا مساحت مثلث قائم‌الزاویه AMH برابر ۶ واحد مربع گردد؟

$$6 \sin \theta \cos \theta$$


$$\frac{6}{\sqrt{\sin \theta \cos \theta}}$$

$$2\sqrt{3} \sin \theta \cos \theta$$

$$\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{\sin \theta \cos \theta}}$$



- ۴۵- برای حفظ تعادل یک دکل مخابرات، مطابق شکل از کابل‌هایی استفاده شده است. برای این کار چند متر کابل به کار رفته است؟ ($\sin 35^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$)




۱۲ (۱)

۲۰ (۲)

۱۲ + ۴\(\sqrt{3}\) (۳)

۲۰ + ۴\(\sqrt{3}\) (۴)

- ۴۶- در شکل زیر اگر $AB = 2\sqrt{3}$ باشد، مساحت ناحیه‌ی رنگی کدام است؟ (شش ضلعی، منتظم است.)



۴\(\pi - 6\sqrt{3}\) (۱)

۱۲\(\pi - 12\sqrt{3}\) (۲)

۴\(\pi - 12\sqrt{3}\) (۳)

۱۲\(\pi - 6\sqrt{3}\) (۴)

$$- ۴۷- حاصل عبارت \frac{4\cos^2 60^\circ - \sin 30^\circ}{2\cot^2 60^\circ - \frac{3}{2}\cos^2 45^\circ} کدام است؟$$

-\(\frac{2}{21}\) (۴)

-6 (۳)

\(\frac{2}{21}\) (۲)

6 (۱)

- ۴۸- اگر $\alpha < 0^\circ$ و $\sin \alpha \cdot \cot \alpha < 0$ باشد، آن‌گاه انتهای کمان α در کدام ناحیه‌ی مثلثاتی قرار می‌گیرد؟

چهارم (۴)

سوم (۳)

دوم (۲)

اول (۱)

محل انجام محاسبات



- ۴۹- اگر $15^\circ < \alpha < 30^\circ$ و $\cos 2\alpha = -\frac{m}{3}$ باشد، آن‌گاه حدود m کدام است؟

($-\sqrt{3}, 1$) (۴)

[$-\sqrt{3}, 1$] (۳)

($-2, -1$) (۲)

[$-2, -1$] (۱)

- ۵۰- با افزایش زاویه θ از 90° تا 270° ، مقدار $\cos \theta$ چه تغییری می‌کند؟

(۲) همواره کاهش می‌یابد.

(۳) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

(۴) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.

- ۵۱- عرض از مبدأ خطی که با جهت مثبت محور x ‌ها زاویه 45° درجه می‌سازد و خط $y = 3x + 4$ را در نقطه‌ای با طول ۱- قطع می‌کند، کدام است؟

-1 (۴)

۴ (۳)

(۲) صفر

۲ (۱)


- ۵۲- مختصات محل تلاقی خطوط l_1 و l_2 کدام است؟

($2\sqrt{3}, 3$) (۱)

($2\sqrt{3}, \sqrt{2}$) (۲)

($3, 2\sqrt{3}$) (۳)

($3, 2$) (۴)



- ۵۳- اگر انتهای کمان θ در ناحیه سوم مثلثاتی باشد، حاصل $\sqrt{\frac{\tan^2 \theta}{1+\tan^2 \theta}}$ کدام است؟

$-\cos \theta$ (۴)

$-\sin \theta$ (۳)

$\cos \theta$ (۲)

$\sin \theta$ (۱)

- ۵۴- حاصل $\sqrt{1-2\sin x \cos x + \sin^2 x}$ بجزای $x = 45^\circ$ کدام است؟

$\cos x$ (۱)

$\sin x$ (۳)

$\sqrt{\sin x - \cos x}$ (۲)

$\sqrt{\sin x + \cos x}$ (۴)

- ۵۵- حاصل کسر $\frac{\cot 30^\circ + \cot 40^\circ}{\tan 30^\circ + \tan 40^\circ}$ کدام است؟

$\tan 30^\circ \times \tan 40^\circ$ (۱)

$\cot 30^\circ \times \cot 40^\circ$ (۳)

$\tan 30^\circ + \tan 40^\circ$ (۲)

$\cot 30^\circ + \cot 40^\circ$ (۴)

- ۵۶- اگر 1 و انتهای کمان x در ناحیه اول باشد، آن‌گاه کمان x چند درجه است؟

۱۵ (۴)

۴۵ (۳)

۳۰ (۲)

۶۰ (۱)

- ۵۷- اگر $\sin x \cos x = \frac{1}{4}$ باشد، آن‌گاه حاصل $\sin^4 x + \cos^4 x$ کدام است؟

$\frac{3}{2}$ (۴)

$\frac{1}{2}$ (۳)

$\frac{15}{8}$ (۲)

$\frac{7}{8}$ (۱)

- ۵۸- اگر $\tan \theta = -\frac{1}{3}$ و انتهای کمان θ در ناحیه دوم مثلثاتی باشد، حاصل $\sin \theta \cos \theta$ کدام است؟

$\frac{3}{\sqrt{10}}$ (۴)

$-\frac{3}{\sqrt{10}}$ (۳)

$0/3$ (۲)

$-0/3$ (۱)

محل انجام محاسبات



سوال دهم تجربی

 حل ویدئویی سوالات اینی دقچه را در
وسایت DriQ.com مشاهده کنید.

| زیست‌شناسی | ۸

$$\text{اگر } -\frac{2\sin\alpha + \cos\alpha}{-4\sin\alpha + 2\cos\alpha} = a \text{ باشد، حاصل بر حسب } a \text{ کدام است؟}$$

$$\frac{2a-1}{-4a-6} \quad (۴)$$

$$\frac{2a}{-4a-6} \quad (۳)$$

$$\frac{2a-1}{-4a+6} \quad (۲)$$

$$\frac{a}{-2a+1} \quad (۱)$$

$$\text{اگر } -1 - \frac{\cos^2 x}{1+\sin x} = \frac{1}{\sqrt{5}} \text{ باشد، حاصل } 1 + \cot^2 x \text{ کدام است؟}$$

$$5 \quad (۴)$$

$$-5 \quad (۳)$$

$$\frac{1}{5} \quad (۲)$$

$$-\frac{1}{5} \quad (۱)$$

404D



زیست‌شناسی

چند مورد، جمله‌ی زیر را به درستی کامل می‌کنند.
«همه‌ی جاندارانی که ، قطعاً »

(الف) فاقد پیکره‌ی پریاخته‌ای هستند – اغلب مولکول‌های زیستی موردنیاز خود را با انتشار دریافت می‌کنند.

(ب) محل زندگی آن‌ها دستگاه گوارش جانوران است – در ترشح آنزیم‌های گوارشی ناتوان هستند.

(ج) در محیط‌های غیرخشک سکونت دارند – در گوارش ذرات درشت غذایی ناتوان هستند.

(د) فاقد سیستمی برای گوارش برونویاخته‌ای غذا هستند – فقط می‌توانند ذرات ریز غذایی را وارد یاخته‌های خود کنند.

$$4 \quad (۴)$$

$$2 \quad (۳)$$

$$1 \quad (۲)$$

$$1 \quad (۱)$$

-۶۱ هر بخشی از روده‌ی بزرگ که ، قطعاً

(۱) جهت حرکت محتویات آن به سمت لوزالمعده است – مستقیماً محتویات خود را از بخش انتهایی روده‌ی باریک دریافت می‌کند.

(۲) جهت حرکت محتویات آن در جهت جاذبه است – اسفنکتر خارجی آن می‌تواند دفع مدفعه را به صورت ارادی کنترل کند.

(۳) به واسطه‌ی نوعی یافته پیوندی به روده‌ی باریک متصل است – زیده‌ای کوچک از آن به نام آپاندیس خارج می‌شود.

(۴) مدفعه در حال تشکیل را به سمت چپ بدن منتقل می‌کند – یاخته‌هایی فاقد ریزپر ز دارد که ماده‌ی مخاطی ترشح می‌کنند.

-۶۲ کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می‌کند؟

«عموماً در لوله‌ی گوارش گاو، بخش معده »

(۱) نزدیک‌ترین – به دم، می‌تواند با انقباض عضلات خود در گوارش غذا مؤثر باشد.

(۲) نزدیک‌ترین – به سر، هیچ‌گاه محتویات خود را به سیرابی وارد نمی‌کند.

(۳) کوچک‌ترین – همواره محتویات خود را به محل شروع بلع نزدیک می‌کند.

(۴) بزرگ‌ترین – همواره محتویات درون خود را به نگاری وارد می‌کند.

-۶۳ در دستگاه گوارش انسان بالغ، ترشحات می‌توانند (می‌تواند)

(۱) غده‌های بزاقی – برخلاف ترشحات پانکراس، در تولید نوعی دی‌اسکارید، مؤثر باشند.

(۲) غده‌های معده – همانند ترشحات روده‌ی بزرگ، در گوارش مولکول‌های غذایی نقش ایفا کنند.

(۳) غده‌ی پانکراس – برخلاف ترشحات روده‌ی باریک، در خنثی نمودن کیموس اسیدی معده نقش مؤثری داشته باشد.

(۴) برخی از یاخته‌های پوششی روده‌ی باریک – برخلاف ترشحات کبدی، منجر به تحریک ترشح بیکربنات شوند.

-۶۴ کدام گزینه در ارتباط با گوارش در پارامسی به درستی بیان شده است؟

(۱) هر بخشی از غشای پارامسی که تحت تأثیر جایه‌جایی ذرات مساحت آن تغییر می‌کند، بخشی از حفره‌ی دهانی است.

(۲) ترشح آنزیم‌های اندامک لیزوژروم همانند بروون‌رانی مواد دفعی، نیازمند تجزیه‌ی ATP است.

(۳) قطعاً واکوئل دفعی از مولکول‌هایی مغذی و زیستی تشکیل شده است.

(۴) واکوئل غذایی همانند واکوئل گوارشی، ممکن است حاوی آنزیم‌هایی جهت گوارش غذا باشد.

-۶۵ در فرد مبتلا به بیماری ، قطعاً

(۱) سلیاک – چین‌خورده‌ی های حلقوی دیواره‌ی روده‌ی باریک از بین می‌روند.

(۲) سنگ کیسه‌ی صفرا – فقط مقادیر زیاد کلسترول موجب رسوب سنگ در مجاري خروج صفراء شده است.

(۳) ریفلاکس معده – در پی کاهش مقدار انقباض در یجه‌ی بنداره‌ی انتهایی مری، انقباضاتی کرمی شکل آغاز می‌شود.

(۴) یرقان – در پی کاهش توانایی جذب چربی‌ها به درون رگه‌ای لنفی به وجود آمده است.

زیست‌شناسی | ۹

حل ویدئویی سوالات این فقره را در
و سایت DriQ.com مشاهده کنید.

سوال دهم تجربی



- ۶۷- در لوله‌ی گوارش انسان سالم، حرکتی که همراه با بخش‌های منقبض‌شونده بین قطعه‌های شل، نمی‌تواند

(۱) است - در افزایش سطح تماس غذا با شیرهای پانکراس نقش داشته باشد.

(۲) نیست - پس از بلع، در لوله‌ی گوارش در طی انقباض ماهیچه‌ها ادامه یابد.

(۳) است - در شرایطی، محتويات لوله‌ی گوارش را به سوی دهان هدایت کند.

(۴) نیست - در محلی که عمل اصلی آن جذب آب و یون‌ها می‌باشد، با سرعت کمی ایجاد شود.

- ۶۸- در روده‌ی باریک انسان سالم، قطعاً

(۱) در یاخته‌های پوششی هر پریز چین حلقوی، بخشی از غشا، قادر ریزیز است.

(۲) هر رگ موجود در پریز، می‌تواند در آن شبکه‌ای مویرگی تشکیل دهد.

(۳) تعداد زیادی پریز می‌توانند در کنار هم چین‌های طولی روده را تشکیل دهند.

(۴) هر ریزپریز می‌تواند مستقل از سایر ریزپریزها از رگ‌های خونی مجزا تقذیه شود.

- ۶۹- در دستگاه گوارش ملخ، برخلاف، می‌تواند (می‌توانند)


(۱) کیسه‌های معده - پیش‌معده - در گوارش مکانیکی و شیمیابی غذا نقش ایفا کنند.

(۲) پیش‌معده - معده - در افزایش مواد قابل جذب حاصل از گوارش مؤثر باشد.

(۳) چینه‌دان - کیسه‌های معده - توانایی ذخیره‌ی مواد غذایی را به صورت موقت داشته باشد.

(۴) روده - پیش‌معده - جذب مونومرهای حاصل از گوارش غذا را انجام دهد.

- ۷۰- شکل زیر، فرایند بلع را در لوله‌ی گوارش انسان نشان می‌دهد، کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟



- ۷۱- در روده‌ی باریک انسان، همه‌ی موادی که در از بین بردن اثر اسیدی کیموس معده نقش مؤثری دارند، توسط یاخته‌های می‌شوند.

(۱) مستقر بر روی ساختاری گلیکوپروتئینی، تولید

(۲) دارای ریزپریزهای فراوان در رأس خود، ساخته

(۳) غدد ترشح‌کننده به مایع بین یاخته‌ای، وارد

- ۷۲- در، هو بخش از لوله‌ی گوارش که در مجاورت قرار دارد، نمی‌تواند

(۱) کرم خاکی همانند پرنده‌ی دانه‌خوار - ستگان - در جذب مواد حاصل از گوارش پروتئین‌ها نقش ایفا کند.

(۲) پرنده‌ی دانه‌خوار همانند ملخ - معده - با ترشح آنزیم‌های گوارشی، در گوارش درشت‌مولکول‌ها مؤثر باشد.

(۳) ملخ برخلاف کرم خاکی - چینه‌دان - با داشتن دندانه‌هایی در خود، در گوارش مکانیکی غذا نقش به سزاگی داشته باشد.

(۴) ملخ برخلاف پرنده‌ی دانه‌خوار - روده - در جذب آب و یون‌های معدنی محتويات لوله‌ی گوارش، تأثیرگذار باشد.

- ۷۳- در انسان، سکرتین برخلاف گاسترین،

(۱) می‌تواند نوعی از ترشحات پانکراسی را در خون افزایش دهد.

(۲) در پی خروج از یاخته‌های سازنده‌ی خود، وارد خون می‌شود.

(۳) محرک ترشح آنزیم‌های غیرفعال لوزالمعده است.

(۴) در خنثی نمودن اسید کیموس معده موجود در محل اثر صfra مؤثر است.

- ۷۴- چند مورد جمله‌ی زیر را در ارتباط با انسان سالم به درستی کامل می‌کند؟

«در صورت اختلال در، ممکن است»

الف) رود صفراء به ابتدای دوازده - مقدار ویتامین K در خون روده به کید کاهش یابد.

ب) تجزیه‌ی مولکولی فسفات‌دار - جذب همه‌ی ترکیبات معدنی در روده دچار مشکل شود.

ج) فعال شدن پروتئازهای پانکراس - جذب برخی آمینواسیده‌ها هم‌چنان ادامه یابد.

د) عملکرد پمپ سدیم پتاسیم یاخته‌ی پوششی مخاط روده - مقدار گلوکز در مایع میان یاخته‌ای روده کاهش یابد.

(۱) ۴) ۳) ۲) ۱)

- ۷۵- در دستگاه گوارش، بخشی که بلافصله پس از قرار دارد، توانایی ترشح آنزیم‌های گوارشی را ندارد.

(۴) پرنده‌ی دانه‌خوار - چینه‌دان (۳) کرم خاکی - مری (۲) گاو - هزارلا (۱) ملخ - پیش‌معده



۷۶- کدام گزینه در ارتباط با گردش خون دستگاه گوارش انسان به درستی بیان شده است؟

- (۱) هر اندازی که خون سیاهرگی آن به کبد وارد می شود، بخشی از لوله گوارش را تشکیل می دهد.
- (۲) هر اندازی که خون خروجی از آن به کبد وارد می شود، می تواند هورمون هایی ترشح کند.

- (۳) هیچ سیاهرگی مستقیماً از مری به سیاهرگ باب اتصال ندارد.
- (۴) امکان ندارد هر ویتامین محلول در چربی، در کبد مشاهده شود.

۷۷- در افراد دارای، ممکن است

- (۱) اضافه وزن - افزایش ابتلا به انواعی از سرطان ها و پوکی شدید استخوان ها دیده شود.

- (۲) بی اشتہایی مفرط - علایمی همچون علایم اثرات فقدان فاکتور داخلی معده مشاهده شود.

- (۳) چاقی مفرط - کاهش احتمال ابتلا به سکته های مغزی و دیابت نوع دو رویت شود.

- (۴) بی اشتہایی عصبی - رسوب نوعی لپید حلقوی در دیواره سرخرگ ها مشاهده شود.

۷۸- چند مورد جمله زیر را به نادرستی کامل می کند؟

«در ساختار معده انسان، بلافصله در سمت داخل بافتی قرار دارد که می تواند»

(الف) داخلی ترین بافت پیوندی - میزان ترشحات پیسینوژن و فاکتور داخلی را کنترل کند.

(ب) بافت پیوندی سست - در فرایند استفراغ موجب ورود غذا به فضای مری شود.

(ج) خارجی ترین لایه ماهیچه ای - در تشکیل بخشی از ساختار صفاق نقش ایفا کند.

(د) درونی ترین بافت پوششی - در روده با حرکت پر زها موجب افزایش مقدار جذب شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۷۹- در کیسه هی گوارشی هیدر، هر یاخته ای که

- (۱) لیزوژوم آن به واکوئل غذایی ملحق می شود، دارای آنزیمه هایی گوارشی است.

- (۲) واکوئل حاوی آنزیمه های گوارشی برون ریز دارد، ذرات غذایی را با آندوسیتوز جذب می کند.

- (۳) با ساختاری مشابه با غشای پایه در تماس است، تازگ دارد که به گوارش کمک می کند.

- (۴) در بی آندوسیتوز، کیسه هی غشایی تشکیل می دهد، ممکن است ادامه ی گوارش غذا را انجام دهد.

۸۰- کدام گزینه، جمله زیر را به نادرستی کامل می کند؟

«در یک فرد بالغ، آنزیمه هایی که آغازگر روند هضم پروتئین ها هستند،»

- (۱) می توانند در مصرف مولکول هایی کوچک و غیرزیستی نقش مؤثری ایفا کنند.

- (۲) تحت تأثیر نوعی هورمون افزایش می یابند که در افزایش اسیدیته کیموس معده نیز مؤثر است.

- (۳) توسط ترشحات بزرگ ترین یاخته های تشکیل دهنده غدد معده فعل می شوند.

- (۴) فقط از غدد مجاور بافت ماهیچه ای جدا کننده معده از مری ترشح می شوند.



۸۱- در کدام یک از گزینه های زیر، تخمین مرتبه بزرگی نادرست است؟

$$۰/۰۰۰۴۹۹ \sim ۱ \cdot ۰^{-۴} \quad ۰/۰۴۵ \times ۱ \cdot ۰^{-۴} \sim ۱ \cdot ۰^{-۷} \quad ۸۵۳۷۰ \sim ۱ \cdot ۰^۵ \quad ۰/۰۰۰۴۹۹ \sim ۱ \cdot ۰^{-۴}$$

۸۲- چگالی کره همگنی به جرم ۸ کیلوگرم و به قطر ۲۰ سانتی متر، چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ ($\pi = ۳$)

$$۸۰۰۰ \quad ۵۰۰ \quad ۲۰۰۰ \quad ۲۵۰$$

404D

فیزیک ۱۱

حل ویدئویی سوالات این فقره را در
ویسایت DriQ.com مشاهده کنید.

سوال دهم تجربی



- ۸۳- تعداد تنفس‌های یک انسان در طول ۵۰ سال به کدامیک از مقادیر زیر نزدیک‌تر است؟

۱۰^{۱۵} (۴)۱۰^{۱۲} (۳)۱۰^۸ (۲)۱۰^۵ (۱)

- ۸۴- درون استوانه‌ی مدرجی آب وجود دارد. گلوله‌ی توپری به جرم ۳۲ گرم را داخل آب می‌اندازیم. سطح آب از درجه‌ی 50cm^3 به 55cm^3 می‌رسد. چگالی گلوله چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟

۴/۳ (۴)

۱۰/۵ (۳)

۸/۲ (۲)

۶/۴ (۱)

- ۸۵- ۳۰۰ سانتی‌متر مکعب از مایعی با چگالی $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ را با چند سانتی‌متر مکعب از مایعی با چگالی $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ مخلوط کنیم تا چگالی مخلوط 1400 kg/m^3 شود؟ (در اختلاط تغییر حجم ناچیز است.)

۳۵۰ (۴)

۳۰۰ (۳)

۲۵۰ (۲)

۲۰۰ (۱)

- ۸۶- جرم استوانه‌ای به ارتفاع ۵ سانتی‌متر و شعاع قاعده‌ی ۲ با جرم کره‌ای به شعاع R برابر است. اگر شعاع کره برابر ارتفاع استوانه باشد و چگالی کره ۳ برابر چگالی استوانه باشد، شعاع استوانه چند سانتی‌متر است؟

۱۰ (۴)


۸ (۳)

۷/۵ (۲)

۵ (۱)

- ۸۷- مطابق شکل زیر یک ظرف نیم‌کروی به ضخامت ۱cm، هنگامی که کاملاً پر از آب باشد، جرمش ۹۸۲ گرم است. اگر فاصله‌ی دو لبه‌ی خارجی

$$\text{ظرف از هم } 10 \text{ سانتی‌متر باشد، چگالی ظرف } \rho = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}, \text{ آب } \rho = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \text{ است؟ (SI واحد است)}.$$



۷ (۱)

۲/۹۷ (۲)

۷۰۰۰ (۳)

۲۹۷۵ (۴)

- ۸۸- انرژی جنبشی اتومبیلی به جرم 840 kg که با سرعت $72 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ حرکت می‌کند، چند کیلوژول است؟


۲۱۷۷ (۴)

۳۳۶۰ (۳)

۳۳۶ (۲)

۱۶۸ (۱)

- ۸۹- جسمی به جرم m تحت اثر نیروی ثابت \bar{F} ، از سه مسیر نشان داده شده در شکل زیر از نقطه‌ی A به نقطه‌ی B جایه‌جا می‌شود. کدام گزینه در مورد مقایسه‌ی کار انجام‌شده توسط نیروی F در این مسیرها درست است؟



(۱) کار در مسیر (۱) کمترین مقدار را دارد.

(۲) کار در مسیر (۲) و (۳) مقداری یکسان و بیش از مسیر (۱) دارد.

(۳) کار در هر سه مسیر مقدار یکسان دارد.

(۴) کار در مسیر (۲) و (۳) مقداری یکسان و کمتر از مسیر (۱) دارد.

- ۹۰- کودکی به جرم 20 kg از سرسره‌ای به طول ۵ متر که با افق زاویه‌ی 45° می‌سازد، پایین می‌آید. کار نیروی عمود بر سطح روی کودک در

$$\text{این جایه‌جایی چند ژول است؟ } (\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2})$$

 $100\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۱) $100\sqrt{2}$ (۲) $50\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۳)

۰ (۴) صفر

محل انجام محاسبات




سوال دهم تجربی

 حل ویدئویی سوالات این درس را در
وبایت DriQ.com مشاهده کنید

۱۲ | فیزیک

404D

- ۹۱- کدام گزینه در مورد مقایسه ای انرژی جنبشی اجسام زیر درست است؟



$K_4 > K_3 > K_2 > K_1 \quad (1)$

$K_4 > K_3 > K_1 > K_2 \quad (2)$

$K_3 > K_4 > K_2 = K_1 \quad (3)$

$K_4 > K_2 > K_1 = K_3 \quad (4)$

- ۹۲- برایند نیروهای وارد بر جسم ساکنی برابر $\bar{F} = 4\bar{F}_0$ بمحاسبه نیوتون است، این نیرو جسم را ۴ متر جابه‌جا می‌کند. کار این نیرو در این جابه‌جایی چند ژول است؟

۲۰ (۲)

۱۰۰ (۴)

- ۹۳- اگر تندي و جرم جسم هر کدام نصف شود، انرژی جنبشی آن جسم چند برابر می‌شود؟


$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (4)$

$\frac{1}{8} \quad (3)$


$\frac{1}{2} \quad (2)$

$\frac{1}{4} \quad (1)$

- ۹۴- شخصی جسمی را یکبار با طنابی بلند «الف» و بار دیگر با طنابی کوتاه‌تر «ب» روی سطحی هموار می‌کشد. اگر جابه‌جایی و کاری که این شخص روی جعبه انجام می‌دهد در هر دو حالت یکسان باشد و اصطکاک ناچیز فرض شود، کدام گزینه در مورد مقایسه نیروی واردشده به جعبه درست است؟



(الف)



(ب)

- (۱) شخص در شکل «الف» نیروی بیش‌تری وارد کرده است.
- (۲) شخص در شکل «ب» نیروی بیش‌تری وارد کرده است.
- (۳) نیروی واردشده در هر دو شکل یکسان است.

(۴) هریک از گزینه‌های (۱)، (۲) و (۳) می‌توانند درست باشند.

- ۹۵- انرژی جنبشی گلوله‌ای 10 Joule و سرعت آن $2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ است. سرعت آن را به چند متر بر ثانیه برسانیم تا انرژی جنبشی آن 40 Joule شود؟

۴ (۲)


۱۶ (۴)

۲ (۱)

۸ (۳)

- ۹۶- مطابق شکل جسمی به جرم 5 kg در اثر اعمال سه نیروی F_1 ، F_2 و F_3 به اندازه 3 m روی سطح افقی به طرف راست جابه‌جا می‌شود.

اگر کل کار انجام شده روی جسم 36 J باشد، اندازه نیروی اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح چند نیوتون است؟ ($\cos 37^\circ = 0.8$)



۲ (۱)

۴ (۲)

۶ (۳)

۸ (۴)

- ۹۷- اتومبیلی که با تندي اولیه 7 m در حال حرکت است به اندازه 10 km/h بر تندي اش می‌افزاید و انرژی جنبشی اش $\frac{16}{9}$ برابر می‌شود. تندي اولیه‌ی آن چند متر بر ثانیه بوده است؟

۶۰ (۴)

۱۰۸ (۳)

۹۰ (۲)


۳۰ (۱)

محل انجام محاسبات

شیمی | ۱۳


حل ویدئویی سوالات این فقرچه را در
ویسایت DriQ.com مشاهده کنید.

سوال دهم تجربی



- ۹۸- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم ۲ کیلوگرم از نقطه‌ی A تا نقطه‌ی B جایه‌جا می‌شود. کار انجام‌شده توسط یک نیروی ۱۲ نیوتونی را که به این جسم وارد می‌شود W می‌نامیم. بر حسب ژول برابر کدام گزینه نمی‌تواند باشد؟

- (۱) صفر
- (۲) -۲۵
- (۳) ۴۰
- (۴) -۳۵



404D


- ۹۹- رانندگی با افزایش تندي اتومبیل، انرژی جنبشی را ۴۴ درصد افزایش می‌دهد. تندي اتومبیل چند درصد افزایش یافته است؟

- (۱) ٪۲۰
- (۲) ٪۶۰
- (۳) ٪۸۰
- (۴) ٪۱۲۰

- ۱۰۰- مطابق شکل، یک بار نیروی $F_1 = 2N$ را بر جسم ساکن M وارد کرده و آن را ۱۰ متر جایه‌جا می‌کنیم. اگر برای بار دوم نیروی F_2 را بر جسم ساکن M وارد کنیم و آن را ۱۰ متر جایه‌جا کنیم. F_2 چند نیوتون باشد تا مقدار کار نیروهای F_1 و F_2 در این جایه‌جایی‌ها برابر شود؟

$$(\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \sin 53^\circ = \frac{4}{5}, \cos 53^\circ = \frac{3}{5})$$

- (۱) ٪۱۸
- (۲) ٪۲
- (۳) ٪۲۱۲
- (۴) ٪۲۴



DriQ.com

شیمی

- ۱۰۱- انرژی نور آبی از نورهای سرخ و نیلی به ترتیب و است. (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید).

- (۱) بیشتر - کمتر
- (۲) بیشتر - بیشتر
- (۳) کمتر - کمتر
- (۴) کمتر - بیشتر

- ۱۰۲- طول موج چه تعداد از پرتوهای زیر کمتر از ۴۰۰ نانومتر است؟

- | | | | |
|-------------|----------------|--------------------|----------------|
| • ریزموج‌ها | • پرتوهای ایکس | • پرتوهای فرابینفش | • پرتوهای گاما |
| ۱ (۴) | ۲ (۳) | ۳ (۲) | ۴ (۱) |

- ۱۰۳- کدام یک از مطالب زیر در مورد لیتیم نادرست است؟

- (۱) طیف نشری خطی لیتیم در گستره‌ی نور مرئی، شامل چهار خط یا طول موج زنگی است.

- (۲) رنگ شعله‌ی هر سه ترکیب لیتیم نیترات، لیتیم کلرید و لیتیم سولفات، سرخ است.

- (۳) رنگ شعله‌ی فلز لیتیم مشابه نوار زنگی موجود در طیف نشری خطی هیدروژن است که در نتیجه‌ی انتقال الکترون از $n=3$ به $n=1$ ایجاد می‌شود.

- (۴) رنگ نشر شده از شعله‌ی فلز لیتیم، باریکه‌ی بسیار کوتاهی از گستره‌ی طیف مرئی را در بر می‌گیرد.

- ۱۰۴- در ساخت تابلوهای تبلیغاتی برای ایجاد نوشته‌های نورانی سرخ فام از لامپ حاوی چندمین گاز نجیب جدول استفاده می‌شود؟

- | | | | |
|-----------|----------|----------|------------|
| ۱) نخستین | ۲) دومین | ۳) سومین | ۴) چهارمین |
|-----------|----------|----------|------------|

- ۱۰۵- کدام یک از مطالب زیر نادرست است؟

- (۱) ارتباط میان تلویزیون و کنترل آن توسط پرتوهای فروسرخ انجام می‌شود.

- (۲) هیچ‌کدام از پرتوهای الکترومغناطیسی با چشم قابل دیدن نیستند.

- (۳) رنگ شعله‌ی فلز مس، سبزرنگ است.

- (۴) شیمی‌دان‌ها به فرایندی که در آن یک ماده‌ی شیمیابی با جذب انرژی، از خود پرتوهای الکترومغناطیسی گسیل می‌دارد، نظر می‌گویند.

محل انجام محاسبات



۱۰۶ - مدل بور طیف نشري خطی چه تعداد از عنصرهای زیر را توانست با موفقیت توجیه کند؟

Ne •

۴ (۴)

Li •

۳ (۳)

He •

۲ (۲)

H •

۱ (۱)

۱۰۷ - کدامیک از مطالب زیر درست است؟

۱) آرایش الکترونی اتم عنصرهای دسته‌های p و d به ترتیب به زیرلایه‌های p و d ختم می‌شود.

۲) شمار الکترون‌های ظرفیتی اتم I_۳ بیشتر از اتم Mn_{۲۵} است.

۳) حداقل شمار الکترون‌های ظرفیتی یک اتم برابر با ۸ است.

۴) هر دو عنصر A_۹ و X_۹ متعلق به دسته‌ی f هستند (A و X نمادهای فرضی می‌باشند).

۱۰۸ - کدامیک از شکل‌های زیر را می‌توان به بخش مرئی طیف نشري خط اتم هیدروژن نسبت داد؟ (اعداد روی شکل طول موج بر حسب nm را نشان می‌دهد).



۱۰۹ - کدامیک از مطالب زیر درست است؟

۱) هر زیرلایه را با نماد ۱ نشان می‌دهند.

۲) پنجمین زیرلایه‌ی یک اتم (در صورت وجود)، ظرفیت پذیرش ۲۲ الکترون را خواهد داشت.

۳) لایه‌ی ظرفیت یک اتم، لایه‌ای است که الکترون‌های آن، رفتار شیمیایی اتم را تعیین می‌کند.

۴) در آرایش الکترونی فشرده‌ی اتم‌ها، باقی‌مانده‌ی آرایش نسبت به گاز نجیب، نشان‌دهنده‌ی شمار الکترون‌های ظرفیتی اتم مورد نظر است.

۱۱۰ - کدامیک از مطالب زیر نادرست است؟

۱) انرژی برخلاف ماده در نگاه میکروسکوپی، پیوسته اما در نگاه میکروسکوپی، گستته یا کوانتومی است.

۲) در گستره‌ی مرئی طیف نشري خطی به دست آمده از اتم‌های هیدروژن، وجود چهار خط یا نوار رنگی با طول موج و انرژی معین تأیید شده است.

۳) در ساختار لایه‌ای اتم، انرژی الکترون‌ها با افزایش فاصله از هسته، زیاد می‌شود.

۴) هر نوار رنگی در طیف نشري خطی هر عنصر، پرتوهای نشر شده هنگام باگشت الکترون‌ها را از لایه‌های بالاتر به لایه‌های پایین‌تر نشان می‌دهد.

۱۱۱ - لایه‌ی الکترونی سوم شامل نوع زیرلایه و حداقل گنجایش آن الکtron است.

۱) ۱۸، ۲ (۲) ۸، ۳ (۳) ۸، ۲ (۲) ۸، ۲ (۲)

۱۱۲ - در بین عنصرهایی که الکترون‌های موجود در زیرلایه‌ی ۴s اتم آن‌ها، جزو الکترون‌های ظرفیتی محسوب می‌شوند، چند عنصر وجود دارد که آرایش الکترونی اتم آن‌ها به زیرلایه‌ی دو الکترونی ختم می‌شود؟

۱) ۹ (۴) ۱۱ (۳) ۸ (۲) ۸ (۲) ۱۰ (۱)

۱۱۳ - کدامیک از مطالب زیر در مورد قاعده‌ی آفبا و واژه‌ی آفبا نادرست است؟

۱) (آفبا) واژه‌ای آلمانی به معنای ساختن یا افزایش گام به گام است.

۲) مطابق قاعده‌ی آفبا، پرشدن زیرلایه‌ها تنها به عدد کوانتومی اصلی وابسته نیست.

۳) مطابق قاعده‌ی آفبا، هنگام افزودن الکترون‌ها به زیرلایه‌ها، نخست زیرلایه‌ای پر می‌شود که پایداری کمتری دارد.

۴) بطبق قاعده‌ی آفبا، زیرلایه‌ی ۶s قبل از زیرلایه‌ی ۴f الکترون می‌پذیرد.

محل انجام محاسبات

محل انجام محاسبات

404D

شیمی | ۱۵

حل ویدئویی سوالات این دفترچه را در
وبسایت DriQ.com مشاهده کنید.

سوال دهم تجربی



۱۱۴- در آرایش الکترونی اتم کدام عنصر، شمار الکترون‌های با $Z=1$ برابر با $Z=10$ است؟



۱۱۵- در آرایش الکترونی فشرده‌ی اتم‌های Ra_{88} , I_{53} و Ni_{28} پس از نماد گاز نجیب، به ترتیب از، و زیرلایه استفاده می‌شود. (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید).

۲، ۳، ۲ (۴)

۱، ۲، ۳ (۳)

۲، ۳، ۳ (۲)

۱، ۳، ۲ (۱)

۱۱۶- در ساختار یک اتم، حداکثر شمار الکترون‌هایی که مقدار $Z+n$ آن‌ها می‌تواند برابر با Z باشد، کدام است؟

۲۴ (۴)

۳۲ (۳)

۲۲ (۲)

۱۸ (۱)

۱۱۷- نخستین عنصر جدول دوره‌ای که براساس داده‌های طیفسنجی، آرایش الکترونی اتم آن از قاعده‌ی آفبا پیروی نمی‌کند، متعلق به کدام گروه جدول است؟

۴) هفتم

۳) ششم

۲) پنجم

۱) چهارم

۱۱۸- شماره‌ی گروه کدام عنصر با تعداد الکترون‌های ظرفیت آن برابر نیست؟



۱۱۹- عنصری در گروه دوازدهم و دوره‌ی پنجم جدول جای دارد. اگر شمار نوترون‌های آن، $\frac{4}{3}$ برابر شمار پروتون‌های آن باشد، عدد جرمی عنصر موردنظر کدام است؟

۱۱۲ (۴)

۱۵۴ (۳)

۶۴ (۲)

۸۸ (۱)

۱۲۰- در بین تمامی عنصرهای شناخته شده، به تقریب چند درصد از آن‌ها جزو عناصر دسته‌ی d هستند؟

۴۴ (۴)

۳۹ (۳)

۳۴ (۲)

۲۸ (۱)

دفترچه شماره ۲

آزمون شماره ۱۱

جمعه ۹۷/۰۹/۰۲



آزمون‌های سراسری کاج

گزینه درست را انتخاب کنید.

سال تحصیلی ۹۷-۹۸

پاسخ‌های تشریحی

پایه دهم تجربی

دورهی دوم متوسطه

شماره داوطلبی:	نام و نام خانوادگی:
مدت پاسخگویی: ۱۳۵ دقیقه	تعداد سوالاتی که باید پاسخ دهید: ۱۲۰

عنوانی مواد امتحانی آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد سوالات و مدت پاسخگویی


ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	شماره سوال از تا	مدت پاسخگویی
۱	فارسی ۱	۱۰	۱	۱۰ دقیقه
۲	عربی، زبان قرآن ۱	۱۰	۱۱	۱۰ دقیقه
۳	دین و زندگی ۱	۱۰	۲۱	۱۰ دقیقه
۴	زبان انگلیسی ۱	۱۰	۳۱	۱۰ دقیقه
۵	ریاضی ۱	۲۰	۴۱	۳۰ دقیقه
۶	زیست‌شناسی ۱	۲۰	۵۱	۲۰ دقیقه
۷	فیزیک ۱	۲۰	۶۱	۲۵ دقیقه
۸	شیمی ۱	۲۰	۷۱	۲۰ دقیقه

پایی اطلاع از نتیجه آزمون و زمان دین اعلام آن در کتابل نتیجه کار عضو شود. [@Ganjeh_ir](#)



آزمون‌های سراسری گاج


ویراستاران علمی	طراحان	دروس
ابوالفضل مزرعی - اسماعیل محمدزاده مسیح گرجی - مریم نوری‌نیا	امیرنجات شجاعی - مهدی نظری	فارسی
حسام حاج مؤمن - سمیه رضابور شاھو مرادیان - سید مهدی میرفتحی	راضیه یادگاری	زبان عربی
سمیه رضابور	محمد رضا عابدی شاهروdi	دین و زندگی
پریسا فیلو	امید یعقوبی فرد	زبان انگلیسی
پگاه افتخار - سودابه آزاد	ندا فرهختی - سبحان سیف‌اللهی راد امید حیدری - بهروز درزاده	ریاضیات
ابراهیم زره‌پوش - فاطمه نوروزی نسب زینب علیپور - سانا ز فلاحتی	پوریا آیتی	زیست‌شناسی
علی جهانگیری - محمدحسین جوان محسن یدالله نبی - رزیتا قاسمی مروارید شاهحسینی	علی امانت	فیزیک
ایمان زارعی - امین بابازاده رضیه قربانی	مریم تمدنی	شیمی



دفتر مرکزی تهران، خیلان انقلاب، بین
چهارراه ولی‌عصر (عج) و
خیابان فلسطین، شماره ۹۱۹

تلفن روابط عام ۰۲۱-۶۴۲۰

نشانی اینترنتی www.gaj.ir



امداده‌سازی آزمون

مدیریت آزمون: ابوالفضل مزرعی

بازبینی و نظارت نهایی: سارا نظری

برنامه‌ریزی و هماهنگی: مریم جمشیدی عینی - مینا نظری

ویراستاران فنی: رزیتا قاسمی - بهاره سلیمی - سانا ز فلاحتی - آمنه قلی‌زاده - سمیه رضابور
بهاره سادات موحدی - مریم پارسایان

مدیر فنی: مهرداد شمسی

سرپرست واحد فنی: سعیده قاسمی

طرح شکل: فاطمه میناشرشت

حروف‌نگاران: پگاه روزبهانی - آنیتا طارمی - زهرا نظری‌زاد - سارا محمودنسب - نرگس اسودی
فرهاد عبدی

امور چاپ: عباس جعفری

به نام خدا

حقوق دانشآموزان در آزمون‌های سراسری گاج

داوطلب گرامی؛ با سلام در اینجا شما را با بخشی از حقوق خود در آزمون‌های سراسری گاج آشنا می‌نماییم:

۱- اطلاعات شناسنامه‌ای و آموزشی شما مانند نام، نام خانوادگی، جنسیت و گروه آزمایشی بایستی به صورت صحیح در بالای پاسخ‌برگ درج شده باشد.

۲- آزمون‌های سراسری گاج باید راس ساعت اعلام شده در دفترچه، شروع و خاتمه یابد.

۳- محل برگزاری آزمون باید از لحاظ سرمایش و گرمایش، نور کافی، نظافت و سایر موارد در حد مطلوب و استاندارد باشد.

۴- سوالات آزمون‌های سراسری گاج بایستی نزدیک‌ترین سوالات به کنکور سراسری باشد و عاری از هرگونه اشکال علمی و تایبی باشد.

۵- در هنگام برگزاری آزمون باید تغذیه رایگان دریافت نمایید.

۶- بعد از هر آزمون و به هنگام خروج از جلسه آزمون بایستی پاسخ‌نامه‌ی تشریحی هر آزمون را دریافت نمایید.

۷- کارنامه‌ی هر آزمون بایستی در همان روز آزمون به روش‌های ذیل تحویل شما گردد:

- مراجعه به سایت گاج به نشانی www.gaj.ir

- مراجعه به تمایندگی.

۸- خدمات مشاوره‌ای رایگانی که در طی ۱ مرحله آزمون (ویژه داوطلبان آزاد) ارائه می‌گردد شامل:

- برگزاری جلسه مشاوره حضوری به صورت انفرادی حداقل یکبار در طی هر آزمون توسط رابط تحصیلی.

- تماس تلفنی حداقل ۲ بار در طی هر آزمون توسط رابط تحصیلی.

- تماس تلفنی با اولیا حداقل یکبار در هر فاز [آزمون‌های سراسری گاج در چهار فاز تابستانه، ترم اول، ترم دوم و جامع برگزار می‌گردد].

- بررسی کارنامه آزمون توسط رابط تحصیلی در هر آزمون.

چنانچه در هر یک از موارد فوق کمبود و یا نقصی مشاهده نمودید لطفاً بلاfacilه با تلفن ۰۶۴۲۰—۰۲۱ تماس حاصل نموده و مراتب را اطلاع دهید.



در گاج، بهترین صدا،
صدای دانشآموز است.



پاسخ دهم تجربی

حل ویدئویی سوالات این فقرچ را در
وسایت DriQ.com مشاهده کنید.

۴ | فارسی / زبان عربی

فارسی۱۲ **اثرید:** آیا می‌خواهی؛ فعل مضارع است. [رد گزینه (۳)]آجرور: پاداش‌هایی؛ جمع «أجر» است. [رد گزینه (۱) و (۴)]
بعد الموت: پس از مرگ [رد گزینه (۱)]۱۳ **بررسی سایر گزینه‌ها:**(۱) **میتان و خمسه و شمانون:** دویست و هشتاد و پنج ترجمه: دویست و هشتاد و پنج منهای صد و نود و نه مساوی است با هشتاد و شش.(۲) **غایکم بالتسیاحه:** شما باید به گردش بروید / **هذا الشعع:** این ملت / **جدّا:** بسیار

ترجمه: شما باید به گردش برویدا چندبار به اینجا آمدم زیرا این ملت بسیار مهمان نواز هستند.

(۳) **لا تَقْرُّوا:** پراکنده نشوید / **و اعلموا:** و بدانید / **الوَجْحَ:** درد

ترجمه: پراکنده نشوید و با جماعت باشید و بدانید که درد کمش زیاد است.

۱۴ **ترجمة عبارت سؤال:** «و هر چه را از نیکی برای خودتان پیش

بفرستید، نزد خدا آن را می‌یابید.»

ترجمة گزینه‌ها:

(۱) «هر کس از مردم تشکر نکند، خدا را شکر نکرده است.»

(۲) «اگر نیکی کنید به خودتان نیکی می‌کنید و اگر بدی کنید، پس به خودتان است.»

■■■ **گزینه مناسب را در مورد سوالات زیر مشخص کن (۲۰ - ۱۶):**۱۵ **۳:۴۰:** یعنی بیست دقیقه مانده به هفت، پس می‌شود
الساعة إلأىعشرين دقيقة.۱۶ **۱:** «عشرین» هم از اعداد اصلی است و هم ترتیبی، اما اینجا چون قبل از محدود قرار گرفته، عدد اصلی است.

ترجمه: تیم ما بیست جایزه را به دست آورد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) «الثالث» چون بعد از محدود آمده، عدد ترتیبی است.

(۲) «العاشر» چون بعد از محدود آمده، عدد ترتیبی است.

(۳) «العشرين» چون بعد از محدود آمده، عدد ترتیبی است.

۱۷ **۴:** ترجمه عبارت سؤال: کشاورزی نود و نه درخت کاشت. سال‌ها

بعد هشتادتا از آن‌ها میوه می‌دهد و میوه‌هایشان بیست صندوق می‌شود. چند درخت، میوه دارد؟

ترجمة گزینه‌ها:

(۱) نوزده (۲) هفتاد و نه

(۳) صد (۴) هشتاد

توضیح: در متنه گفته است هشتادتا از آن درخت‌ها میوه می‌دهد، پس هشتاد درخت، میوه دارد!

۱۸ **۴:** ترجمه عبارت سؤال: عبارتی را مشخص کن که در آن عدد

ترتیبی و غیرترتیبی (اصلی) به ترتیب آمده است:

بررسی گزینه‌ها:

(۱) **خمس:** اصلی / **الثالث:** ترتیبی (۲) **ثلاث:** اصلی / **الأولى:** ترتیبی(۳) **الثالثة:** ترتیبی / **الثاني:** ترتیبی (۴) **الأولى:** ترتیبی / **أربع:** اصلی۱۹ **۲:** ترجمه عبارت: گردشگران ده کلید برای اتاق‌هایشان در هتل دریافت کردند.

نکته: چون جای خالی قبل از محدود است، پس باید در جای خالی عدد اصلی قرار بگیرد.

فارسی۱ **معنی درست واژه‌ها:** مخصوصه: بدینه و غم بزرگ، تنگنا، این واژه به معنی «گرفتاری» متدال شده است. / **ادیب:** بافهنج، دانشمند، بسیاردان / **گسیل** کردن: روانه کردن، فرستادن کسی به جای / **معاشرت:** گفت و شنید، البت داشتن، رفت و آمد۲ **معنی درست واژه‌ها:** **وقب:** هر فورفتگی اندام چون گودی چشم / **گردد:** پشت، بالای کمر / **غارب:** میان دو گفت۳ **معنی درست واژه:** بیغوله: کنج، گوشاهی دور از مردم۴ **املای درست واژه:** غربت (دوری از وطن) / قربت: نزدیکی در این گزینه «واطف» به کار رفته است.۵ **بررسی آرایه‌ها:** تشبیه (بیت «الف»): من به صورت دیوار

تلمیح (بیت «ج»): اشاره به داستان خضر پیامبر (ع)

کنایه (بیت «ب»): دل کنن کنایه از قطع علاقه کردن جان بخشی (بیت «د»): جان بخشی به خانه و نسبت دادن بی خبری به آن

۶ **مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینه (۳):** لذت رنج عاشقی / رهایی ناپذیری از عشق بودن مرگ۷ **مفهوم مشترک عبارت سؤال و سایر گزینه‌ها:** غربت و بارگشت به وطن۸ **بررسی سایر گزینه‌ها:** طلب آمرزش از خداوند

(۱) ناگوار بودن ترک عادت

(۴) بی‌همتایی معشوق در زیبایی و بی‌همتایی عاشق در تنها

۹ **مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینه (۳):** ظاهر آینه‌ی باطن است. / از کوزه همان برون تراود که در اوست.۱۰ **بررسی سایر گزینه‌ها:**

(۱) سرگشتنی عاشق و تقابل عشق و آسایش

(۲) خاکساری عاشق

(۴) پاکبازی عاشق / عشق زندگی بخش است.

۱۱ **مفهوم گزینه (۲):** خاکساری در برابر معشوق موجب ارزشمندی است.

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه‌ها: ناپایداری موقعیت‌ها و قدرت دنیوی

زبان عربی۱۱ **درست ترین و دقیق ترین جواب را در ترجمه یا مفهوم مشخص کن (۱۵ - ۱۱):**۱۲ **ما أَجْعَلَ:** چه زیباست [رد گزینه‌های (۱) و (۲)]

أربعين صباحاً: چهل صبح [رد گزینه (۴)]

من قلبِ از قلب؛ بدون ضمیر آمده است. [رد گزینه (۴)]

۱۳ **تَنَاجِي:** راز می‌گویی؛ فعل مضارع مثبت است. [رد سایر گزینه‌ها]

آنفه: امانت‌داران؛ جمع «أَمِينٌ» است. [رد سایر گزینه‌ها]

دین و زندگی / زبان انگلیسی | ۵

حل ویدئویی سوالات این دفترچه را در
ویسایت DriQ.com مشاهده کنید.

پاسخ دهم تجربی



دین و زندگی

۳۲ بیست و پنج سال قبل اصلاً تلفن هوشمند وجود نداشت. اما طرف چند سال همه جا تلفن‌های فوق هوشمند وجود خواهد داشت.

توضیح: کاربرد اصلی زمان آینده‌ی ساده (در این مورد "will be") برای اشاره به عملی است که قرار است در زمان آینده انجام شود. در این مورد به کاربرد "in a few years' time" (ظرف چند سال) که به زمان آینده اشاره دارد، دقت کنید.

۳۳ شرکت ما پول زیادی از دست می‌دهد، بنابراین کاری باید انجام شود، یا به زودی به مشکل جدی خواهیم خورد.

- (۱) نگه داشتن؛ برگزار کردن
- (۲) درست کردن؛ باعث ... شدن
- (۳) از دست دادن؛ گم کردن
- (۴) گرفتن؛ شدن

۳۴ این عصر اطلاعات است و کامپیوتراها نقش بسیار مهمی در زندگی‌های روزمره‌ی ما بازی می‌کنند.

- (۱) اطلاعات
- (۲) بیان؛ اصطلاح؛ حالت چهره
- (۳) پذیرش؛ دریافت
- (۴) سازمان؛ سازماندهی

۳۵ قبل از این‌که با ماشینتان هر جایی بروید، باید همیشه وسیله‌ی نقلیه را کنترل کنید تا مطمئن شوید که برای رانندگی امن است.

- (۱) طبیعی؛ ذاتی
- (۲) امن، ایمن
- (۳) واضح؛ روش
- (۴) مثبت

ممکن است به نظر برسد که موجودات بسیار کمی می‌توانند در بیابان زنده بمانند (زنده‌ی کنند). بیش تر گیاهان و حیواناتی که شما در شهر خود می‌بینید احتمالاً نمی‌توانند [زنده بمانند]. اما گونه‌های بسیار مختلفی از گیاهان و حیوانات هستند که کاملاً با اقلیم گرم [او] خشک متناسب هستند.

در بیابان، مقدار خیلی کمی آب وجود دارد. گیاهان و حیواناتی که در بیابان زنده‌ی می‌کنند ویژگی‌های خاصی برای زنده‌ی کردن (زنده بماندن) با آب کم دارند. گیاهانی هم چون کاکتوس، برگ‌های کوتاهی دارند. این برگ‌ها آب را می‌گیرند و ذخیره می‌کنند. کاکتوس هم چنین روی برگ‌هایش تغییر دارد. این برای دور نگه داشتن حیوانات از بردن آب [داخل ریشه] هایش است.

حیواناتی که در بیابان‌ها زنده‌ی می‌کنند اغلب شبزی هستند. این به معنای آن است که در طول روز می‌خوابند. آن‌ها در شب زمانی که هوا خنک است برای خودن بیرون می‌آینند. حیوانات دیگر مانند شتر در طول گرماه روز بیدارند. آن‌ها مژه‌های مخصوصی دارند که چشم‌هایشان را از شن در امان نگه می‌دارند. آن‌ها سوراخ‌های بینی‌ای دارند که می‌توانند برای در امان نگه داشتن بینی‌شان از شن، بسته شوند. آن‌ها می‌توانند روزهای زیادی را بدون نوشیدن [آب]، دوام بیاورند. بسیاری از حیواناتی که در بیابان زنده‌ی می‌کنند، می‌توانند تمام آبی که نیاز دارند را از غذاهایی که می‌خورند، دریافت کنند.

۳۶ کدام‌یک از این‌ها می‌تواند عنوان خوبی برای این متن باشد؟

- (۱) یک حیوان عادی در بیابان
- (۲) حیات گیاهی و جانوری در بیابان
- (۳) چگونه در بیابان خنک بمانیم
- (۴) گیاهانی که در بیابان دوام می‌آورند

۳۷ چه چیزی شترها را حیواناتی بی‌همتا یا خاص می‌کند؟

- (۱) آن‌ها تنها پستانداران زنده‌ای هستند که می‌توانند در بیابان دوام بیاورند.
- (۲) آن‌ها در شب وقتی که خنک است بیدار هستند تا بتوانند غذا بیابند.
- (۳) آن‌ها مژه‌ها و سوراخ‌های بینی خاصی دارند تا به دور نگه داشتن شن از بدن هایشان کم کنند.

(۴) آن‌ها هنگامی که در بیابان خیلی گرم است در زیر سنگ‌ها زنده‌ی می‌کنند.

۲۱ خداوند آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی بهره‌مندی از آن‌ها را در وجود او قرار داده است.

۲۲ خدای متعال، شناخت خیر و نیکی و گرامیش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود ما قرار داد، تا به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم. از این روست که همه‌ی ما فضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم و از دوروبی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم. آیات ۷ و ۸ سوره‌ی شمس: «و نفس و ما سوّاها فالهمها فُجورها و تقواها: سوگند به نفس و آن‌که سامانش بخشید، آن‌گاه بدکاری‌ها و تقواش را به او الهام کرد» بیانگر همین مفهوم است.

۲۳ در ترجمه‌ی آیه‌ی ۹۱ سوره‌ی مائدۀ آمده است: «شیطان می‌خواهد به وسیله‌ی شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز بازدارد».

۲۴ بعد جسمانی و مادی انسان، مانند سایر اجسام و مواد، تجزیه و تحلیل می‌پذیرد و سرانجام فرسوده و متلاشی می‌گردد و به مکان و زمان نیازمند و محدود است. در مقابل، بعد روحانی و غیرجسمانی انسان تجزیه و تحلیل نمی‌پذیرد، متلاشی نمی‌شود و بعد از مرگ بدن، باقی می‌ماند و آگاهی و حیات خود را از دست نمی‌دهد.

۲۵ در حدیثی از رسول خدا (ص) آمده است: «برای نابودی و فنا خلق نشده‌اید، بلکه برای بقا آفریده شده‌اید و با مرگ تنها از جهانی به جهانی دیگر، منتقل می‌شوید».

۲۶ رسول خدا (ص) در پاسخ به پرسش «با هوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟» فرمودند: «آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آمده می‌کنند».

۲۷ در حدیثی از رسول خدا (ص) آمده است که «مردم [در این دنیا] در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می‌شوند».

۲۸ در ترجمه‌ی آیه‌ی ۶۹ سوره‌ی مائدۀ آمده است: «هر کس به خدا و روز آخرت ایمان آورد و عمل صالح انجام بدهد، نه ترسی بر آنان است و نه غمگین می‌شوند».


۲۹ آن‌گاه که امام حسین (ع) در دوراهی ذلت و شهادت قرار گرفت، شهادت را برگزید و فرمود: «من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی‌بینم».

۳۰ در ترجمه‌ی آیه‌ی ۲۴ سوره‌ی جاثیه از قول کافران گفته شده است که «و ما را فقط گذشت روزگار نابود می‌کنند».

زبان انگلیسی

۳۱ این‌ها پدربرزگ و مادربرزگ من هستند و آن افراد در آن جا پدربرزگ و مادربرزگ دوستم هستند.


توضیح: هر دو ضمیر اشاره‌ی موردنظر در این تست، برای اشاره به جمع به کار رفتنه‌اند؛ با این تفاوت که ضمیر قرارگرفته در جای خالی اول برای اشاره به نزدیک است و در نتیجه در این مورد "these" مدنظر است، اما طبق مفهوم جمله، ضمیر قرارگرفته در جای خالی دوم برای اشاره به دور است و در مورد دوم "those" را انتخاب می‌کنیم.



پاسخ دهم تجربی

حل ویدئویی سوالات این دفترچه را در
وبسایت DriQ.com مشاهده کنید.

۶ | ریاضیات

در این سؤال هدف محاسبه x است.

۴۴

$$\cos \theta = \frac{AH}{x} \Rightarrow AH = x \cdot \cos \theta \quad (I)$$


$$\sin \theta = \frac{MH}{x} \Rightarrow MH = x \cdot \sin \theta \quad (II)$$

$$S = \frac{MH \times AH}{2} \quad (I), (II) \rightarrow S = \frac{x \cdot \sin \theta \times x \cdot \cos \theta}{2} = 6$$

$$\Rightarrow x^2 \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta = 12$$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{12}{\sin \theta \cdot \cos \theta} \Rightarrow x = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{\sin \theta \cos \theta}}$$

مطلوب مسئله: ۴۵




$$\triangle ABM: \cos 60^\circ = \frac{AB}{AM} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{4}{AM} \Rightarrow AM = 8$$

$$\sin 60^\circ = \frac{MB}{AM} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{MB}{8} \Rightarrow MB = 4\sqrt{3}$$

$$\triangle BMC: \sin 30^\circ = \frac{MB}{MC} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{MC} \Rightarrow MC = 12$$

$$AM + MC = 8 + 12 = 20$$

۱ ۴۶ ابتدا به دو روش می‌توان a (اندازهٔ ضلع شش‌ضلعی) را محاسبه کرد:
روش اول:




$$AH = BH = \frac{AB}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

$$\triangle AHC: \cos 30^\circ = \frac{AH}{AC} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{AC} \Rightarrow AC = 2$$

بنابراین طول ضلع شش‌ضلعی منتظم برابر است با 2 .روش دوم: طول قطر کوچک و قطر بزرگ هر شش‌ضلعی منتظم به ضلع a برابر است با:

$$AD = 2a, AB = \sqrt{3}a \quad \frac{AB = 2\sqrt{3}}{\sqrt{3}a = 2\sqrt{3}} \Rightarrow a = 2$$

نکته: در شش‌ضلعی منتظم دو نوع قطر داریم. قطر کوچک و قطر بزرگ. اگر طول ضلع شش‌ضلعی برابر a باشد، در این صورت مطابق شکل طول قطر بزرگ برابر است با $AC = 2a$ و طول قطر کوچک بنا به رابطهٔ فیثاغورس برابر است با:



۴ ۳۸ کدامیک از این‌ها به کاکتوس کمک می‌کند تا جلوی حیوانات را از بردن آب [داخل ریشه] هایش بگیرد؟

- (۱) برگ‌های کوتاه
- (۲) ریشه‌های عمیق
- (۳) تیغ‌های روی برگ
- (۴) ذخیره‌ی آب

۳ ۳۹ کلمهٔ "their" که در پاراگراف آخر زیر آن خط کشیده شده است، به "camels" اشاره دارد.

- (۱) حیوانات شبزی
- (۲) سوراخ‌های بینی
- (۳) شترها

۴ ۴۰ حیواناتی که در طول روز می‌خوابند نامیده می‌شوند.

- (۱) حیوانات بیابان
- (۲) موجودات بیابان
- (۳) شترها

۶ | ریاضیات

۳ ۴۱ چون دنبالهٔ موردنظر یک دنبالهٔ هندسی می‌باشد، می‌توان نوشت:

$$x, 2, y, z, 54 \Rightarrow 2 \times r^3 = 54 \Rightarrow r^3 = 27 \Rightarrow r = 3$$

$$\Rightarrow x \times r = 2 \quad \frac{r=3}{x=\frac{2}{3}}$$

$$x = \frac{2}{3}, \text{ کوچک‌ترین جمله: } 54 = 3^6$$

$$b_6 = a_1 \cdot r^{n-1} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{729} = 1 \times (-\frac{1}{3})^{n-1} \\ a_1 = 1, r = -\frac{1}{3} \end{array} \right. \quad n = 6$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3^6} = (-\frac{1}{3})^{n-1} = \frac{1}{(-3)^{n-1}}$$


$$\Rightarrow 3^6 = (-3)^{n-1} \Rightarrow 6 = n-1 \Rightarrow n = 7$$

۴ ۴۲

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \times BC \times \sin B = \frac{1}{2} AC \times BC \times \sin C$$

$$\Rightarrow \frac{AC}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C} \Rightarrow \frac{4}{\sin 30^\circ} = \frac{AB}{\sin 45^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{AB}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \Rightarrow AB = 4\sqrt{2}$$

حال طول‌های BH و CH را حساب می‌کنیم تا ضلع BC حساب شود:

$$\cos 30^\circ = \frac{BH}{AB} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{BH}{4\sqrt{2}} \Rightarrow BH = 2\sqrt{6}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{CH}{AC} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{CH}{4} \Rightarrow CH = 2\sqrt{2}$$

$$BC = BH + CH = 2\sqrt{6} + 2\sqrt{2} = 2(\sqrt{6} + \sqrt{2})$$


$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BC \cdot \sin 45^\circ = \frac{1}{2} \times 4 \times 2(\sqrt{6} + \sqrt{2}) \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= 2\sqrt{12} + 4 = 4\sqrt{3} + 4 = 4(\sqrt{3} + 1)$$

ریاضیات | ۷

حل ویدئویی سوالات این فقره را در
ویسایت DriQ.com مشاهده کنید.

پاسخ دهم تجربی



۱ ۵۱

$$m = \tan 45^\circ = 1$$

$$y = ax + b \xrightarrow{m=1} y = x + b$$

↓ ↓
عرض از مبدأ شیب

چون خط $y = 3x + 4$ را در نقطه‌ای به طول ۱ - قطع می‌کند، هر ۲ خط باید به ازای -1 ، $x = -1$ ، y یکسان داشته باشند:


$$x = -1 \xrightarrow{y = 3x + 4} y = 3(-1) + 4 = 1$$

$$x = -1 \xrightarrow{y = x + b} y = -1 + b = 1 \Rightarrow b = 2$$

دقت کنید زاویه‌ی خط، فقط با جهت مثبت محور x دارای

اهمیت است. به همین علت شیب خط l_1 برابر است با $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ و

$$\text{شیب خط } l_1 \text{ برابر است با } \frac{\sqrt{3}}{3}$$



$$l_1: y = \sqrt{3}x - \sqrt{3}$$

$$l_2: y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \sqrt{3}$$

برای محاسبه مختصات نقطه‌ی تلاقی بایستی معادله‌ی دو خط را برابر قرار دهیم:

$$\begin{cases} y = \sqrt{3}x - \sqrt{3} \\ y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow \sqrt{3}x - \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \sqrt{3} \xrightarrow{\div \sqrt{3}}$$

$$x - 1 = \frac{1}{3}x + 1 \Rightarrow \frac{2}{3}x = 2 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow y = 3\sqrt{3} - \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

$(3, 2\sqrt{3})$: نقطه‌ی تقاطع

۳ ۵۳

$$\sqrt{\frac{\tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta}} = \sqrt{\frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}} = \sqrt{\sin^2 \theta} = |\sin \theta|$$

چون در ناحیه‌ی سوم مثلثاتی، $\sin \theta$ منفی است، پس:

$$|\sin \theta| = -\sin \theta$$

اگر به جای ۱ عبارت $\sin^2 x + \cos^2 x$ را جایگزین کنیم

داریم:

$$\sqrt{1 - 2 \sin x \cos x} + \sin x = \sqrt{(\sin x - \cos x)^2} + \sin x$$

$$= |\sin x - \cos x| + \sin x = (-\sin x + \cos x) + \sin x = \cos x$$

زیرا وقتی $\cos x > \sin x$ ، $0^\circ < x < 45^\circ$ است، پس درون قدرمطلق منفی است و با برداشتن قدرمطلق، عبارت قرینه می‌شود.

$\triangle ABC$: فیثاغورس در $AB^2 + BC^2 = AC^2$

$$\Rightarrow AB^2 = AC^2 - BC^2 = 4a^2 - a^2 = 3a^2$$

$$\Rightarrow AB^2 = 3a^2 \Rightarrow AB = a\sqrt{3}$$

$$= \text{مساحت دایره} = \pi a^2 = 4\pi$$

$$= 6 \times \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} = 6 \times \frac{4\sqrt{3}}{4} = 6\sqrt{3}$$

$$= 4\pi - 6\sqrt{3} = \text{مساحت ناحیه‌ی زنگی}$$

یادآوری: هر شش ضلعی منتظم به ضلع a ، از ۶ مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع تشکیل شده است، پس مساحت آن برابر است با:

$$S = 6 \times \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

۳ ۴۷

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \cot 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}, \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{4 \cos^2 60^\circ - \sin^2 30^\circ}{2 \cot^2 60^\circ - \frac{3}{2} \cos^2 45^\circ} = \frac{4 \times \frac{1}{4} - \frac{1}{4}}{2 \times \frac{1}{3} - \frac{3}{2} \times \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{3} - \frac{3}{4}} = \frac{\frac{1}{2}}{-\frac{1}{12}} = -6$$

۲ ۴۸

(۱) $\sin \alpha \cos \alpha < 0 \Rightarrow \cos \alpha, \sin \alpha$ مختلف‌اللامات‌اند.

$\Rightarrow \alpha$ در ربع دوم یا ربع چهارم است

(۲) $\sin \alpha \cot \alpha < 0 \Rightarrow \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha} \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} < 0$

$\Rightarrow \cos \alpha < 0 \Rightarrow \alpha$ در ربع دوم یا سوم است


در نتیجه با توجه به (۱) و (۲)، انتهای کمان α در ربع دوم قرار دارد.

اگر $15^\circ < \alpha < 30^\circ$ باشد، آن‌گاه $60^\circ < 2\alpha < 120^\circ$ خواهد بود.

با توجه به دایره‌ی مثلثاتی زیر، در این محدوده از زاویه‌ی 2α حدود $\cos 2\alpha$ برابر است با: حداقل مقدار $\cos 2\alpha$ که در 60° رخ می‌دهد.

$$\frac{1}{2} < \cos 2\alpha \leq 1$$


حداکثر مقدار $\cos 2\alpha$ که در 0° رخ می‌دهد.




$$\cos 2\alpha = -\frac{m}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} < -\frac{m}{2} \leq 1 \Rightarrow -2 \leq m < -1$$

با توجه به دایره‌ی مثلثاتی و محور \cos ها، واضح است که

از 90° تا 180° مقدار $\cos \theta$ از صفر تا -1 کاهش می‌یابد و از 180° تا 270° مقدار $\cos \theta$ از -1 تا صفر افزایش می‌یابد.





پاسخ دهم تجربی

حل ویدئویی سوالات این دفترچه را در
ویسایت DriQ.com مشاهده کنید.

۸ | زیست‌شناسی

۳ ۵۵

زیست‌شناسی

۱۶۱ همهٔ موارد به نادرستی بیان شده‌اند.

بررسی موارد:

الف) گروهی از جاندارانی که فاقد پیکره‌ی پریاخته‌ای هستند (جانداران تک‌یاخته‌ای)، می‌توانند با انتشار، مولکول‌های زیستی مورد نیاز خود را دریافت کنند و گروهی دیگر از آن‌ها از جملهٔ پارامسی از طریق فرایند آندوسیتوز، مولکول‌های زیستی مورد نیاز خود را جذب می‌کنند، واکوکل گوارشی تشکیل می‌دهند و آن‌ها را گوارش می‌کنند.

ب) در معدهٔ نشخوارکنندگان می‌توانیم جاندارانی را مشاهده کنیم که توانایی ترشح آنزیم‌های گوارشی را دارند، از جملهٔ باکتری‌هایی که سلول را تجزیه می‌کنند.

ج) گروهی از جانداران که در محیط‌های غیرخشک یا آبی سکونت دارند، می‌توانند ذرات غذایی درشت را گوارش کنند، مثل ماهی‌ها که لولهٔ گوارش دارند.

د) جاندارانی که فاقد سیستمی برای گوارش برون‌یاخته‌ای غذا هستند، شامل انگل‌ها و بسیاری از جانداران تک‌یاخته‌ای می‌باشند. لازم است دقت کنید که گروهی از جانداران تک‌یاخته‌ای از جملهٔ پارامسی، ذرات درشت را آندوسیتوز می‌کنند، سپس آن‌ها را در درون یاخته گوارش نموده و به ذرات یا مولکول‌های ریز تبدیل می‌کنند.

۴۶۲ بخشی از روده‌ی بزرگ که مدفوع در حال تشکیل را به سمت چپ بدن منتقل می‌کند، کولون افقی است. یاخته‌های بوشی کولون افقی همانند دیگر قسمت‌های روده‌ی بزرگ، فاقد ریزپر ز هستند که می‌توانند مادهٔ مخاطی ترشح کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) چهت حرکت محتویات در بخشی از کولون افقی به سمت لوزالمعده است، اما کولون افقی محتویات خود را از کولون بالا رو دریافت می‌کند، نه به طور مستقیم از روده‌ی باریک.

۲) در کولون پایین رو چهت حرکت محتویات لولهٔ گوارش در چهت جاذبه‌ی زمین است، اما کولون پایین رو اسفنکتر خارجی ندارد و اسفنکتر خارجی در انتهای راست‌روده قرار دارد که می‌تواند به صورت ارادی باعث دفع یا عدم دفع مدفوع شود.

۳) تمام روده‌ی بزرگ به واسطهٔ نوعی بافت پیوندی به نام صفاق به روده‌ی باریک متصل است، اما دقت کنید که فقط از روده‌ی کور زایده‌ای به نام آپاندیس خارج می‌شود.

۴۶۳ کوچک‌ترین بخش معده‌ی گاو، نگاری است که نمی‌توان گفت همواره محتویات خود را به محل شروع بلع یعنی ابتدا مری و حلق نزدیک می‌کند، چراکه نگاری پس از بلع اول که غذا وارد سیرابی و سپس وارد نگاری می‌شود، غذا را به مری می‌دهد، اما پس از بلع دوم وقتی غذا از سیرابی وارد نگاری می‌شود، نگاری محتویات لولهٔ گوارش را به هزارلا وارد می‌کند، بنابراین نمی‌توان گفت همواره محتویات را به مری وارد می‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) نزدیک‌ترین بخش معده به دم، سیرابی است که میکروب‌های موجود در سیرابی، به کمک ترشح مایعات دارای آنزیم، حرارت بدن و حرکات سیرابی تا حدودی می‌تواند در گوارش توده‌ی غذا مؤثر باشد.

۲) نزدیک‌ترین بخش معده به سر، نگاری است که هیچ‌گاه محتویات خود را به سیرابی وارد نمی‌کند، بلکه همواره محتویات خود را از سیرابی دریافت می‌کند.

نکته: دقت کنید که نزدیک‌ترین بخش لولهٔ گوارش به سر، دهان است.

۴) بزرگ‌ترین بخش معده، سیرابی است که همواره محتویات خود را به نگاری وارد می‌کند.

$$\begin{aligned} \cot 30^\circ + \cot 40^\circ &= \frac{\cos 30^\circ + \cos 40^\circ}{\sin 30^\circ \sin 40^\circ} \\ \tan 30^\circ + \tan 40^\circ &= \frac{\sin 30^\circ + \sin 40^\circ}{\cos 30^\circ \cos 40^\circ} \\ &= \frac{\cos 30^\circ \cdot \sin 40^\circ + \sin 30^\circ \cdot \cos 40^\circ}{\sin 30^\circ \cdot \sin 40^\circ} = \frac{\cos 30^\circ \cdot \cos 40^\circ}{\sin 30^\circ \cdot \sin 40^\circ} \\ &= \cot 30^\circ \cdot \cot 40^\circ \end{aligned}$$

۳ ۵۶

روش اول: دو طرف تساوی را بر $\cos^2 x$ تقسیم می‌کنیم.

$$\begin{aligned} \frac{\sin^2 x + \sin x \cos x}{\cos^2 x - \cos x \cos^2 x} &= \frac{1}{\cos^2 x} \\ \Rightarrow \tan^2 x + \tan x &= 1 + \tan^2 x \Rightarrow \tan x = 1 \Rightarrow x = 45^\circ \end{aligned}$$

روش دوم: گزینه‌ها را چک می‌کنیم؛ فقط $x = 45^\circ$ صدق می‌کند.

۱ ۵۷

$$\begin{aligned} \sin^4 x + \cos^4 x &= (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2\sin^2 x \cos^2 x \\ &= 1 - 2\sin^2 x \cos^2 x = 1 - 2\left(\frac{1}{4}\right)^2 = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8} \end{aligned}$$

۱ ۵۸

$$\begin{aligned} 1 + \tan^2 \theta &= \frac{1}{\cos^2 \theta} \Rightarrow 1 + \frac{1}{9} = \frac{1}{\cos^2 \theta} \Rightarrow \cos^2 \theta = \frac{9}{10} \\ \Rightarrow \cos \theta &= \pm \sqrt{\frac{9}{10}} \xrightarrow{\text{ربع دوم}} \cos \theta = \frac{-3}{\sqrt{10}} \\ \sin^2 \theta &= 1 - \cos^2 \theta = 1 - \frac{9}{10} = \frac{1}{10} \\ \Rightarrow \sin \theta &= \pm \sqrt{\frac{1}{10}} \xrightarrow{\text{ربع دوم}} \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{10}} \\ \Rightarrow \sin \theta \cos \theta &= \left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right) \left(\frac{-3}{\sqrt{10}}\right) = \frac{-3}{10} = -0.3 \end{aligned}$$

صورت و مخرج را بر $\cos \alpha$ تقسیم می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \frac{2 \sin \alpha + \cos \alpha}{-4 \sin \alpha + 2 \cos \alpha} &= \frac{\frac{2 \sin \alpha + \cos \alpha}{\cos \alpha}}{\frac{-4 \sin \alpha + 2 \cos \alpha}{\cos \alpha}} \\ &= \frac{2 \tan \alpha + 1}{-4 \tan \alpha + 2} \xrightarrow{\tan \alpha = a - 1} \frac{2(a-1)+1}{-4(a-1)+2} = \frac{2a-2+1}{-4a+4+2} \\ &= \frac{2a-1}{-4a+6} \end{aligned}$$

۴ ۶۰

$$\begin{aligned} 1 - \frac{\cos^2 x}{1 + \sin x} &= \frac{1}{\sqrt{5}} \Rightarrow \frac{1 + \sin x - (1 - \sin^2 x)}{1 + \sin x} = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \Rightarrow \frac{\sin^2 x + \sin x}{1 + \sin x} &= \frac{1}{\sqrt{5}} \Rightarrow \frac{\sin x(1 + \sin x)}{1 + \sin x} = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \Rightarrow \sin x &= \frac{1}{\sqrt{5}} \Rightarrow 1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} = \frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2} = \frac{1}{\frac{1}{5}} = 5 \end{aligned}$$

زیست‌شناسی | ۹

حل ویندوز سوالات این فقرچه را
DriQ.com مشاهده کنید.

پاسخ دهم تجربی



۶۷ ۳ حرکتی که همراه با بخش‌های منقبض‌شونده بین قطعه‌های شل است، حرکت قطعه‌قطعه‌کننده می‌باشد که نمی‌تواند در شرایطی محتویات لوله‌ی گوارش را به سمت دهان منتقل کند، چراکه حرکت دودی است که می‌تواند در شرایط استفراغ یا ریفلاکس معده این عمل را انجام دهد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) حرکتی که همراه با بخش‌های منقبض‌شونده بین قطعه‌های شل است، حرکت قطعه‌قطعه‌کننده می‌باشد که می‌تواند با گوارش مکانیکی غذا، در افزایش سطح تماس غذا با شیرهای پانکراس نقش داشته باشد.

(۲) حرکتی که همراه با بخش‌های منقبض‌شونده بین قطعه‌های شل نیست، حرکت دودی شکل است که می‌توان گفت در سراسر لوله‌ی گوارش بعد از بلع ایجاد می‌شود، از مری تا متخرج، حرکات دودی انجام می‌شود.

(۴) حرکتی که همراه با بخش‌های منقبض‌شونده بین قطعه‌های شل نیست، حرکت دودی است که اتفاقاً می‌تواند در روده‌ی بزرگ که عمل اصلی آن جذب آب و یون‌ها است با سرعت کمی ایجاد شود.

۶۸ ۱ بر روی هر چین خورددگی حلقوی، تعداد زیادی پرز وجود دارد، و هر پرز از تعداد زیادی یاخته‌ی دارای ریزپرز تشکیل شده است. این یاخته‌ها فقط در سطح رأسی خود ریزپرز دارند و در بخشی از غشای خود یعنی سطح قاعده‌ای و سطوح جانبی فاقد ریزپرز هستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۲) نمی‌توان گفت هر رگ موجود در پرز می‌تواند شبکه‌ی مویرگی تشکیل دهد، چراکه مویرگ‌های لنفی این‌گونه نیستند.

(۳) تعداد زیادی پرز در کثار هم می‌تواند بر روی چین خورددگی حلقوی قرار داشته باشد، نه این‌که چین خورددگی طولی را تشکیل دهنده.

(۴) نمی‌توان گفت هر ریزپرز می‌تواند مستقل از سایر ریزپرزها تغذیه شود، چراکه هر یاخته تعداد زیادی ریزپرز دارد و همه‌ی ریزپرزها یک یاخته از یک رگ خونی مشترک تغذیه می‌کنند، ولی پرزهای مختلف می‌توانند توسط رگ‌های خونی مجرأاً تغذیه شوند.

۶۹ ۲ چینه‌دان در ملخ، غذا را ذخیره و نرم می‌کند ولی وظیفه‌ی کیسه‌های معده، ترشح آنزیم‌های گوارشی و گوارش شیمیابی مواد غذایی است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) پیش‌معده هم در گوارش مکانیکی و هم در گوارش شیمیابی غذا نقش ایفا می‌کند، چراکه پیش‌معده با کمک دیواره‌ی ماهیچه‌های و دندانه‌دار مانند سنگدان در جانوران دیگر غذا را خرد می‌کند، علاوه‌بر آن آنزیم‌های ترشح شده از معده و کیسه‌های معده، به پیش‌معده هم می‌آیند و گوارش شیمیابی انجام می‌دهند.

(۲) پیش‌معده با گوارش مکانیکی غذا و ریزتر کردن غذاها و افزایش سطح تماس آن‌ها با آنزیم‌های گوارشی و افزایش احتمال ایجاد مونومر و معده و کیسه‌های معده با ترشح آنزیم‌های گوارشی و تبدیل درشت‌مولکول‌ها به مونومر، هر دو می‌توانند در افزایش مواد قابل جذب مؤثر واقع شود.

(۴) پیش‌معده در ملخ معادل سنگدان در پرنده‌گان دانه‌خوار است، که همانند روده‌ی ملخ، توانایی جذب مونومرهای حاصل از گوارش غذا را ندارد.

۷۰ ۳ بخش (۳) حنجره را نشان می‌دهد که در حالت عادی، پایین قرار گرفته و به هنگام بلع به سمت بالا حرکت می‌کند تا به کمک اپی‌گلوت مسیر حنجره و نای را مسدود کند، بنابراین حنجره ارتباطی با بستن راه می‌دارد.

۶۴ ۴ برخی از یاخته‌های پوششی روده‌ی باریک توانایی ترشح هورمون سکرین را دارد، این هورمون پس از ورود به خون، لوزالعده را تحریک نموده تا بیکربنات به درون روده‌ی باریک ترشح کند، ترشحات کبد یعنی صفراء خود دارای بیکربنات است و لوزالعده را تحریک نمی‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) غده‌های براقی همانند ترشحات پانکراس، می‌توانند با ترشح آنزیم آمیلاز در تولید مالتوز که نوعی دی‌ساکارید است، نقش مؤثری ایفا کنند.

(۲) غده‌های معده با ترشح آنزیم‌های تجزیه‌کننده‌ی پروتئین‌ها می‌توانند در گوارش غذا نقش ایفا کنند، اما ترشحات روده‌ی بزرگ نقشی در گوارش ندارند.

(۳) غده‌ی پانکراس با ترشح بیکربنات همانند ترشحات قلیایی روده‌ی باریک، در خنثی نمودن کیموس اسیدی معده نقش مؤثری دارد.

۶۵ ۲ در پارامسی، واکوئل دفعی مشکل است از محتویات درون واکوئل که مواد غذایی گوارش نیافته هستند و هم‌چنین مولکول‌هایی که غشاء واکوئل دفعی را تشکیل می‌دهند. توجه کنید که مولکول‌هایی که دیواره‌ی غشا را تشکیل می‌دهند، مولکول‌های فسفولیپیدی و پروتئینی هستند و این مولکول‌ها، مولکول‌های زیستی می‌باشند، پس واکوئل زیستی می‌تواند از مولکول‌هایی مغذی و زیستی تشکیل شده باشد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) بخش‌هایی از غشاء پارامسی که تحت تأثیر جابه‌جایی ذرات درشت مساحت آن تغییر می‌کند، می‌توانند علاوه بر حفره‌های دهانی، منفذ دفعی نیز باشند که در فرایند اگزوستوز، سطح غشایی آن افزایش پیدا می‌کند.

(۲) اندامک لیزوژوم، آنزیم‌های خود را به جایی ترشح نمی‌کند و خود اندامک با کریچه‌ی غذایی ادغام می‌شود و آنزیم‌های خود را بر روی محتویات کریچه‌ی غذایی می‌ریزد.

(۴) واکوئل غذایی، هیچ آنزیمی برای گوارش غذا ندارد و تنها واکوئل گوارشی است که از ادغام واکوئل غذایی و اندامک لیزوژوم تشکیل شده است و به واسطه‌ی لیزوژوم، آنزیم گوارشی دارد.

۶۶ ۳ در ریفلاکس معده، اسید معده از معده به مری وارد می‌شود، به این علت که مقدار انقباض بنداره‌ی انتهای مری کمتر شده است، راه بازگشت محتویات معده به مری باز است و این بازگشت می‌تواند در پی انقباضات کرمی‌شکل به صورت وارونه صورت گیرد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) در فرد مبتلا به بیماری سلیاک، ریزپرزا و پرزهای روی چین خورددگی‌های حلقوی از بین مریوند، نه خود چین خورددگی‌های حلقوی دیواره‌ی روده‌ی باریک.

(۲) نمی‌توان گفت فقط مقادیر زیاد کلسترول موجب سنگ صفرا شده است، چراکه براساس کتاب زیست‌شناسی (۱)، گاهی ترکیبات صفرا مانند کلسترول، بنابراین می‌توان گفت علاوه بر کلسترول ممکن است مواد دیگری نیز موجب تشکیل سنگ کیسه‌ی صفرا شوند.

(۴) بیماری یرقان می‌تواند علل مختلفی داشته باشد که یکی از آن‌ها، سنگ کیسه‌ی صفرا است. در سنگ کیسه‌ی صفرا توانایی جذب چربی‌ها کاهش پیدا می‌کند. در هر حال یرقان به دلیل کاهش توانایی جذب چربی‌ها به وجود نمی‌آید، بلکه کاهش جذب چربی‌ها به درون رگ‌های لنفی یکی از پیامدهای بیماری یرقان است، نه علت آن.

پاسخ دهم تجربی

حل ویدئویی سوالات این دفترچه را در
ویسایت DriQ.com مشاهده کنید.

۱۰ | زیست‌شناسی



۳ ۷۴ موارد «ج» و «د» صحیح هستند.

بررسی موارد:

الف) در صورتی که در ورود صفراء به ابتدای دوازدهه اختلال ایجاد شود، اموالسینون چربی‌ها به خوبی شکل نمی‌گیرد و تجزیه و جذب چربی‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. ویتامین K نوعی ویتامین محلول در چربی است که پس از جذب وارد رگ‌های لنفی می‌شود و نمی‌تواند وارد خون ورودی در کبد شود. به همین علت نمی‌توان گفت که ویتامین K در خون ورودی به گرد کاهش پیدا می‌کند، بلکه غلظت ویتامین K در لنفی که ووده باریک را ترک می‌کند، کم می‌شود.

ب) مولکولی فسفات‌دار می‌توان به ATP اشاره کرد که در صورت اختلال در تجزیه‌ی آن و تولید انرژی، ممکن است جذب برخی ترکیبات معدنی در روده دچار مشکل شود، ولی در جذب آن دسته از مواد معدنی که از طریق انتشار جذب می‌شوند، اختلالی ایجاد نمی‌شود.

ج) در صورت اختلال در فعل شدن پروٹازهای پانکراس، ممکن است جذب برخی آمینواسیدها هم‌چنان ادامه یابد، چراکه گروهی از آنزیم‌های آزادشده از دیواره روده باریک نیز در تولید آمینواسید نقش ایفا می‌کنند، البته نه همه آمینواسیدها.

د) در صورت اختلال در عملکرد پمپ سدیم - پتاسیم یاخته‌ی پوششی مخاط روده، شیب غلظت یون سدیم از فضای روده به درون یاخته به خوبی ایجاد نمی‌شود و جذب گلوتز به روش هم‌انتقالی نیز مختلط می‌شود و مقدار گلوتز در یاخته‌ی پوششی مخاط روده و در پی آن در مابین یاخته‌ای روده کاهش پیدا می‌کند.

۳ ۷۵ در کرم خاکی بخشی که بلافصله پس از مری قرار دارد، چینه‌دان است که چینه‌دان توانایی ترشح آنزیم‌های گوارشی را ندارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) در ملخ بخشی که بلافصله پس از پیش‌معده قرار دارد، معده و کیسه‌های معده است. کیسه‌های معده می‌توانند همراه با معده، آنزیم‌های گوارشی ترشح کنند.

۲) بخشی که بلافصله بعد از هزارلای گاو قرار دارد، شیردان است. شیردان معده اصلی گاو است و می‌تواند آنزیم گوارشی ترشح کند.

۴) بخشی که بلافصله پس از چینه‌دان پرنده‌ی دانه‌خوار قرار دارد، معده است که معده در پرنده‌ی دانه‌خوار می‌تواند آنزیم گوارشی ترشح کند.

۳ ۷۶ اندام‌هایی که سیاهرگ‌های آن‌ها با پیوستن به یکدیگر سیاهرگ باب را به وجود می‌آورند عبارتند از: روده‌ی بزرگ، روده‌ی باریک، طحال، لوزالمده و معده، بنابراین سیاهرگ مری هیچ اتصالی به سیاهرگ باب ندارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) نمی‌توان گفت هر اندامی که خون سیاهرگی آن به گرد وارد می‌شود، بخشی از لوله‌ی گوارش است، چراکه خون سیاهرگی پانکراس نیز به گرد وارد می‌شود، پانکراس جزوی از لوله‌ی گوارش نیست، بلکه جزوی از دستگاه گوارش محسوب می‌شود.

۲) نمی‌توان گفت هر اندامی که خون خروجی از آن به گرد وارد می‌شود، هورمون ترشح می‌کند، زیرا روده‌ی بزرگ هرمون ترشح نمی‌کند.

۴) ویتامین‌های محلول در چربی پس از جذب از طریق مویرگ‌های لنفی به سوی قلب می‌روند و نهایتاً با خون سیاهرگی مخلوط می‌شوند، سپس از طریق سرخرگ کبدی به همراه خون وارد کبد می‌شوند، پس در گرد ویتامین‌های محلول در چربی مشاهده می‌شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) بخش (۱) ابی‌گلوت است که در پی شروع حرکات کرمی‌شکل، به پایین حرکت می‌کند تا راه نای را مسدود کند.

۲) بخش (۲) زبان کوچک است که هم‌زمان با عمل بلع به بالا می‌رود تا راه بینی را بینند و غذا به بینی وارد نشود.

۴) بخش (۴) حلق است که دیواره‌ی آن ماهیچه‌ی مخطط دارد و هنگام بلع با انقباض خود، لقمه‌ی غذا را به سمت بنداره‌ی مری می‌راند و با باز شدن این بنداره، غذا وارد مری می‌شود.

۱) از همه‌ی موادی که در از بین بردن اثر اسیدی کیموس معده نقش مؤثّری دارند، می‌توان به بیکربنات پانکراس، بیکربنات مایع موكوزی رووده باریک و هم‌چنین صفرا اشاره کرد که همه‌ی این مواد توسط یاخته‌های پوششی ساخته می‌شوند و این یاخته‌ها بر روی غشای پایه که دارای مولکول‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی هستند، قرار دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) بیکربنات پانکراس و هم‌چنین صفرا توسط یاخته‌های دارای ریزپر زاسته نمی‌شوند.

۳) بیکربنات پانکراس و هم‌چنین مایع مخاطی توسط یاخته‌های سازنده‌ی صفرا به ابتدای رووده باریک وارد نمی‌شوند.

۴) غدد ترشح‌کننده‌ی این مواد، غددی برون‌ریز هستند که ترشحات خود را به مایع میان‌یاخته‌ای وارد نمی‌کنند، بلکه به فضای رووده باریک وارد می‌کنند.

۲) در پرنده‌ی دانه‌خوار هر بخش از لوله‌ی گوارش که در مجاورت معده قرار دارد، شامل چینه‌دان و سنجکدان است که چینه‌دان و سنجکدان توانایی ترشح آنزیم‌های گوارشی را ندارند. در ملخ، بخش‌هایی که در مجاورت معده قرار دارند، شامل پیش‌معده و رووده می‌باشند که هیچ‌کدام توانایی ترشح آنزیم‌های گوارشی را ندارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) در کرم خاکی، بخش‌هایی که در مجاورت سنجکدان قرار دارند، شامل چینه‌دان و رووده هستند که رووده در جذب مواد حاصل از گوارش پروتئین‌ها یعنی آمینواسیدها نقش ایفا می‌کنند.

۳) در ملخ بخش‌هایی که در مجاورت چینه‌دان قرار دارند، شامل مري و پیش‌معده هستند که پیش‌معده با داشتن دندانه‌هایی در دیواره‌ی خود، می‌تواند در گوارش مکانیکی غذا نقش داشته باشد.

۴) در ملخ، بخش‌هایی که در مجاورت رووده قرار دارند، شامل راست‌رووده و معده هستند که در راست‌رووده، آب و یون‌های معدنی محتویات لوله‌ی گوارش می‌توانند جذب شوند. باید دقت کنید که علاوه‌بر راست‌رووده ملخ که در جذب آب و یون‌های معدنی نقش دارد، معده نیز محل جذب مواد مغذی است. در پرنده‌ی دانه‌خوار در دو سمت رووده، مخرج و سنجکدان قرار دارند که هیچ‌کدام آب و یون‌های معدنی را جذب نمی‌کنند.

۴ ۷۳ سکرتین محرک مؤثری بر ترشح بیکربنات پانکراس است و بیکربنات می‌تواند اسید کیموس معده موجود در دوازدهه را خنثی کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) سکرتین می‌تواند بیکربنات پانکراس را افزایش دهد، اما این بیکربنات وارد خون نمی‌شود و به فضای رووده باریک می‌ریزد.

۲) سکرتین همانند گاسترین چون یک هورمون است، می‌تواند در پی خروج از یاخته‌های سازنده‌ی خود وارد خون شود.

۳) هیچ‌یک از هورمون‌های سکرتین و گاسترین در ترشح آنزیم‌های لوزالمده نقشی ندارند. آنزیم‌های غیرفعال لوزالمده شامل بروتازها هستند.

فیزیک | ۱۱

حل ویدئویی سوالات این فقره را در
وسایت DriQ.com مشاهده کنید.

پاسخ دهم تجربی



بررسی سایر گزینه‌ها:

- (۱) پیسین‌ها می‌توانند با آبکافت پروتئین‌ها در مصرف آب که نوعی مولکول کوچک و غیرزیستی است، نقش داشته باشند.
- (۲) ترشح آنزیم‌های معده می‌تواند تحت تأثیر گاسترین افزایش پیدا کند. گاسترین هورمونی است که با افزایش اسید معده در افزایش اسیدیته‌ی کیموس معده نقش ایفا می‌کند.
- (۳) بزرگ‌ترین یاخته‌های تشکیل‌دهنده‌ی غدد معده، یاخته‌های حاشیه‌ای هستند که اسید ترشح می‌کنند، اسید معده می‌تواند باعث فعال شدن پسینوژن و ایجاد پیسین شود.

فیزیک

۳ ۸۱

بررسی گزینه‌ها:

$$\begin{aligned} 1) & 0.000499 = 4/99 \times 10^{-4} \sim 1 \times 10^{-4} = 10^{-4} \checkmark \\ 2) & 85370 = 8/537 \times 10^4 \sim 10 \times 10^4 = 10^5 \checkmark \\ 3) & 0.045 \times 10^{-4} = 4/5 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-6} = 10^{-6} \times \checkmark \\ 4) & 0.0062 = 6/2 \times 10^{-3} \sim 10 \times 10^{-3} = 10^{-2} \checkmark \end{aligned}$$

۲) ابتدا از رابطه‌ی $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ حجم کره را محاسبه می‌کنیم:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 = 4 \times 10^{-3} \times (10 \times 10^{-3})^3 = 4 \times 10^{-3} m^3$$

با استفاده از تعریف چگالی خواهیم داشت:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{8}{4 \times 10^{-3}} = 2000 \frac{kg}{m^3}$$

۳) اگر تعداد نفس‌های خود را در یک دقیقه و برای چند بار اندازه بگیرید با عددی نزدیک به 10 مواجه خواهید شد. پس به طور متوسط 10 بار تنفس در هر دقیقه را در نظر می‌گیریم، برای 50 سال داریم:

$$\text{سال} \times 50 \times \text{روز} \times 24h \times 24\text{min} \times 6\text{sec} \times 10 = \text{تعداد تنفس}$$

۱ سال ۱ روز ۱ ساعت ۱ دقیقه

$$= 10 \times 60 \times 20 \times 40 \times 50 = 240 \times 10^6 = 2 \times 10^8 \text{ سبب}$$

$$= 10^8$$

دقت کنید: در این مسئله و به طور کلی در مسائل تخمین چون دقت بالای نیاز نداریم برای سادگی عمل ضرب 365 را برابر 400 و 24 را برابر 20 گرفتیم.

۴) حجم گلوله برابر با حجم آب جایه‌جاشده‌ی درون استوانه است:

$$V = 55 - 50 = 5 \text{ cm}^3$$

با توجه به تعریف چگالی داریم:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{32}{5} = 6.4 \frac{g}{cm^3}$$

۵) روش اول:

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{m_1 + m_2}{V_1 + V_2} = \frac{\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2}{V_1 + V_2} \Rightarrow 1400 = \frac{1300 \times 300 + 1500 V_2}{300 + V_2} \\ &\Rightarrow 1400 \times 300 + 1400 V_2 = 1300 \times 300 + 1500 V_2 \\ &\Rightarrow (1500 - 1400) \times V_2 = (1400 - 1300) \times 300 \\ &\Rightarrow 100 V_2 = 100 \times 300 \Rightarrow V_2 = 300 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

۶) افرادی که بی‌اشتهای مفترض دارند، کمتر از نیاز خود غذا می‌خورند و در نتیجه لاغر می‌شوند. در این افراد به علت کاهش دریافت مواد غذایی، احتمال ابتلا به بیماری کم‌خونی وجود دارد. فردان فاکتور داخلی معده نیز سبب می‌شود ویتامین B_{12} تخریب شده و فرد به کم‌خونی مبتلا شود، زیرا ویتامین B_{12} برای ساختن گوچه‌های قرمز در مغز استخوان لازم است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۷) در افراد دارای اضافه‌وزن، افزایش ابتلا به انواعی از سرطان‌ها دیده می‌شود، اما پوکی شدید استخوان‌ها بیشتر در افراد لاغر دیده می‌شود.

۸) در افرادی که چاقی مفترض دارند، اتفاقاً افزایش احتمال ابتلا به سکته‌های مغزی و دیابت نوع دو وجود دارد.

۹) افرادی که چاق هستند و اضافه‌وزن دارند، احتمال رسوب کلسترول در دیواره‌ی سرخرگ‌های آن‌ها وجود دارد، نه افرادی که بی‌اشتهای عصبی دارند و لاغر هستند.

۱۰) موارد «الف» و «د» نادرست هستند.

بررسی موارد:

(الف) داخلی‌ترین بافت پیوندی در ساختار معده‌ی انسان، بافت پیوندی لایه‌ی مخاطی است که این بافت در سمت خارجی بافت پوششی لایه‌ی مخاطی قرار دارد، بافت پوششی لایه‌ی مخاطی، آنزیم پسینوژن و فاکتور داخلی ترشح می‌کنند.

(ب) بافت پیوندی سستی که در زیر مخاط قرار گرفته است بلاعده در سمت داخل لایه‌ی ماهیچه‌ای مورب معده قرار گرفته است. این ماهیچه به همراه ماهیچه‌ی طولی و حلقوی می‌تواند با ایجاد حرکات دودی وارونه، موجب ورود غذا به فضای مری در استفراغ شود.

(ج) خارجی‌ترین لایه‌ی ماهیچه‌ای، ماهیچه‌ی طولی است که بلاعده در سمت داخل بافت پیوندی دیواره‌ی خارجی معده قرار گرفته است، این بافت پیوندی در تشکیل بخشی از صفاق نقش ایفا می‌کند.

(د) درونی‌ترین بافت پوششی، بافت پوششی لایه‌ی مخاطی است که این بافت در سمت داخل بافت پیوندی لایه‌ی مخاطی قرار گرفته است، اما بافت پیوندی لایه‌ی مخاطی در روده‌ی باریک نقشی در حرکت پرزها ندارد و این نقش به عهده‌ی عضله‌ی مخاطی است.

۱۱) هر یاخته‌ای که لیزوزوم آن به واکوئل غذایی ملحق می‌شود، قطعاً آنزیم گوارشی دارد، چراکه خود لیزوزوم اندامکی است که دارای آنزیم گوارشی است و ادامه‌ی گوارش غذا را به عهده دارد.


بررسی سایر گزینه‌ها:

۱۲) یاخته‌هایی که واکوئل حاوی آنزیم‌های گوارشی برون‌ریز دارند، یاخته‌هایی هستند که آنزیم‌هایی را به درون حفره‌ی گوارشی ترشح می‌کنند، اما قطعاً نمی‌توان گفت که همه‌ی این یاخته‌ها در آندوسیتوز ذرات غذایی نقش ایفا می‌کنند.

۱۳) همه‌ی یاخته‌های پوششی کیسه‌ی گوارشی با ساختاری مشابه غشای پایه از لحاظ عملکردی در تماس هستند، اما فقط برخی از آن‌ها تاژک دارند.

۱۴) هر یاخته‌ای در پی آندوسیتوز، کیسه‌ی غشایی تشکیل می‌دهد، این کیسه‌ی غشایی همان گریچه‌ی غذایی است و قطعاً لیزوزوم به واکوئل غذایی اضافه می‌شود و ادامه‌ی گوارش انجام می‌شود.

۱۵) پیسین‌ها آنزیم‌هایی هستند که آغازگر روند هضم پروتئین‌ها می‌باشند که این آنزیم‌ها می‌توانند به صورت غیرفعال از تمامی غدد موجود در معده ترشح شوند.



پاسخ دهم تجربی

حل ویدئویی سوالات این دفترچه را در
DriQ.com مشاهده کنید

۱۲ | فیزیک

۳ ۸۹ بردار جایه‌جایی مستقل از مسیر حرکت است و فقط به نقطه‌ی ابتداء و انتهای مسیر بستگی دارد، بنابراین در هر سه مسیر جایه‌جایی (d) برای جرم m یکسان است. نیروی ثابت \vec{F} در همه‌ی مسیرها یکسان است در نتیجه کار انجام شده در هر سه مسیر یکسان است.

۴ ۹۰ نیروی عمود بر سطح همواره بر مسیر جایه‌جایی عمود است، پس کار آن برابر صفر است. (مطابق شکل)

$$\begin{array}{l} F_N \\ \text{---} \\ \Delta m \end{array} \quad W_N = F_N d \cos 90^\circ = 0$$

۴ ۹۱

دقت کنید: جهت تندی تأثیری بر محاسبه‌ی انرژی جنبشی ندارد:

$$\left. \begin{array}{l} K_1 = \frac{1}{2} mv^2 \\ K_2 = \frac{1}{2} mv^2 \\ K_3 = \frac{1}{2} \times 2m \times v^2 = mv^2 \\ K_4 = \frac{1}{2} \times 2m \times (2v)^2 = 4mv^2 \end{array} \right\} \Rightarrow K_4 > K_3 > K_2 = K_1$$


۲ ۹۲ چون برایند نیروی \vec{F} به جسم ساکن وارد می‌شود، پس جایه‌جایی در جهت نیروی \vec{F} خواهد بود. بنابراین کافی است که اندازه‌ی نیروی F را به دست آوریم و در رابطه‌ی کار قرار دهیم:

$$F = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5N$$

$$W = F \cdot d \cos 0^\circ = 5 \times 4 \times 1 = 20J$$

۳ ۹۳ انرژی جنبشی را در دو حالت برهم تقسیم می‌کنیم:

$$\frac{K_2}{K_1} = \frac{\frac{1}{2} m_2 v_2^2}{\frac{1}{2} m_1 v_1^2} = \frac{m_2}{m_1} \times \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2 = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{8}$$

۲ ۹۴

از تعریف کار و برابر بودن اندازه‌ی کار و جایه‌جایی داریم:

$$W = (F \cos \theta)d \Rightarrow W_1 = W_2$$

$$\Rightarrow F_1 \cos \theta_1 d_1 = F_2 \cos \theta_2 d_2 \quad \frac{d_1 = d_2}{\text{با توجه به شکل متوجه می‌شویم که هرچه طناب کوتاه‌تر باشد } \theta \text{ بزرگ‌تر}}$$

است، پس: $\theta_2 > \theta_1 \Rightarrow \cos \theta_2 < \cos \theta_1 \Rightarrow F_2 > F_1$

دقت کنید: با افزایش θ بین صفر تا 90° $\cos \theta$ کاهش می‌یابد.

۲ ۹۵ ابتدا با استفاده از رابطه‌ی انرژی جنبشی جرم جسم را محاسبه می‌کنیم:

$$K_1 = \frac{1}{2} mv_1^2 \Rightarrow 10 = \frac{1}{2} \times m \times (2)^2$$

$$\Rightarrow 10 = \frac{1}{2} \times m \times 4 \Rightarrow m = 5kg$$

روش دوم: اگر دقت کنیم می‌بینیم که چگالی مخلوط برابر با میانگین چگالی دو مایع است، پس حجم دو مایع برابر است با:

$$\rho = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2} = \frac{1300 + 1500}{2} = 1400 \frac{kg}{m^3} \Rightarrow V_1 = V_2 = 300 cm^3$$

دقت کنید: این سؤال، سؤال کنکور سراسری است، می‌بینید که با کمی دقت می‌توان به آن در عرض چند ثانیه پاسخ داد.

۴ ۸۶ جرم کره و استوانه برابر است، پس با توجه به رابطه‌ی چگالی داریم:

$$\rho_1 = \frac{m_1}{V_1}, \rho_2 = \frac{m_2}{V_2} \Rightarrow m_1 = \rho_1 V_1$$

$$m_1 = m_2 \rightarrow \rho_1 V_1 = \rho_2 V_2$$

یادآوری: $V_{کره} = \frac{4}{3} \pi r^3$ و $V_{استوانه} = \pi r^2 h$ است: $\pi r^2 h$

$$\rho_1 \pi r^3 h = \rho_2 \frac{4}{3} \pi R^3 \Rightarrow \rho_1 r^3 h = \rho_2 \frac{4}{3} R^3$$

$$\frac{\rho_2 = 3\rho_1}{\rho_1 r^3 h = \cancel{\rho_1} \frac{4}{3} R^3} \Rightarrow r^3 h = \cancel{\frac{4}{3}} \rho_1 R^3 \Rightarrow r^3 h = 4R^3$$

$$R = h = 5cm \rightarrow 5r^2 = 4 \times 125 \Rightarrow r^2 = 100 \Rightarrow r = 10cm$$

۳ ۸۷ ابتدا حجم داخلی ظرف که در واقع برابر با حجم آب درون ظرف است را به دست می‌آوریم، با دقت به شکل می‌بینیم که شعاع داخلی ظرف برابر ۴cm است:

$$V' = \left[\frac{2}{3} \right] \pi r^3 = \frac{2}{3} \times 3 \times 4^3 = 128 cm^3$$

جرم آب درون ظرف برابر است با:

جرم خود ظرف برابر است با:

حجم قسمت تپیر ظرف برابر است با:

$$V = \frac{2}{3} \pi (r^3 - r^3_{خارجی}) = \frac{2}{3} \times 3 \times (5^3 - 4^3) = 2 \times (125 - 64) = 122 cm^3$$

با استفاده از رابطه‌ی چگالی داریم:

اما جواب در SI خواسته شده است:

$$\nu \frac{g}{cm^3} \times \frac{10^{-3} kg}{1g} \times \frac{1 cm^3}{10^{-6} m^3} = 7000 \frac{kg}{m^3}$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \times 800 \times (20)^2 = 160000 J = 160 kJ$$

نکته: در تبدیل $\frac{m}{s}$ به $\frac{km}{h}$ و برعکس به شکل زیر عمل می‌کنیم:

$$v \left(\frac{km}{h} \right) \xrightarrow{x3/6} v \left(\frac{m}{s} \right)$$

جدای از این مسئله بهتر است دو مقدار زیر را حفظ کنید:

$$72 \frac{km}{h} = 20 \frac{m}{s}$$

$$10.8 \frac{km}{h} = 3 \frac{m}{s}$$

شیمی | ۱۳

حل ویدئویی سوالات این دفترچه را در
و سایت DriQ.com مشاهده کنید.

پاسخ دهم تجربی



شیمی

۱ ۱۰۱ مقایسه‌ی انرژی نورها در گستره‌ی نور مرئی به صورت زیر است:

سرخ > نارنجی > زرد > سبز > آبی > نیلی > بنفش: انرژی

۲ ۱۰۲ پرتوهای گاما، ایکس و فرابنفش در مقایسه با نور مرئی، انرژی بیشتر و طول موج کوتاه‌تر دارند. طول موج نور مرئی گستره‌ای بین 400 nm تا 700 nm است.

۳ ۱۰۳ رنگ شعله‌ی فلز لیتیم، سرخ است. نوار رنگی سرخ در طیف نشري خطی هیدروژن در نتیجه‌ی انتقال الکترون از $n=3$ به $n=2$ ایجاد می‌شود.

۴ ۱۰۴ از لامپ نئون (Ne_1) در ساخت تابلوهای تبلیغاتی برای ایجاد نوشته‌های نورانی سرخ قام استفاده می‌شود. نئون دومین گاز نجیب جدول است.

۵ ۱۰۵ نور مرئی بخش کوچکی از گستره‌ی پرتوهای الکترومغناطیسی است.

۶ ۱۰۶ اگرچه مدل بور توانست با موفقیت طیف نشري خطی هیدروژن را توجیه کند، اما توانایی توجیه طیف نشري خطی دیگر عنصرها را نداشت.


بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) آرایش الکترونی اتم عنصرهای دسته‌های p و d به ترتیب به زیرلایه‌های s ختم می‌شود.

(۲) هر کدام از اتم‌های I_5 و Mn_{25} دارای ۷ الکترون ظرفیتی هستند.

(۳) شمار الکترون‌های ظرفیتی شماری از اتم‌های عنصرهای دسته‌ی d بیشتر از ۸ است. به عنوان نمونه اتم Cu_{29} دارای ۱۱ الکترون ظرفیتی است.

۷ ۱۰۸ شکل زیر چگونگی ایجاد چهار نوار رنگی ناحیه‌ی مرئی طیف نشري خطی اتم‌های هیدروژن را نشان می‌دهد:



بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) هر زیرلایه را با نماد nl نشان می‌دهند.

(۲) پنجمین زیرلایه‌ی یک اتم (در صورت وجود)، ظرفیت پذیرش ۱۸ الکترون را خواهد داشت:

= ۱: پنجمین زیرلایه = ۴

$= 4 + 2 = 4(4) + 2 = 18 e^-$ = ظرفیت پذیرش الکترون

(۴) برای رد این گزینه می‌توان گفت آرایش الکترونی فشرده‌ی عنصر Ge_{32} به صورت $2^2 p^6 4s^2 [Ar]3d^0$ است. اتم عنصر ژرمانیم دارای ۴ الکترون ظرفیتی است، در صورتی که مطابق آرایش فوق، شمار الکترون‌های باقی‌مانده نسبت به گاز نجیب برابر با ۱۴ الکtron است.

حال با استفاده‌ی مجدد از رابطه‌ی انرژی جنبشی سرعت نهایی را محاسبه می‌کنیم:

$$K_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 \Rightarrow 40 = \frac{1}{2} \times 5 \times v_2^2$$

$$\Rightarrow 16 = v_2^2 \Rightarrow v_2 = 4 \frac{m}{s}$$

۸ ۹۶ روش اول: ابتدا نیروی خالص در راستای جابه‌جاوی را محاسبه می‌کنیم:

$$W_t = F \cdot d \Rightarrow 36 = F \times 3 \Rightarrow F = 12N$$

با توجه به جهت مؤلفه در امتداد جابه‌جاوی هر یک از نیروهای f_k را محاسبه می‌کنیم:

$$F = F_1 \cos 37^\circ + F_2 \cos 60^\circ - F_3 - f_k$$

$$\Rightarrow 12 = (10 \times 0 / 8) + (20 \times \frac{1}{2}) - 4 - f_k \Rightarrow f_k = 2N$$

روش دوم: کار کل برابر جمع جبری کار تک تک نیروهای وارد بر جسم است:

$$W_t = W_1 + W_2 + W_3 + W_{f_k} + W_N + W_{mg}$$

$$= F_d \cos 37^\circ + F_d \cos 60^\circ + F_d \cos 180^\circ - f_k d$$

$$\Rightarrow 36 = (10 \times 3 \times 0 / 8) + (20 \times \frac{1}{2}) + (4 \times 3 \times (-1)) - 4f_k$$

$$\Rightarrow 36 = 42 - 4f_k$$

$$-6 = -4f_k \Rightarrow f_k = 2N$$

$$10 \cdot 8 \frac{km}{h} \div 3/6 = 30 \frac{m}{s}$$

$$v_2 = v_1 + 30$$

$$K_2 = \frac{\frac{1}{2}mv_2^2}{K_1} = \frac{(v_1 + 30)^2}{v_1^2} \Rightarrow 16 = \frac{(v_1 + 30)^2}{v_1^2}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{3} = \frac{v_1 + 30}{v_1} \Rightarrow 4v_1 = 3v_1 + 90 \Rightarrow v_1 = 90 \frac{m}{s}$$

۹ ۹۸ چون جهت نیرو مشخص نیست، پس مقدار دقیق کار را

نمی‌توانیم محاسبه کنیم، اما با استفاده از رابطه‌ی کار محدوده W را می‌توانیم محاسبه کنیم:

$$W = F \cos \theta d = 12 \times \cos 0^\circ \times 3 = 36 \cos 0^\circ$$

از طرفی: $-1 \leq \cos \theta \leq 1 \rightarrow -36 \leq 36 \cos \theta \leq 36$

پس W می‌تواند عددی بین -36 و 36 ژول باشد. در نتیجه پاسخ گزینه‌ی (۳) است که در این محدوده قرار ندارد.

$$K_2 = K_1 + 0 / 44 K_1 = 1 / 44 K_1$$

$$\frac{K_2}{K_1} = \frac{m_2}{m_1} \times \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2 \frac{m_1 = m_2}{1 / 44} = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = 1 / 2 \Rightarrow v_2 = 1 / 2 v_1$$

$$\Delta v = v_2 - v_1 = 1 / 2 v_1 - v_1 = -1 / 2 v_1$$

سرعت 20% افزایش یافته است. \Rightarrow مقدار کار در بار نخست برابر است با:

$$W_1 = F \cos \theta d = 2 \times 0 / 6 \times 10 = 12J$$

برای بار دوم داریم:

$$W_2 = F \cos \theta d \frac{W_1 = W_2}{12 = F \times \cos 60^\circ \times 10}$$

$$\Rightarrow 12 = F \times \frac{1}{2} \times 10 \Rightarrow F = 2.4N$$



۱۱۹ آرایش الکترونی اتم عنصری که در دوره‌ی پنجم و گروه دوازدهم جای دارد به $4d^1 5s^2$ ختم می‌شود، عدد اتمی این عنصر برابر است با:

$$Z = 36 + 10 + 2 = 48$$

$$N = \frac{4}{3} Z$$

از طرفی مطابق داده‌های سؤال داریم:

$$A = N + Z = \frac{4}{3} Z + Z = \frac{7}{3} Z = \frac{7}{3} \times 48 = 112$$

۱۲۰ شمار عنصرهای شناخته شده برابر با ۱۱۸ عنصر است و در بین آن‌ها، ۴۰ عنصر متعلق به دسته‌ی d هستند، بنابراین نسبت خواسته شده برابر است با:

$$\frac{40}{118} \times 100 \approx 34\%$$

۱۱۶ انرژی همانند ماده در نگاه ماکروسکوپی، پیوسته اما در نگاه میکروسکوپی گستته یا کوانتموی است.

۱۱۷ لایه‌ی الکترونی سوم ($n=3$) شامل ۳ نوع زیرلایه‌ی s p و d است و حداکثر گنجایش آن از رابطه‌ی $2n^2$ به دست می‌آید:

$$2n^2 = 2(3)^2 = 18e^-$$


۱۱۸ تمام عنصرهایی که عدد اتمی آن‌ها بین ۱۹ تا ۳۶ است، الکترون‌های موجود در زیرلایه‌ی ۴s اتم آن‌ها جزو الکترون‌های ظرفیتی محسوب می‌شوند. در بین این ۱۸ عنصر، آرایش الکترونی اتم ۱۰ عنصر به یک زیرلایه‌ی دو الکترونی ختم می‌شود، این ۱۰ عنصر عبارتند از:

- یک عنصر از دسته‌ی s: Ca
- ۸ عنصر از دسته‌ی d: Sc, Zn, Sc, Cu, Cr
- ۲۲ عنصر از دسته‌ی p: Ge



به جز Ge که آرایش الکترونی اتم آن به $4p^2$ ختم می‌شود، آرایش الکترونی اتم سایر عناصر بالا به $4s^2$ ختم می‌شود.

۱۱۹ مطابق قاعده‌ی آفبا، هنگام افزودن الکترون به زیرلایه‌ها، نخست زیرلایه‌های نزدیک‌تر به هسته پر می‌شود که دارای انرژی کمتری است و سپس زیرلایه‌های بالاتر پر خواهد شد.

۱۲۰ منظور از ۱=1 همان زیرلایه‌ی p است. آرایش الکترونی اتم S به صورت زیر است:



۱۲۱ آرایش الکترونی فشرده‌ی اتم‌های موردنظر در زیر آمده است:




$$n+1=6 \Rightarrow \begin{cases} n=6, l=0 \Rightarrow 6s^2 : \text{زیرلایه} \\ n=5, l=1 \Rightarrow 5p^6 : \text{زیرلایه} \\ n=4, l=2 \Rightarrow 4d^{10} : \text{زیرلایه} \end{cases} \Rightarrow 18e^-$$

۱۲۲ عنصر موردنظر Cr است که در گروه ششم جدول جای دارد.

۱۲۳ آرایش الکترونی مورد انتظار (مطابق قاعده‌ی آفبا) $_{24}Cr: [Ar] 3d^4 4s^2$ آرایش الکترونی به کمک روش‌های طیف‌سنجی

۱۲۴ آرایش الکترونی اتم Sn به صورت زیر است:



۱۲۵ اتم Sn دارای ۴ الکترون ظرفیتی است و در گروه ۱۴ جدول جای دارد.

۱۲۶ • شماره‌ی گروه عنصرهای دسته‌ی p با تعداد الکترون‌های ظرفیت آن‌ها برابر نیست. در واقع در عنصرهای دسته‌ی p رقم یکان شماره‌ی گروه برابر با شمار الکترون‌های ظرفیتی است.