

۱۲۶ ک: پیوستگی تابع زیر را در نقطه $(0,1)$ بررسی کنید؟ $F(x, y) = \frac{x^2+2y}{x+y^2}$

پیوستگی توابع زیر را در نقاط داده شده بررسی کنید؟

۱۲۷ ک: $F(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ $(0, \sqrt{5})$ پ: $F(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^3+y^3} & (x, y) \neq (0,0) \\ 3 & (x, y) = (0,0) \end{cases}$

۱۲۷ ک: $F(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2-y^2}{x+y} & (x, y) \neq (1, -1) \\ 3 & (x, y) = (1, -1) \end{cases}$ ۱۲۷ ک: $F(x, y) = \begin{cases} \frac{x-y}{x+y} & (x, y) \neq (0,0) \\ 3 & (x, y) = (0,0) \end{cases}$

۳۳۴ پ: $F(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0,0) \\ 0 & (x, y) = (0,0) \end{cases}$ ۳۳۴ پ: $F(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y^3}{x^{12}+y^4} & (x, y) \neq (0,0) \\ 0 & (x, y) = (0,0) \end{cases}$

مشتق گیری از توابع چند متغیره:

تعبیر هندسی

پ: ۳۴۰: نمودار معادله $z=F(x,b)$ در واقع اثر سطح $z=F(x,y)$ در صفحه $y=b$ است. بنابراین $F_x(a, b) = \frac{\partial F}{\partial x}$ ضریب زاویه منحنی $z=F(x,y)$ در نقطه $(a,b,F(a,b))$ است.

نکته ارشدی: معادله خط مماس L بر این منحنی در صفحه $y=b$ عبارت است:

$$z - F(a, b) = F_x(a, b)(x - a)$$

نکته ارشدی: معادلات دکارتی (یا متقارن) این خط مماس را داریم:

$$y = b, \quad x - a = \frac{z - F(a, b)}{F_x(a, b)}$$

نمودار معادله $z=F(a,y)$ در واقع اثر سطح $z=F(x,y)$ در صفحه $y=a$ است. بنابراین $F_y(a,b) = \frac{\partial F}{\partial y}$ ضریب زاویه منحنی $z=F(x,y)$ در نقطه $(a,b,F(a,b))$ است.

نکته ارشدی: معادلات دکارتی (یا متقارن) این خط مماس را داریم:

$$x = a, \quad y - b = \frac{z - F(a,b)}{F_y(a,b)}$$

ی ۱۲۸: فرض کنید $Z=F(x,y)$ یک تابع دو متغیره باشد اگر $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h,y)-F(x,y)}{h}$ موجود باشد گوئیم مشتق جزئی مرتبه اول F نسبت به x موجود است لذا برای محاسبه F'_x متغیر y را در $F(x,y)$ ثابت نگه می داریم و مقدار آن را با نمادهای زیر نشان می دهیم.

$$\frac{\partial F(x,y)}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \quad \frac{\partial F}{\partial x}, \quad F_x(x,y), \quad F'_x$$

به طور مشابه اگر $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x,y+h)-F(x,y)}{h}$ موجود باشد گوئیم مشتق جزئی مرتبه اول F نسبت به y موجود است لذا برای محاسبه F'_y متغیر x را در $F(x,y)$ ثابت نگه می داریم و مقدار آن را با نمادهای زیر نشان می دهیم.

$$\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}, \quad \frac{\partial z}{\partial y}, \quad \frac{\partial F}{\partial y}, \quad F_y(x,y), \quad F'_y$$

در مثالهای زیر $\frac{\partial F}{\partial x}$ و $\frac{\partial F}{\partial y}$ را داریم؟

$$F(x,y) = 2xy$$

$$F(x,y) = x^2y^3$$

$$\text{پ ۳۴۶: } F(x,y) = 9 + 2x - 3y^2$$

$$\text{ی ۳۴۶: } F(x,y) = x^2y^3 + 2xy - 2$$

$$\text{پ ۳۳۸: } F(x,y,z) = x^2 \cos y + z^2 \quad \text{در این تابع را نیز بدست آورید} \quad \frac{\partial F}{\partial z}$$

۳۸۳ پ: مقادیر مشتق جزئی مرتبه اول $F(x, y) = x^3y^2 + 2xy - 4y$ را در نقطه $(1, 2)$ بدست آورید؟

۳۳۸ پ: $F(x, y, z) = x^3y^2 \sin z + e^{yz}$ در این تابع را نیز بدست آورید $\frac{\partial F}{\partial z}$

۱۲۹ ی: $F(x, y) = \frac{x}{y+x^2}$

مشتقات جزئی مرتبه های بالاتر

۳۴۳ و ۱۲۹:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = F_{xx}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = F_{yy}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = F_{yx}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = F_{xy}$$

همه مشتق های جزئی مرتبه اول و دوم توابع زیر را بدست آورید؟

۱۲۹ ی: $F(x, y) = x^3y^4$

۳۴۳ پ: $F(x, y) = \sin xy^2$

مشتق جزئی مرتبه دوم $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ تابع زیر را در نقطه $(2, 4)$ بدست آورید؟ (کارشناسی ارشد حسابداری ۹۲)

$$z = xe^{y-x^2} + xy^2$$

مشتق ترکیب توابع و ضمنی

قاعده زنجیره ای : THE CHAIN RULE

فرض می کنیم مشتقات جزئی مرتبه اول $Z=F(x,y)$ پیوسته بوده و توابع $u(x,y)$ و $v(x,y)$ مشتق پذیر باشند در این صورت Z تابعی مشتق پذیر است و داریم:

$$z = F(u, v) = \begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

مجموعه کتب کارشناسی ارشد رشته حسابداری انتشارات علوی: علوی اینترنت ۲۳۵:

در تابع $z = F(x^2 + y^2, y/x)$ مشتقات $\frac{\partial z}{\partial x}$ یا Z_x و $\frac{\partial z}{\partial y}$ یا Z_y را حساب کنید؟

جزوه اینترنت دست نوشت: در تابع $z = \frac{u}{v} - \frac{v}{u}$ و $u = x^2 - y^2$ و $v = xy$ مشتقات $\frac{\partial z}{\partial x}$ و $\frac{\partial z}{\partial y}$ را محاسبه کنید؟

علوی ۲۳۵: در تابع $z = \ln\sqrt{u^2 + v^2}$ و $u = xe^y$ و $u = xe^{-y}$ مشتقات $\frac{\partial z}{\partial x}$ و $\frac{\partial z}{\partial y}$ را محاسبه کنید؟

$$y = \ln u \quad y' = \frac{u'}{u}, \quad y = \sqrt{u} \quad y' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

جزوه اینترنت چاپی: در تابع $z = u^2 - uv + 2v^2$ و $u = \frac{1}{x+1}$ و $u = 1 + \sqrt{x}$ مشتقات $\frac{\partial z}{\partial x}$ را در نقطه $x=1$ محاسبه

کنید؟ در منزل

مشتق توابع ضمنی:

ماهان ۹۲: توابعی که X, Y از هم مجزا نباشند را تابع ضمنی می گویند تمام توابعی که تا بحال دیده ایم حالت خاصی از توابع ضمنی اند. برای مشتق این توابع $F(X, Y)=0$ در نظر میگیریم و داریم:

$$\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)} \quad \frac{\partial x}{\partial y} = -\frac{F_y(x,y)}{F_x(x,y)}$$

سایت <http://Fa.wikipedia.org>: و : دانشنامه رشد: چه موقع می توان انتظار داشت که توابع مختلف $(y=F(x))$ که با رابطه

$$F(x,y)=0 \text{ تعریف می شوند مشتق پذیر باشند؟}$$

پاسخ: هنگامی که نمودار رابطه به اندازه کافی هموار باشد تا در هر نقطه آن خطی مماس وجود داشته باشد، از جمله این موارد وقتی است که فرمول F ترکیبی جبری از توانهای y, x باشد. برای محاسبه مشتق تابعی که بطور ضمنی تعریف می شوند، Y را به عنوان تابعی هر چند ناشناخته، مشتق پذیر از x در نظر می گیریم و از دو طرف معادله نسبت به x مشتق می گیریم. این روش را مشتق گیری ضمنی می نامند.

ماهان ۹۲: مشتق ضمنی تابع زیر را بر حسب x بدست آورید؟

$$x^2y^4 + y^5 + x^3 + x^3y^2 = 0$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} =$$

$$\frac{\partial y}{\partial y} =$$

پ ۳۶۳:

$$y^4 + 3y - 4x^3 - 5x - 1 = 0$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} =$$

$$\frac{\partial y}{\partial y} =$$

۱۳۳۵: در توابع $F(x,y,z)$ نیز ابتدا تابع را به صورت $F(x,y,z)=0$ در می آوریم و برای محاسبه $\frac{\partial z}{\partial x}$ یک بار x, y را ثابت نگه می داریم و مشتق F نسبت به z را محاسبه می کنیم و بار دیگر y, z را ثابت نگه می داریم و مشتق F نسبت به x را محاسبه می کنیم و داریم:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x(x,y)}{F_z(x,y)}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y(x,y)}{F_z(x,y)}$$

به طور مشابه برای حل $\frac{\partial z}{\partial y}$ نیز داریم:

۱۳۳۵: در تابع $F(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$ مشتقات ضمنی $\frac{\partial z}{\partial x}$ و $\frac{\partial z}{\partial y}$ را بدست آورید؟

۱۳۳: در تابع $xz + ylnz = x^2y$ مشتقات ضمنی $\frac{\partial z}{\partial x}$ و $\frac{\partial z}{\partial y}$ را بدست آورید؟


ماکزیمم و مینیمم توابع چند متغیره:

۱۵۱: وجهش: فرض می کنیم $z=F(x,y)$ یک تابع با مشتقات اول و دوم پیوسته باشد دستگاه $F_x(x,y) = 0$ و $F_y(x,y) = 0$ را حل می کنیم فرض می کنیم (x_0, y_0) جواب دستگاه باشند سپس با محاسبه $\Delta = F_{xx}F_{yy} - (F_{xy})^2$ داریم:

- ۱- اگر $\Delta > 0$ و $F_{xx} > 0$ تابع در نقطه (x_0, y_0) مینیمم نسبی دارد.
- ۲- اگر $\Delta > 0$ و $F_{xx} < 0$ تابع در نقطه (x_0, y_0) ماکزیمم نسبی دارد.
- ۳- اگر $\Delta < 0$ آنگاه تابع در نقطه (x_0, y_0) اکسترمم نسبی نیست این نقطه را نقطه زینی می گویند.
- ۴- اگر $\Delta = 0$ نتیجه ای از این آزمون بدست نمی آید که باید از روش های دیگری استفاده نمود.


تعریف: اگر تابع z در نقطه (x_0, y_0) ماکزیمم نسبی یا مینیمم نسبی داشته باشد گوئیم z در آن نقطه اکسترمم نسبی دارد.

تعریف: <http://Fa.wikipedia.org/>: در ریاضیات، یک نقطهٔ زینی نقطه‌ای در دامنه یک تابع است که یک نقطه سکون بوده ولی اکسترمم موضعی نیست. نام آن از این موضوع گرفته شده که در حالتی که دامنه تابع \mathbb{R}^2 باشد، نمونه مشخص نقطهٔ زینی، سطحی است که در یک راستا به بالا و در راستای دیگر به پایین خم می‌شود (مانند یک زین یا گردنه). (در حالت دوبعدی، خطوط کانتوری تابع در نقطهٔ زینی یکدیگر را قطع می‌کنند.



$$z = x^2 - y^2$$

یک نقطهٔ زینی (با رنگ قرمز) بر روی نمودار



نقطهٔ زینی بین دو تپه (محل تقاطع خطوط کانتوری به شکل 8)

۲۹۴ جهش: اکسترمم نسبی تابع را در نقطه $(1, -1)$ بدست آورید؟ (ارشد معدن ۸۳)

$$F(x, y) = x^3 - y^3 + 3xy$$

۲۹۴ جهش: اکسترمم نسبی تابع را در نقطه $(3, 2)$ بدست آورید؟ (ارشد سیستم ۷۸)

$$F(x, y) = 1 + 2x + 3y - xy$$

۲۹۵ جهش: اکسترمم نسبی تابع را در نقطه $(0, 0)$ بدست آورید؟ (ارشد ریاضی ۷۸)

$$F(x, y) = x^2y - y^2 - x^3 + xy$$

نقطه بحرانی:

$(x_0, y_0) \in D_z$ را یک نقطه بحرانی $z = F(x, y)$ می گوئیم هرگاه یکی از دو شرط زیر برقرار باشد

$$F_x(x, y) = 0 \text{ و } F_y(x, y) = 0 \quad -1$$

-2 مشتق وجود نداشته باشد.

۱۵۳۵: نقاط بحرانی و اکسترمم تابع را در صورت وجود بیابید؟

$$F(x, y) = x^2 + y^2$$

۲۹۴ جهش: نقاط بحرانی و اکسترمم تابع را در صورت وجود بیابید؟ (ارشد مکانیک ۸۱)

$$F(x, y) = x^2 - 3xy + 2y^2 - 5x + 7y$$

۱۵۲۷: نقاط بحرانی و اکسترمم تابع را در صورت وجود بیابید؟ (ارشد مکانیک ۸۱) منزل

$$F(x, y) = 2xy - 5y^2 + 4x - 2x^2 + 4y - 4$$

۱۵۲۷ پ ۳۹۰: نقاط بحرانی و اکسترمم تابع را در صورت وجود بیابید؟ منزل

$$F(x, y) = x^2 - 2xy + \frac{1}{3}y^3 - 3y$$

فرض می کنیم $(x_0, y_0) \in D_z$ و یک نقطه بحرانی باشد با توجه به تعریف نقاط بحرانی، $F_x = 0$ و


$F_y = 0$ را با توجه به مفهوم مشتق چگونه ارزیابی می کنید؟

انتگرال:

حساب و دیفرانسیل - جیمز استورات ترجمه: ارشک حمیدی - قسمت اول جلد اول ویرایش ششم - انتشارات فاطمی

مثال: با استفاده از مستطیلهای می خواهیم مساحت زیر سهمی $y=x^2$ از 0 تا 1 را تخمین بزنیم؟

شکل:



برای محاسبه مساحت می توانیم دو شکل زیر را داشته باشیم:

شکل:


$x = (0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1)$
 $y = x^2$
 $y = (0, \frac{1}{16}, \frac{1}{4}, \frac{9}{16}, 1)$
 $S_{A_i} = f(x_i)\Delta x$ مساحت هر مستطیل = طول در عرض
 $S_A = S_{A_1} + S_{A_2} + S_{A_3} + S_{A_4}$
 $S_A = f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + f(x_3)\Delta x + f(x_4)\Delta x$
 $S_A = (\frac{1}{4} \times \frac{1}{16}) + (\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}) + (\frac{1}{4} \times \frac{9}{16}) + (\frac{1}{4} \times 1)$
 $S_A = \frac{1}{64} + \frac{1}{16} + \frac{9}{64} + \frac{1}{4} = \frac{15}{32} = 0.46875$
 $S < S_A$

شکل:

$x = (0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1)$
 $y = x^2$
 $y = (0, \frac{1}{16}, \frac{1}{4}, \frac{9}{16}, 1)$
 $S_{B_i} = f(x_i)\Delta x$ مساحت هر مستطیل = طول در عرض
 $S_B = S_{B_1} + S_{B_2} + S_{B_3}$
 $S_B = f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + f(x_3)\Delta x$
 $S_B = (\frac{1}{4} \times \frac{1}{16}) + (\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}) + (\frac{1}{4} \times \frac{9}{16})$
 $S_B = \frac{1}{64} + \frac{1}{16} + \frac{9}{64} = \frac{7}{32} = 0.21875$
 $S > S_B$

$$S_B < S < S_A$$

مساحت S بین مقادیر $0.21875 < S < 0.46875$ است راه حل چیست؟



وقتی که n زیاد می شود S_A و S_B هر دو تقریب های بهتری برای مساحت S می شوند بنابراین مساحت S واحد مجموع مساحت های مستطیل تقریب زن تعریف می کنیم یعنی:

$$\xrightarrow{\hspace{10em}} S = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_A)_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_B)_n = \frac{1}{3}$$

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + \dots + f(x_n)\Delta x)$$


$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x = \int_a^b f(x)dx$$

F تابعی می باشد که به ازای $a \leq x \leq b$ تعریف شده است و اگر حد وجود داشته باشد می گوئیم f روی $[a, b]$ انتگرال پذیر است.

برای درک بهتر انتگرال دو شیوه محاسبه مساحت را داریم:

رپ ۲۱۷ فرخو: محاسبه مساحت (۱): فرض کنید $F(x) \geq 0$ روی $[a, b]$ انتگرال پذیر باشد، مساحت ناحیه زیر منحنی F و خطوط $x=a$ و $x=b$ و $y=0$ برابر است با


$$A(s) = \int_a^b F(x)dx$$



رپ ۲۱۸ و ۲۱۹ فرخو: محاسبه مساحت (۲): فرض کنید $F(x) \leq 0$ روی $[a, b]$ انتگرال پذیر باشد، مساحت


ناحیه بالای منحنی F و خطوط $x=a$ و $x=b$ و $y=0$ برابر است با

$$A(s) = - \int_a^b F(x) dx$$



شکل

تابع انتگرال پذیر F را روی بازه $[a, b]$ در نظر بگیرید. فرض کنید نمودار F داریم:




$$A(s) = A(s_1) + A(s_2) + A(s_3)$$

$$A(s) = \int_a^c F(x) dx - \int_c^d F(x) dx + \int_d^b F(x) dx$$

قضیه: فرض کنید F روی $[a, b]$ پیوسته باشد. در این صورت اگر $F(t) = \int_a^t F(x) dx$, $a \leq t \leq b$

آنگاه F مشتق پذیر است و $\dot{F}(t) = f(t)$



آیزاک بارو (۱۶۳۰-۱۶۷۷) استاد نیوتن در کیمبرج پی برد که دو مساله حساب دیفرانسیل و انتگرال به هم مربوط اند. در حقیقت او متوجه شد که مشتق گیری و انتگرال پذیری فرآیندهای عکس یکدیگرند و نیوتن لایپ نییتس بودند که از این رابطه نهایت استفاده را بردند.

پ ۳۴۳: مثال: فرض می کنیم $f(x)$ تابع اولیه آن $F(x) = x^2$ می باشد داریم

$$\dot{F}(x) = (x^2) = 2x = f(x)$$

تعریف: تابع $F(x)$ را یک تابع اولیه $f(x)$ در فاصله I می نامیم هرگاه به ازای هر x از I داشته باشیم

$$\dot{F}(x) = f(x)$$

انتگرال نامعین: اگر $F(x)$ یک تابع اولیه $f(x)$ باشد عبارت $F(x) + c$ را انتگرال نامعین f می گوئیم و به صورت $\int f(x)dx = F(x) + c$ نشان می دهیم و بنابر تعریف فوق $\dot{F}(x) = f(x)$ آنگاه $\int f(x)dx = F(x) + c$ (C عددی ثابت است).

انتگرال معین:

(دومین قضیه حساب دیفرانسل و انتگرال) هرگاه تابع $f(x)$ در $[a, b]$ پیوسته باشد و $F(x)$ یک تابع اولیه برای $f(x)$ باشد داریم:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

به عبارت دیگر داریم:

$$\int_a^b f(x)dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

تعریف فوق را انتگرال معین یک تابع در بازه $[a, b]$ می گویند.

روشهای انتگرال گیری

۱- انتگرال گیری با فرمول های انتگرال گیری

۲- انتگرال گیری به روش جانشینی (تغییر متغیر)

۳- انتگرال گیری توابع شامل رادیکال

۴- انتگرال گیری به روش جزء به جزء

۵- انتگرال گیری از روش های تجزیه به کسرهای جزئی (روش هویساید)

۶- انتگرال گیری از انتگرال معین توابع زوج و فرد در فاصله های متقارن

۷-انتگرال گیری از توابع سینوسی و کسینوسی

قضایا و فرمولهای ریاضی ۴۶۹: قوانین و فرمولهای انتگرال:

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx \quad , \quad \int kf(x) dx = k \int f(x) dx \quad \text{مقداری ثابت } k$$

$$\int dx = x + c \quad , \quad \int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + c \quad (n \neq -1)$$

$$\int \sqrt[n]{x} dx = \frac{n}{n+1} \sqrt[n]{x^{n+1}} + c \quad , \quad \int (ax + b)^n dx = \frac{1}{(n+1)a} (ax + b)^{n+1} + c \quad n \neq -1$$

نکته در فرمولهای زیر $du = u' dx$

$$1. \int u dv = uv - \int v du$$

$$2. \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$3. \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C$$

$$4. \int e^u du = e^u + C$$

$$5. \int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$$

$$6. \int \sin u du = -\cos u + C$$

$$7. \int \cos u du = \sin u + C$$

$$8. \int \sec^2 u du = \tan u + C$$

$$9. \int \csc^2 u du = -\cot u + C$$

$$10. \int \sec u \tan u du = \sec u + C$$

$$11. \int \csc u \cot u du = -\csc u + C$$

$$12. \int \tan u du = \ln |\sec u| + C$$

$$13. \int \cot u du = \ln |\sin u| + C$$

$$14. \int \sec u du = \ln |\sec u + \tan u| + C$$

$$15. \int \csc u du = \ln |\csc u - \cot u| + C$$

$$16. \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$$

$$17. \int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a} + C$$

$$18. \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \frac{u}{a} + C$$

$$19. \int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u+a}{u-a} \right| + C$$

$$20. \int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u-a}{u+a} \right| + C$$

روش های انتگرال گیری

۱- انتگرال گیری با فرمول های انتگرال گیری

$$\int \sqrt[3]{x} dx =$$

$$\int (3x + 5)^{17} dx =$$

$$\int \frac{1}{\sqrt[3]{(3x + 2)^2}} dx =$$

$$\int x \cot x^2 dx =$$

$$\int_2^3 (x^2 - 2x) dx =$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1 + x^2} =$$

$$(82 \text{ ارشد سیستم}) \int_0^{\infty} \frac{dx}{4 + x^2} =$$

$$(82 \text{ ارشد سیستم}) \int_0^1 \ln(1 + x) dx =$$

$$(82 \text{ ارشد آمار}) \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x + 1)} dx =$$

۲- انتگرال گیری به روش جانشینی (تغییر متغیر)

در این روش ، یک متغیر مناسب را معرفی می کنیم و سپس انتگرال اصلی مان را بر حسب این متغیر جدید بازنویسی می کنیم و مساله را حل می کنیم.

$$(82 \text{ ارشد ژئوفیزیک}) \int_0^2 2e^{2x} dx =$$

$$(82 \text{ ارشد صنایع}) \int_0^{\infty} \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx =$$

۳- انتگرال گیری توابع شامل رادیکال

در محاسبه انتگرال های شامل رادیکال بجزء حال خاص زیر، همواره رادیکال را برابر u در نظر می گیریم.

حالت خاص: در محاسبه انتگرال های شامل تابع $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ به شرط آنکه نتوان مشتق زیر رادیکال را ایجاد کرد، ابتدا با مربع سازی آن را به یکی از شکل های $\sqrt{u^2 + a^2}$ ، $\sqrt{u^2 - a^2}$ و یا $\sqrt{a^2 - u^2}$ تبدیل کرده و سپس به ترتیب از جانشینی های $u = a \tan \theta$ ، $u = a \sec \theta$ و $u = a \sin \theta$ استفاده می کنیم.

چند فرمول مثلثاتی خاص:

$$\sqrt{1 + \cos x} = \sqrt{2} \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| \quad ** \quad \sqrt{1 - \cos x} = \sqrt{2} \left| \sin \frac{\theta}{2} \right|$$

$$\sqrt{1 + \sin x} = \left| \sin \frac{\theta}{2} + \cos \frac{\theta}{2} \right| \quad ** \quad \sqrt{1 - \sin x} = \left| \sin \frac{\theta}{2} - \cos \frac{\theta}{2} \right|$$

$$(83 \text{ ارشد عمران}) \int \frac{dx}{x - \sqrt{x}} =$$

$$(83 \text{ ارشد معدن}) \int_4^9 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} dx =$$

$$(78 \text{ ارشد ریاضی}) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \sin x} dx =$$

$$(82 \text{ ارشد ریاضی}) \int_1^3 \frac{x}{\sqrt{4x - x^2}} dx =$$

۴- انتگرال گیری به روش جزء به جزء

این قاعده به این صورت می باشد: $\int u \cdot dv = uv - \int v du$

که u و v توابعی از متغیر X می باشند و برخی مواقع لازم می شود برای محاسبه یک انتگرال چند بار از روش جزء به جزء استفاده کنیم. در کلیه موارد u عضو مجموعه پائینتر انتخاب می شود. در این روش در انتخاب u و dv باید دقت لازم را داشته باشیم.

۱	۲	۳
$\ln x$ معکوس های مثلثاتی معکوس های هذلولی	چند جمله ای ها	e^{ax} $\sin bx$ $\cos bx$ $\sinh bx$ $\cosh bx$

روش جزء به جزء را برای انتگرال گیری از توابع زیر بکار می بریم:

۱- انتگرال گیری از توابع مجموعه ۱

۲- انتگرال گیری از حاصل ضرب های توابع مجموعه ۳

۳- انتگرال گیری از توابع مجموعه ۲ در ۳

۴- انتگرال گیری از توابع مجموعه ۲ در ۱

$$\int_0^1 x \ln x \, dx = \text{(ارشد ژئوفیزیک 82)}$$

$$\int \sin^2 x \, dx =$$

$$\int_0^1 x e^x \, dx =$$

انتگرال مشتق

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = \text{(ارشد ژئوفیزیک 79)}$$

انتگرال مشتق

۵-انتگرال گیری از روش های تجزیه به کسرهای جزئی (روش هویساید)

در ابتدای کار فرض می کنیم که درجه صورت کسر کوچکتر از مخرج هست سپس صورت و مخرج کسر را تا آن جا که ممکن است به حاصلضرب عوامل درجه اول و دوم تجزیه کرده و ساده میکنیم.

تجزیه به کسرهای ساده ، برای یک کسر گویا به صورت $f(x) = \frac{g(x)}{(x-a)^3(x-b)^n}$ که $n \in \mathbb{N}$ داریم:

$$f(x) = \frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \frac{A_3}{(x-a)^3} + \frac{B_1}{x-b} + \frac{B_2}{(x-b)^2} + \dots + \frac{B_n}{(x-b)^n}$$

$$A_n = \lim_{x \rightarrow a} (x-a)^n f(x)$$

$$B_n = \lim_{x \rightarrow a} (x-b)^n f(x)$$

تجزیه به کسرهای ساده ، برای یک کسر گویا به صورت $f(x) = \frac{g(x)}{(ax^2+bx+c)^n}$ که $n \in \mathbb{N}$ داریم:

$$f(x) = \frac{A_1x + B_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \dots + \frac{A_nx + B_n}{(ax^2 + bx + c)^n}$$

در ادامه با مخرج مشترک گرفتن و معادل قرار دادن صورت ، کسر حاصل با صورت اصلی تابع میتوانیم محاسبه کنیم.

$$(75 \text{ ارشد ریاضی}) \int_1^2 \frac{x^2 - 1}{x(x^2 + 1)} dx =$$

$$(78 \text{ ارشد صنایع}) \int \frac{dx}{x(1+x)^2} =$$

6-انتگرال گیری از انتگرال معین توابع زوج و فرد در فاصله های متقارن

اگر $f(x)$ تابع فرد یعنی $f(-x) = -f(x)$ و $g(x)$ یک تابع زوج باشد یعنی $g(-x) = f(x)$ داریم:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0 \qquad \int_{-a}^a g(x) dx = 2 \int_0^a g(x) dx$$

$$(77 \text{ ارشد ژئوفیزیک}) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{1-x^2} =$$

$$(79 \text{ ارشد مهندسی هسته ای}) \int_{-1}^1 \frac{xdx}{x^4 + x^2 + 1} =$$

۷-انتگرال گیری از توابع سینوسی و کسینوسی

الف) انتگرال گیری از توانهای زوج \sin و \cos داریم:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

ب) انتگرال گیری از توانهای فرد \sin و \cos داریم:

نکته $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

$$\sin^{2+1} x = \sin x (\sin^2 x)^n = \sin x (1 - \cos^2 x)^n$$

$$\cos^{2+1} x = \cos x (\cos^2 x)^n = \cos x (1 - \sin^2 x)^n$$

ج) انتگرال گیری از فرمت $\int \sin^m x \cos^n x$ داریم:

اگر m یا n یکی فرد باشد فرض می کنیم m فرد باشد یعنی $m=2k+1$:

$$\sin^m x \cos^n x = \sin x (1 - \cos^2 x)^k \cos^n x$$

اگر m, n هر دو زوج باشد مثلا $m=2k$:

$$\sin^m x \cos^n x = (1 - \cos^2 x)^k \cos^n x$$

د) انتگرال گیری از توابع گویا بر حسب \sin و \cos داریم:

$$z = \tan \frac{x}{2}, \quad \sin x = \frac{2z}{1+z^2}, \quad \cos x = \frac{1-z^2}{1+z^2}, \quad dz = \frac{1}{2}(1+z^2)dx$$

*غیر از موارد فوق می توان از روش جانشینی (تغییر متغیر) نیز استفاده کرد.

$\int \sin^2 x dx =$ (برای حل این سوال به قسمت جزء به جزء توجه شود)

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x \quad \text{یاداوری}$$

$$\int \sin^4 x \, dx =$$

$$\int \sin^3 x \cos x \, dx =$$

انتگرالهای زیر را حل کنید؟

$$\int \frac{dx}{x+a} =$$

$$\int \frac{x^2}{x^3+4} dx =$$

$$\int \frac{\cos x}{2 \sin x + 5} dx =$$


$$\int x^2 \ln x \, dx =$$

کاربردهای انتگرال

محاسبه مساحت در مختصات دکارتی:

اگر تابع $f(x)$ در بازه $[a, b]$ انتگرال پذیر باشد و نمودار آن به صورت زیر باشد، مساحت سطح محصور بین منحنی و محور x ها، در فاصله $[a, b]$ به صورت زیر محاسبه می شود:

$$S = \int_a^c |f(x)| dx + \int_c^b f(x) dx$$



شکل (۴-۲)

مساحت سطح محصور بین دو منحنی:


مساحت سطح محصور به منحنی های $y=f(x)$ و $y=g(x)$ برای $a < x < b$ برابر است با:

$$A = \left| \int_a^b (f(x) - g(x)) dx \right|$$

اگر $a < c < b$ و c یک نقطه تقاطع دو خم باشد، آنگاه مساحت برابر است با:

$$A = \left| \int_a^c (f(x) - g(x)) dx \right| + \left| \int_c^b (f(x) - g(x)) dx \right|$$

مساحت ناحیه محدود بین محور $4y$ ، خط $x = \frac{\pi}{4}$ و بالای نمودار $y = \sin x$ و زیر نمودار $y = \cos x$ کدام است؟ (ارشد ریاضی ۷۵)



محاسبه حجم:

الف) اگر f تابعی انتگرال‌پذیر و پیوسته باشد، حجم حاصل از دوران مساحت محصور بین نمودار $y = f(x)$ و محور x ها و خطوط $x = a$ و $x = b$ حون محور x ها از طریق فرمول زیر بدست می‌آید:

$$V = \int_a^b \pi f^2(x) dx = \text{حجم حاصل}$$

ب) اگر g تابعی انتگرال‌پذیر و پیوسته باشد، حجم حاصل از دوران مساحت محصور بین نمودار $x = g(y)$ و محور y ها و خطوط $y = a$ و $y = b$ حول محور y ها از طریق فرمول زیر به دست می‌آید:

$$V = \int_a^b \pi g^2(y) dy = \text{حجم حاصل}$$

حجم حاصل از دوران یک ناحیه حول خط افقی

حجم حاصل از دوران ناحیه بین دو خم غیرمقاطع $y=f(x)$ و $y=g(x)$ و خطوط $x=a$ و $x=b$ حول خط $y=c$ که ناحیه را قطع نمی‌کند برابر است با

$$v = \pi \left| \int_a^b ((f(x) - c)^2 - (g(x) - c)^2) dx \right|$$

حجم حاصل از دوران یک ناحیه حول خط قائم

حجم حاصل از دوران ناحیه بین دو خم غیرممتقاطع $x=f(y)$ و $x=g(y)$ و خطوط $y=a$ و $y=b$ حول خط $x=c$ که ناحیه را قطع نمی کند برابر است با

$$v = \pi \left| \int_a^b ((f(y) - c)^2 - (g(y) - c)^2) dy \right|$$

حجم حاصل از دوران ناحیه محدود به نمودار $(x \geq 0)$ و $y=x^3$ ، خط $y=1$ و محور y حول محور y کدام است؟ (ارشد علوم کامپیوتر ۸۳)

۱۴- طول خم در صفحه

طول خم هموار c در صفحه xy برابر است با:

$$L = \int_c ds = \int_c \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

در اینجا اگر

الف- c خم هموار $y=f(x)$ برای $x=a$ تا $x=b$ باشد، آنگاه:

$$L = \int_a^b \sqrt{1+f'(x)^2} dx$$

ب- c خم هموار $x=f(y)$ برای $y=a$ تا $y=b$ باشد، آنگاه:

$$L = \int_a^b \sqrt{1+f'(y)^2} dy$$

پ- c خم هموار $x=f(t)$ و $y=g(t)$ برای $t=t_1$ تا $t=t_2$ باشد، آنگاه:

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{f'(t)^2 + g'(t)^2} dt$$

د) اگر منحنی C با معادله قطبی $r = f(\theta)$ تعریف شده باشد می‌توان نشان داد:

$$dS = \sqrt{f'^2(\theta) + f^2(\theta)} d\theta$$

ه) اگر منحنی C در فضا با بردار موضعی $\vec{p}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$ تعریف شده باشد می‌توان نشان داد:

$$dS = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt$$

و) سطح رویه‌ی حاصل از دوران قسمتی از نمودار $y = f(x)$ که بالای محور x ها بین دو خط $x = a$ و $x = b$ واقع است حول محور x ها عبارتست از:

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$$

۱۵- مساحت سطح حاصل از دوران

مساحت سطح حاصل از دوران خم c حول یک خط افقی یا قائم، برابر است با:

$$S = 2\pi \int_c R ds$$

در اینجا R برابر فاصله خم از محور دوران است. متغیر انتگرالگیری متناسب با شکل ds مطابق بحث بالا انتخاب می‌گردد.

۱۶- قضایای پاپوس

- تضیه ۱- حجم حاصل از دوران ناحیه D محدود به خم بسته C حول یک خط برابر حاصلضرب مساحت ناحیه D در طول مسیری است که مرکز جرم D در حین دوران می‌پیماید.
- تضیه ۲- مساحت حاصل از دوران ناحیه D محدود به خم بسته C حول یک خط برابر حاصلضرب محیط ناحیه D (طول C) در طول مسیری است که مرکز جرم D در حین دوران می‌پیماید.

مقدار متوسط یک تابع:

$$\overline{f(x)} = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b - a}$$

انتگرال‌های چندگانه

انتگرال های دوگانه روی ناحیه محدود به یک منحنی بسته، برای اولین بار در سال ۱۷۶۹ توسط اولر معرفی شد و راه حلی ارائه داد که می توان به کمک دو انتگرال یگانه، انتگرال دوگانه را محاسبه نمود.

انتگرال مفهومی است که در محاسبه دقیق کمیت هایی مکه به حاصلضرب دو کمیت دیگر بستگی دارند مورد استفاده قرار میگیرد. مانند محاسبه حجم که برابر است با حاصلضرب مساحت قاعده در ارتفاع و یا جرم که عبارت است از حاصلضرب حجم در چگالی و یا گشتاور که برابر است با حاصلضرب جرم در مجذور فاصله.

فرض کنید R ناحیه بسته و متناهی در صفحه xy باشد. منظور از افراز R ، تقسیم آن به n زیر ناحیه بسته متناهی $R_1, R_2, R_3, \dots, R_n$ می باشد.

شکل:

همانطور که در شکل میبینید R افراز شده به $R_1, R_2, R_3, \dots, R_n$.

نتیجه ۱: اگر $z=f(x,y)$ روی ناحیه بسته و متناهی R ، نامنفی باشد. حجم جسم صلبی که از طرف پائین بوسیله ناحیه R واقع در xy و از اطراف توسط استوانه ای که مرز R ، منحنی هادی و محور Z ها محور آن باشد و از بالا بوسیله رویه $z=f(x,y)$ محصور شود برابر است با:

$$v = \iint_R f(x,y) dA$$

یادآوری: جسم صلب به انگلیسی (Rigid body): به سیستمی گفته می شود که شامل تعداد زیادی ذرات ثابت هست که فاصله ی ذرات از یکدیگر همواره ثابت است. این فاصله حتی در صورتی که به جسم نیرو وارد شود و یا حرکت کنید نیز ثابت می ماند. دنیای پیرامون ما سرشار از اجسام صلب می باشد. از پایه های پل گرفته تا دندان های یک چنگال همگی اجسام صلب هستند. در واقع به جسمی که فاصله بین نقاط آن تغییر نکند، جسم صلب گفته می شود.

نتیجه 2: در فرمول بالا اگر $f(x,y) = 1$ فرض شود، در این صورت

$$R \text{ مساحت ناحیه} = \iint_R dA$$

نکته: انتگرال دوگانه، همیشه نماینده یک حجم نیست.

نکته: انتگرال دوگانه، تعمیم انتگرال معین است، بنابراین تمام خواص و قضایای انتگرال معین را دارا می باشد.

قضیه: اگر تابع دو متغیره $f(x,y)$ روی ناحیه بسته و متناهی R پیوسته باشد، آنگاه روی R انتگرال پذیر است.

نکته: اگر $f(x,y)$ تابعی پیوسته روی ناحیه مستطیل شکل R باشد آنگاه:

$$\int_a^b \int_c^d f(x,y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x,y) dx dy$$

قابل ذکر است که اگر تابع $f(x,y)$ در R پیوسته نباشد، تساوی فوق الزاما برقرار نیست.

هرگاه $f(x,y)$ مثبت باشد، انتگرال دوگانه f روی ناحیه مستطیلی R را می توان به صورت حجم منشوری تعبیر کرد که از پایین به R و از بالا به رویه $z = f(x,y)$ محدود است.

قضیه ۱ (صورت اول قضیه فوبینی). اگر $f(x,y)$ بر ناحیه مستطیلی

$$R : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$$

پیوسته باشد، آنگاه

$$\iint_R f(x,y) dA = \int_c^d \int_a^b f(x,y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x,y) dy dx$$

توجه. قضیه فوبینی بیانگر آن است که انتگرالهای دوگانه روی مستطیلها را همواره می توان به صورت انتگرالهای مکرر محاسبه کرد. یعنی می توان یک انتگرال دوگانه را با انتگرال گیری از یک متغیر در هر بار، با استفاده از روشهای انتگرال گیری که در مورد توابع یک متغیره می دانیم، محاسبه کرد. همچنین قضیه فوبینی بیانگر آن است که برای انتگرال گیری از انتگرال دوگانه هر ترتیبی را می توان برگزید.

انتگرالهای دوگانه توابع پیوسته روی نواحی غیرمستطیلی همه ویژگیهای جبری را که برای انتگرالهای روی نواحی مستطیلی برشمردیم، دارند.

قضیه ۲ (صورت قویتر قضیه فوینی). فرض کنید $f(x, y)$ روی ناحیه‌ای چون R پیوسته باشد. در این صورت

۱. اگر تعریف R عبارت باشد از $a \leq x \leq b$ ، $f_1(x) \leq y \leq f_2(x)$ ، با این شرط که f_1 و f_2 بر $[a, b]$ پیوسته باشند، داریم




$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} f(x, y) dy dx$$

۲. اگر تعریف R عبارت باشد از $c \leq y \leq d$ ، $g_1(y) \leq x \leq g_2(y)$ ، با این شرط که g_1 و g_2 بر $[c, d]$ پیوسته باشند، داریم

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_c^d \int_{g_1(y)}^{g_2(y)} f(x, y) dx dy$$

تعیین حدود انتگرال‌گیری

اگر بخواهیم انتگرال $\iint_R f(x, y) dA$ را روی ناحیه R داده شده در شکل (الف) به این ترتیب محاسبه کنیم که نخست نسبت به y و سپس نسبت به x انتگرال بگیریم، مراحل زیر را طی می‌کنیم. مرحله ۱. خط قائمی چون L را در نظر می‌گیریم که در جهت افزایش y ناحیه R را قطع کند (شکل (ب)).



مرحله ۲. مختص y نقطه ورود L به R را حد پایینی و مختص y نقطه خروج L از R را حد بالایی اختیار می‌کنیم و انتگرال می‌گیریم.


مرحله ۳. حدود x را چنان بر می‌گزینیم که همه خطوط قائمی را که از R می‌گذرند، در برگیرند (شکل پ)).

پس از طی مراحل بالا مشاهده می‌شود که

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_{x=0}^{x=1} \int_{y=1-x}^{y=\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy dx$$

برای محاسبه همین انتگرال دوگانه به صورت یک انتگرال مکرر اما با ترتیب انتگرال‌گیری معکوس، مطابق شکل زیر از خطوط افقی استفاده نموده و نتیجه می‌گیریم که

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_{y=0}^{y=1} \int_{x=1-y}^{x=\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx dy$$



انتگرال‌های چند گانه زیر را حل کنید؟

$$\int_3^4 \int_1^2 \frac{1}{(x+y)^2} dy dx =$$

$$\iint_R \sin x \, dA \text{ به طوری که ناحیه } R \text{ محصور است بوسیله خطوط } y = 2x, y = \frac{x}{2}, x = \pi$$

مساحت ناحیه محصور بین منحنی های داده شده را حساب کنید؟

$$y = x^3, \quad y = x^2$$

فرض کنید R ناحیه محدود به نمودارهای $Y=X^2$ و $Y=X+6$ باشد. انتگرال دوگانه زیر را محاسبه کنید؟

$$\iint_R (x + 4x) dA =$$

ص ۴۲۲ پیام نور

* بررسی نتیجه دو ص ۳۷ جزوه * مساحت ناحیه محدود به نمودارهای $y = 8 - \frac{x^2}{2}$ و $y = 2 - \frac{x}{2}$ را با استفاده از انتگرال دوگانه محاسبه کنید؟ ص ۴۲۶ پیام نور

تغییر ترتیب انتگرال گیری

گاهی محاسبه یکی از دو انتگرال مکرر مشکل یا غیر ممکن است در حالی که انتگرال مکرر دوم را به آسانی می توان محاسبه کرد. تعویض یک انتگرال مکرر به دیگری را "تغییر ترتیب انتگرال گیری" می گوئیم. زیرا یکی از $dydx$ و $dx dy$ به دیگری تغییر می یابد.

انتگرال زیر را محاسبه کنید؟


$$\int_0^9 \int_{\sqrt{y}}^3 \sin \pi x^3 dx dy =$$

محاسبه $\sin \pi x^3$ آسان نیست همانور که از تابع فوق و حدود انتگرال ها مشخص است داریم:

$$0 \leq y \leq 9, \quad x = 3, \quad x = \sqrt{y}$$

(جزوه درس ریاضیات عمومی ۱ و ۲ - صفحه ۷۵) مدرس: عزت الله فریدنیا

شکل را داریم و با توجه به شکل می توانیم ناحیه R و حدود انتگرال گیری را مشخص کنیم (طبق تعاریف هایی که در ص ۳۹ جزوه داشتیم):



$$0 \leq y \leq 3 \quad , \quad x = 3 \quad , \quad x = \sqrt{y}$$

$$\int_0^3 \int_{\sqrt{y}}^3 \sin \pi x^3 \, dx dy =$$

تغییر متغیر (جانشینی) در انتگرال های دوگانه:

۳- جانشینی ها در انتگرال های دوگانه
برای استفاده از جانشینی $x = g_1(u, v)$ و $y = g_2(u, v)$ در انتگرال دوگانه $\iint_D f(x, y) \, dA$ بترتیب زیر عمل می کنیم:
۱. ابتدا $f(x, y)$ را بر حسب u و v می نویسیم تا $F(u, v)$ نتیجه شود.

۲. مقدار $j = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$ را محاسبه کرده و به جای dA مقدار $|j| \, du \, dv$ را جانشین می کنیم.

۳- مرزهای ناحیه بر حسب x و y را بر حسب u و v بدست آورده و $\iint_{D'} F(u, v) |j| \, du \, dv$ را که در آن D' تبدیل ناحیه D است، محاسبه می کنیم.


زا را ژاکوبی تبدیل می نامند.

توجه کنید که اگر تبدیل به صورت $u = g_1(x, y)$ و $v = g_2(x, y)$ داده شده باشد، آنگاه بهتر است برای

تعیین ژاکوبی، مقدار $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$ را محاسبه کنیم. در این صورت $j = \frac{1}{\partial(u, v) / \partial(x, y)}$.

انتگرال دوگانه زیر را حل کنید؟

$$\iint_R (y-x) dA = ? \quad R: \begin{cases} y-x = -3 \\ y-x = 1 \\ y+\frac{x}{3} = \frac{7}{3} \\ y+\frac{x}{3} = 5 \end{cases}$$



مرحله ۱: $f(x,y)$ را بر حسب u, v می نویسیم

$$u = y - x$$

$$v = y + \frac{x}{3}$$

مرحله 2: بدست آوردن مقدار ژاکوبی J

$$|J| = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \frac{1}{\begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix}} =$$

مرحله 3: بدست آوردن مرزهای R بر حسب u و v

$$u = y - x = 3 \quad , \quad u = -3$$

$$u = y - x = 1 \quad , \quad u = 1$$

$$v = y + \frac{x}{3} = \frac{7}{3} \quad , \quad v = \frac{7}{3}$$

$$v = y + \frac{x}{3} = 5 \quad , \quad v = 5$$

حال به ادامه حل انتگرال می پردازیم: یادآوری: $u = y - x$

$$\iint_R (y-x) dA \xrightarrow{\text{تبدیل به } v, u} \int_{\frac{7}{3}}^5 \int_{-3}^1 u \, du \, dv =$$

انتگرال دوگانه زیر را حل کنید؟

$$\int_0^1 \int_0^{1-y} \cos \frac{x-y}{x+y} dx dy =$$

مرحله ۱: $f(x,y)$ را بر حسب u, v می نویسیم

$$u = x - y$$

$$v = x + y$$

با حل دستگاه فوق داریم:

$$u + v = 2x \quad , \quad x = \frac{1}{2}(u + v) \quad \text{با جایگذاری داریم} \quad y = \frac{1}{2}(u - v)$$

مرحله 2: بدست آوردن مقدار ژاکوبی J

$$|J| = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \frac{1}{\begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix}} =$$

مرحله 3: بدست آوردن مرزهای R بر حسب u و v

$$1. x=1-y \quad \text{پس داریم} \quad x+y=1 \quad \text{بنابراین} \quad u=v$$

$$2. x=0 \quad \text{با جایگذاری در فرمول بدست آمده مرحله اول}$$

$$\begin{cases} u = 0 - y \\ v = 0 + y \end{cases} \rightarrow u = -v \quad \text{قرینه یکدیگرند}$$

$$3. y=0$$

$$\begin{cases} u = x - 0 \\ v = x + 0 \end{cases} \rightarrow u = v \quad \text{برابند}$$

$$\text{با فرمول بدست آمده} \quad y = \frac{1}{2}(u - v) \quad \text{داریم} \quad y=0$$

$$4. v=1 \quad \text{با توجه به بند ۱ داریم}$$

حال به ادامه حل انتگرال می پردازیم:

$$\int_0^1 \int_0^{1-y} \cos \frac{x-y}{x+y} dx dy = \xrightarrow{\text{تبدیل به } v, u} \frac{1}{2} \int_0^1 \int_{-v}^v \cos \frac{u}{v} du dv =$$

$$\frac{1}{2} \int_0^1 v \sin \frac{u}{v} \Big|_{-v}^v dv =$$

مثال: محاسبه مساحت ناحیه محصور به منحنی های زیر را حل کنید؟

$$xy = 4, \quad xy = 8, \quad xy^3 = 5, \quad xy^3 = 15$$

$$u = xy, \quad v = xy^3 \quad -1$$

- 2

$$|j| = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \frac{1}{\begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} y & x \\ y^3 & 3xy^2 \end{vmatrix}} =$$

- 3


$$u = xy = 4 \quad \underline{u=4}, \quad u = xy = 8 \quad \underline{u=8}$$

$$v = xy^3 = 5 \quad \underline{v=5}, \quad v = xy^3 = 15 \quad \underline{v=15}$$

$$\int_5^{15} \int_4^8 \frac{1}{2xy^3} du dv \quad \text{با توجه به بند یک } xy^3 = v \quad \int_5^{15} \int_4^8 \frac{1}{2v} du dv =$$

انتگرال های دوگانه در مختصات قطبی:

اگر ناحیه انتگرال گیری دایره باشد و یا عامل $x^2 + y^2$ ، می توان از تبدیل قطبی $y = r \cos \theta$ و $x = r \sin \theta$ استفاده کرد. در این حالت ابتدا تابع زیر انتگرال را بر حسب r و θ نوشته و به جای $dydx$ مقدار $r dr d\theta$ را جانشین می کنیم. سپس از رسم ناحیه نیم خطی از مبداء به سمت خارج چنان رسم میکنیم تا مرزهای ناحیه را در $r = f_1(\theta)$ و $r = f_2(\theta)$ قطع کند. این دو مرزهای انتگرال داخلی و حداقل و حداکثر مقدار θ در ناحیه حدود انتگرال خارجی است.



$$\iint_D f(x, y) dA = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{f_1(\theta)}^{f_2(\theta)} F(r, \theta) r dr d\theta$$

مثال: مساحت ناحیه درون دلمای $r = 1 + \cos \theta$ و بیرون دایره $r = 1$ را پیدا کنید؟


ابتدا محل تلاقی دو منحنی را پیدا می کنیم

$$1 = 1 + \cos \theta \rightarrow \cos \theta = 0, \theta = \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$$

$$\iint_D f(x, y) dA \xrightarrow{\text{تبدیل به مختصات قطبی}} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_1^{1+\cos \theta} r dr d\theta =$$

مساحت یکبرگ گل از کل $r = a \cos 2\theta$ را پیدا کنید؟

$$r = 0, \cos 2\theta = 0, \theta = \frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}$$



$$\iint_D f(x, y) dA \xrightarrow{\text{تبدیل به مختصات قطبی}}$$

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{a+\cos 2\theta} r \, dr d\theta =$$

مطلوبست محاسبه حجم جسم صلبی که از بالا به صفحه $z = 2r \sin \theta$ و از پائین به سهمی گون $z = r^2$ محصور می باشد؟

ابتدا فصل مشترک صفحه با سهمی گون را پیدا می کنیم آنها را مساوی هم قرار می دهیم.

$$r^2 = 2r \sin \theta \quad \rightarrow \quad r = 2 \sin \theta \quad \rightarrow \quad 2 \sin \theta = 0 \quad , \quad \theta = 0, \pi$$

$$\int_0^{\pi} \int_0^{2 \sin \theta} (2r \sin \theta - r^2) r \, dr d\theta =$$

انتگرال های سه گانه

انتگرال سه گانه

تعریف انتگرال سه گانه و ویژگیهای آن شبیه به حالت دوگانه بوده لذا، بدون ذکر آنها به بحث در باره روش محاسبه انتگرالهای سه گانه می پردازیم.

محاسبه انتگرالهای سه گانه در مختصات قائم

برای محاسبه انتگرالهای سه گانه صورت سه بعدی قضیه فوینی را به کار می بریم و با استفاده از انتگرال گیر یگانه (ساده) مکرر، انتگرال سه گانه را محاسبه می کنیم. روش فوق در چند سطر زیر توضیح داده شده است.

ناحیه ای چون D داریم که از پایین به رویه $z = f_1(x, y)$ و از بالا به رویه $z = f_2(x, y)$ محدود است و می خواهیم از تابع پیوسته ای چون $F(x, y, z)$ در این ناحیه انتگرال بگیریم.

فرض کنید R سایه ناحیه (تصویر قائم) D روی صفحه xy باشد. در این صورت انتگرال F روی D

برابر است با

$$\iiint_D F \, dv = \iint_R \left(\int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} F(x, y, z) \, dz \right) dy \, dx \quad (1)$$

انتگرال سه گانه $f(x, y, z) = xy^3z^2$ را روی ناحیه زیر محاسبه کنید؟

$$D = \{(x, y, z) \mid -1 \leq x \leq 3, \quad 1 \leq y \leq 4, \quad 0 \leq z \leq 2\}$$

$$\iiint_D xy^3z^2 \, dv = \int_1^4 \int_{-1}^3 \int_0^2 xy^3z^2 \, dz \, dx \, dy =$$

سوال فوق را نیز می توانیم از طریق روش های دیگر نیز حل نمود انتگرال نسبت به $dx \, dz \, dy$ و روش های دیگر.

فرض کنید R مثلث محدود به نمودارهای $y=0$ و $y=x$ و $x=1$ و D بین دو رویه $Z=-y^2$ و $Z=x^2$ به ازای (x, y) در R ، واقع باشد. انتگرال سه گانه زیر را محاسبه کنید؟

$$\iiint_D (x + 1) \, dv = \int_0^1 \int_0^x \int_{-y^2}^{x^2} (x + 1) \, dz \, dy \, dx =$$

مطلوبست محاسبه $\iiint_D (xz + 3z) \, dv$ ، D ناحیه محصور به استوانه $x^2 + z^2 = 9$ و صفحات $x+y=3$ ، $z=0$ ، $y=0$ و بالای صفحه xy می باشد.

$$\iiint_D (xz + 3z) \, dv = \int_{-3}^3 \int_0^{3-x} \int_0^{\sqrt{9-x^2}} (xz + 3z) \, dz \, dy \, dx =$$

پس از محاسبه $\int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} F(x,y,z) dz$ عبارت سمت راست تساوی (۱) به صورت یک

انتگرال دوگانه روی ناحیه R در خواهد آمد که روش محاسبه آن قبلاً توضیح داده شده است. تشخیص ناحیه R و تعیین حدود آن اساسی ترین مرحله محاسبه انتگرالهای سه گانه می باشد.

حجم یک ناحیه در فضا

حجم ناحیه ای محصور و بسته در فضا مانند D برابر است با

$$V_D = \iiint_D dv = \iiint_D dx dy dz$$

تغییر متغیر در انتگرالهای سه گانه

فرض کنید ناحیه ای چون G از فضای uvw با معادلات مشتق پذیری به صورت زیر به ناحیه R واقع در فضای xyz تبدیل شوند

$$x = g(u, v, w), \quad y = h(u, v, w), \quad z = k(u, v, w)$$

در این صورت هر تابعی چون $F(x, y, z)$ را که بر R تعریف شده باشد می توان به صورت تابع

$$F(g(u, v, w), h(u, v, w), k(u, v, w)) = H(u, v, w)$$

که بر G تعریف شده است در نظر گرفت. رابطه زیر انتگرال $F(x, y, z)$ روی R را به انتگرال $H(u, v, w)$ روی G مربوط می سازد.

$$\iiint_R F(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G H(u, v, w) |J(u, v, w)| du dv dw$$

$J(u, v, w)$ که قدر مطلقش در این رابطه آمده است، برابر است با

$$J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}$$

تذکر مهم. از مهمترین تغییر متغیرها برای محاسبه انتگرالهای سه گانه تغییر متغیرهای استوانه ای و کروی و یا به عبارتی تبدیل انتگرالهای دکارتی به انتگرالهای استوانه ای و کروی می باشند.

تبدیل انتگرال دکارتی به انتگرال استوانه ای

تبدیل یک انتگرال دکارتی مانند $\iiint_D F(x, y, z) dx dy dz$ به یک انتگرال استوانه ای

دو مرحله دارد.

مرحله ۱. در انتگرال دکارتی جانشانیهای زیر را انجام می‌دهیم

$$dx dy dz = dz r dr d\theta, \quad x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$$

مرحله ۲. حدود z, r و θ را چنان تعیین می‌کنیم که تصویر G (ناحیه مشخص شده توسط این

حدود در دستگاه مختصات استوانه‌ای) تحت تبدیل

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

برابر ناحیه D در دستگاه مختصات دکارتی باشد. در این صورت داریم

$$\iiint_D F(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G F(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz r dr d\theta$$

تبدیل انتگرال دکارتی به انتگرال کروی

تبدیل یک انتگرال دکارتی مانند $\iiint_D F(x, y, z) dx dy dz$ به یک انتگرال کروی دو مرحله دارد.

مرحله ۱. در انتگرال دکارتی جانشانیهای زیر را انجام می‌دهیم

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi$$

$$dx dy dz = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

مرحله ۲. حدود ρ, ϕ و θ را چنان تعیین می‌کنیم که تصویر G (ناحیه مشخص شده در

دستگاه مختصات کروی) تحت تبدیل

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi$$

برابر ناحیه D در دستگاه مختصات دکارتی باشد. در این صورت داریم

$$\iiint_D F(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G H(\rho, \phi, \theta) \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

که

$$H(\rho, \phi, \theta) = F(\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi)$$

انتگرال دوگانه روی بیضی‌ها (مختصات بیضوی)

برای محاسبه $\iint_D f(x, y) dA$ که در آن D بیضی $\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1$ است از تغییر متغیر

$$dA = ab r dr d\theta \quad x - \alpha = ar \cos \theta, \quad y - \beta = br \sin \theta$$

خواهد بود که خواهیم داشت:

$$\iint_D f(x,y) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 F(r,\theta) abr dr d\theta$$

سوال مقدار انتگرال $\iint_D x^2 dx dy$ که در آن D ناحیه محصور به بیضی $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ می باشد را حساب کنید؟ (ارشد عمران ۸۰ و ۸۲)

$$x - \alpha = ar \cos\theta \rightarrow x = ar \cos\theta \rightarrow x^2 = a^2 r^2 \cos^2\theta$$

$$y - \beta = br \sin\theta$$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \int_0^1 x^2 abr dr d\theta &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 a^2 r^2 \cos^2\theta abr dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 a^3 r^3 b \cos^2\theta dr d\theta \end{aligned}$$

بردار و هندسه تحلیلی

بسیاری از کمیتها دارای اندازه هستند هر یک از این کمیت ها را می توان توسط یک عدد حقیقی مشخص کرد. به عنوان مثال طول ، حجم ، قیمت ، سود ، جرم. این کمیت ها را اسکالر می نامیم.

کمیت های دیگری هستند که با یک عدد حقیقی مشخص نمی شوند این کمیتها علاوه بر اندازه ، جهتشان نیز مورد نیاز است. این پدیده ها را کمیت های برداری می نامند. به عنوان مثال سرعت یک جسم متحرک و نیروی وارد بر یک جسم.

بردار در صفحه

یک بردار به طور هندسی پاره خطی جهت دار است.

