

مشابه‌یابی برای مسائل فیزیکی: خم‌های کم‌ترین زمان و هم‌زمان

fatho@mail.cern.ch


امیرحسین فتح‌اللهی

چکیده: در این مقاله سعی می‌شود مثال‌هایی از یافتن و استفاده‌کردن از وجوه مشترک بین دو مسئله‌ی فیزیکی برای حل یک‌ی از آن مسائل بیان شود. به عنوان مثال، مسئله‌ی خم‌های کم‌ترین زمان و هم‌زمان با استفاده از روش مشابه‌یابی حل می‌شوند. هنر یافتن وجوه مشترک دو مسئله‌ی به‌ظاهر متفاوت مهارتی است که یک فیزیک‌پیشه در زندگی حرفه‌ای خود باید یاد بگیرد. یک دید پرورش‌یافته‌ی فیزیکی این قابلیت را دارد تا ورای جزئیات یا شلوغی‌های اطراف دو پدیده‌ی فیزیکی، وجوه مشترک آنها را پیدا کند. در این مقاله جنبه‌هایی از هنر مشابه‌یابی را یادآوری می‌کنیم. این کار را با ارائه‌ی دو نمونه، مسئله‌ی خم کم‌ترین زمان و مسئله‌ی خم هم‌زمان، انجام می‌دهیم. اما اول با یک مثال ساده‌تر شروع می‌کنیم [1].

مسئله: حلقه‌ی سبکی روی میله‌ی افقی بدون اصطکاک حرکت می‌کند. به این حلقه دو نخ وصل شده‌است. طول یکی از نخ‌ها L_A است. این نخ از روی قرقره‌ی ثابتی می‌گذرد و یک وزنه به جرم m_A از آن آویزان است. نخ دوم هم از روی قرقره‌ی ثابتی می‌گذرد و وزنه‌ای به جرم m_B از آن آویزان است. طول نخ دوم L_B است. قرقره‌ها، میله، و وزنه‌ها در یک صفحه‌ی عمودی‌اند، شکل ۱. وضعیت تعادل سیستم را بیابید.

در این مسئله‌ی مکانیک جای حلقه مورد سؤال است. یک دانش‌آموز دبیرستانی برای حل این مسئله هیچ مشکلی نخواهد داشت. (به شرط این که دانش‌آموز خیلی بدی نباشد!) زاویه‌ی نخ اول با راستای عمودی (در محل اتصال آن با حلقه) را θ_A و زاویه‌ی نخ دوم با راستای عمودی (در محل اتصال آن با حلقه) را θ_B می‌نامیم. با نوشتن قوانین تعادل برای حلقه و جرم‌ها به راحتی می‌توان رابطه‌ی بین θ_A و θ_B را پیدا کرد. سپس با استفاده از طول‌های ثابت مسئله مقدار این دو زاویه تعیین می‌شود. در این جا سعی می‌کنیم این مسئله را به روش دیگری حل کنیم، که تا حدی غیر معمول است. حالت تعادل حالتی است که انرژی پتانسیل را کمینه می‌کند. انرژی پتانسیل می‌شود

$$U = -m_A(L_A - l_A)g - m_B(h_0 + L_B - l_B)g$$




شکل ۱

$$= m_A l_A g + m_B l_B g + \text{ثابت} \quad (1)$$

در این جا قرقره‌ی اول را مبدأ پتانسیل گرفته‌ایم، h_0 اختلاف ارتفاع قرقره‌ی اول و دوم با هم است، و l_A و l_B فاصله‌ی حلقه از قرقره‌های به ترتیب اول و دوم اند. برای کمینه‌شدن پتانسیل باید مقدار غیر ثابت این عبارت کمینه شود. این کار با تنظیم دو مقدار مجهول l_A و l_B انجام می‌شود. حالا یک مسئله در فیزیک نور را یادآوری می‌کنیم. دو محیط A و B داریم که یک صفحه آن‌ها را از هم جدا می‌کند. نور می‌خواهد از جایی در محیط A به جایی در محیط B برود. بنا بر اصل کمترین زمان فرما، نور مسیری را انتخاب می‌کند که زمان طی آن کمینه باشد. اگر طول مسیر در محیط‌های A و B را به ترتیب l_A و l_B بنامیم، زمان طی مسیر می‌شود

$$t = \frac{l_B}{v_B} + \frac{l_A}{v_A} \quad (2)$$

v_A و v_B سرعت نور در به ترتیب محیط‌های A و B اند. این جا هم l_A و l_B فاصله‌ی دو نقطه‌ی ثابت از یک نقطه‌ی مجهول اند، که نقطه‌ی مجهول روی خط معینی است. جواب این مسئله‌ی فیزیک نور



شکل ۲

شناخته شده است و به آن قانون شکست نور می‌گویند:

$$\frac{\sin \theta_B}{\sin \theta_A} = \frac{v_B}{v_A} \quad (3)$$

با θ_B و θ_A زاویه‌ی مسیر نور در دو محیط با راستای عمود بر صفحه‌ی جداکننده‌ی دو محیط‌اند. با مقایسه‌ی دو رابطه‌ی (1) و (2) می‌بینیم عبارت زمان طی مسیر دقیقاً شبیه عبارت پتانسیل است. پس شرط کمینه‌شدن پتانسیل هم می‌شود

$$\frac{\sin \theta_B}{\sin \theta_A} = \frac{1/(m_B g)}{1/(m_A g)} = \frac{m_A}{m_B} \quad (4)$$

از راه تحلیل نیروها هم همین جواب به دست می‌آید. در این جا یک مسئله‌ی مکانیک را با مشابهت با یک مسئله‌ی نوری حل کردیم. حالا به مسئله‌های جالب‌تر خم کم‌ترین زمان و خم هم‌زمان می‌رسیم. مسئله‌ی خم کم‌ترین زمان: دو نقطه‌ی A و B در میدان گرانش یک‌نواخت روبه‌پایین را در نظر بگیرید. خمی را در نظر بگیرید که این دو نقطه را به هم وصل می‌کند و یک ذره بدون اصطکاک روی آن می‌لغزد و از نقطه‌ی بالایی به نقطه‌ی پایینی می‌رسد. برای کدام خم این زمان کمینه است؟

مبدأً مختصات را نقطه‌ی بالایی، محور x را افقی، و محور y را عمودی و روبه‌پایین می‌گیریم، شکل ۲. معادله‌ی این خم را با $y(x)$ نشان می‌دهیم. چون حرکت بدون اصطکاک است، از پایستگی انرژی می‌توان سرعت ذره را به دست آورد:

$$\frac{1}{2}mv^2(y) = mgy \Rightarrow v(y) = \sqrt{2gy} \quad (5)$$

زمان لازم برای طی یک طول بی‌نهایت کوچک ds روی خم می‌شود

$$dt = \frac{ds}{v(y)}, \quad ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + y'^2} dx, \quad \frac{dy}{dx} =: y' \quad (6)$$

پس زمان کل می‌شود

$$t = \int dt = \int_{x_A}^{x_B} \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2gy}} dx \quad (7)$$

با استفاده از حساب بردش‌ها، به‌سادگی می‌شود شرط کمینه‌شدن مقدار این انتگرال را به دست آورد؛ درست شبیه کاری که برای کمینه‌شدن کنش در مکانیک کلاسیک می‌کنیم. دوباره می‌خواهیم مسئله را از یک راه میان‌رُحل کنیم. چون مسئله‌ی ما یافتن خمی است که زمان را کمینه‌کند، بازاز دانسته‌های مان در فیزیک نور استفاده می‌کنیم؛ یعنی فرض می‌کنیم خم مورد نظر مسیر یک پرتوی نور است [2]. می‌دانیم نور برای این که یک مسیر خمیده بپیماید باید مرتباً شکسته شود. پس باید فرض کرد ضریب شکست محیطی که پرتوی نور در آن حرکت می‌کند، با افزایش y عوض می‌شود. برای یک لایه‌ی نازک (به ضخامت dy) در مسیر پرتوی نور قانون شکست را می‌نویسیم، شکل ۲:

$$\frac{\sin[\theta(y)]}{\sin[\theta(y + dy)]} = \frac{n(y + dy)}{n(y)} \quad (8)$$

θ زاویه‌ی پرتوی نور با راستای عمودی است. از رابطه‌ی بالا نتیجه می‌شود

$$n(y) \sin[\theta(y)] = \text{ثابت} \quad (9)$$

ضریب شکست برای مسئله‌ی ما می‌شود


$$n = \frac{c}{v(y)} = \frac{c}{\sqrt{2gy}} \quad (10)$$

از این‌جا، و با استفاده از

$$\sin[\theta(y)] = \frac{1}{\sqrt{1 + y'^2}} \quad (11)$$

نتیجه می‌شود

$$y(1 + y'^2) = a > 0 \quad (12)$$



شکل ۳

که در آن a ثابت است. جواب این معادله‌ی دیفرانسیل شناخته شده است [3]:

$$\begin{aligned} x(\beta) &= \frac{a}{2}(\beta - \sin \beta) \\ y(\beta) &= \frac{a}{2}(1 - \cos \beta) \end{aligned} \quad (13)$$

که معادله‌ی پارامتری یک چرخ‌زاد است. خواننده‌ی علاقه‌مند می‌تواند با استفاده از حسابِ وردش‌ها درستی این حل را بیازماید.

مسئله‌ی خم هم‌زمان: یک میدان گرانش یک‌نواخت روبره‌پایین در نظر بگیرید. کدام خم است که زمان لازم برای رسیدن یک ذره به پایین‌ترین نقطه‌ی آن مستقل از ارتفاع رهاکردن ذره است؟ حرکت را بدون اصطکاک فرض کنید.

محور x را افقی و محور y را عمودی و روبره‌بالا می‌گیریم، شکل ۳. فرض کنید ذره را از نقطه‌ی $(x_0 = x(y_0), y_0)$ رها کنیم. برای راحتی متغیر را y و تابع را x می‌گیریم. چنان‌که در مسئله‌ی قبل به دست آمد، زمان لازم برای طی مسافت بین دو نقطه می‌شود

$$t(y_0) = \int_0^{y_0} \sqrt{\frac{1+x'^2}{2g(y_0-y)}} dy, \quad x' := \frac{dx}{dy} \quad (14)$$

مسئله‌ی ما یافتن خمی است که برای آن زمان t مستقل از y_0 و برابر T باشد. یک روش حل این مسئله استفاده از تبدیل لاپلاس است [2]. در این‌جا می‌خواهیم روش دیگری بر اساس مشابه‌یابی معرفی کنیم.

حرکت رفت و برگشتی بی می‌شناسیم که دوره‌ی آن مستقل از دامنه‌ی نوسان است: نوسان‌گر هم‌آهنگ. پس کافی است در مسئله‌ی مان یک حرکت رفت و برگشتی پیدا کنیم. این کار، با گسترش خم بعد از مقدار کمینه‌اش به سادگی انجام می‌شود. قرینه‌ی خم نسبت به محور y را به دست می‌آوریم و آن را به خم اولیه می‌افزاییم. حرکت روی این خم جدید رفت و برگشتی است. برای این که از شباهت با نوسان‌گر هم‌آهنگ استفاده کنیم، باید شتاب حرکت در یک راستا را با شتاب یک نوسان‌گر هم‌آهنگ یکی بگیریم. این جهت را y می‌گیریم. معادلات حرکت می‌شود

$$\begin{aligned} N \cos \theta - mg &= m\ddot{y} \\ -N \sin \theta &= m\ddot{x} \end{aligned} \quad (15)$$

N نیروی عمود بر خم، و θ زاویه‌ی عمود بر خم با راستای عمودی است. داریم

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{1}{x'}, \quad \cos \theta = \frac{x'}{\sqrt{1+x'^2}}, \quad \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{1+x'^2}}, \\ \dot{x} &= x'\dot{y}, \quad \ddot{x} = x'\ddot{y} + x''\dot{y}^2 \end{aligned} \quad (16)$$

با حذف N خواهیم داشت

$$-x'x''\dot{y}^2 - x'^2\ddot{y} - g = \ddot{y} \quad (17)$$

حالا وقت آن است که شرط حرکت هم‌آهنگ را روی مؤلفه‌ی y اعمال کنیم:

$$\ddot{y} = -\alpha y + c \quad (18)$$

که در آن $\alpha = 4\pi^2/(2T)^2$ (دوره $2T$ است). c ثابتی است که به y_0 وابسته است. با انتگرال‌گیری از رابطه‌ی (18) داریم

$$\dot{y}^2 = \alpha(y_0^2 - y^2) - 2c(y_0 - y) \quad (19)$$

که در آن فرض شده $y(0) = y_0$, $\dot{y}(0) = 0$. هم‌چنین از آن‌جا که در $t = T$ ($y = 0$) سرعت عمودی صفر است $\alpha y_0 = 2c$. با ترکیب روابط (17) تا (19)،

$$\begin{aligned} -x'x''[\alpha(y_0^2 - y^2) - 2c(y_0 - y)] - x'^2(-\alpha y + c) - g &= -\alpha y + c \implies \\ -x'x''[\alpha(y_0^2 - y^2) - 2c(y_0 - y)] - (1+x'^2)(-\alpha y + c) &= g \implies \\ -\frac{d}{dy}\{(1+x'^2)[\alpha(y_0^2 - y^2) - 2c(y_0 - y)]\} &= 2g \end{aligned} \quad (20)$$

با انتگرال گیری نتیجه می شود

$$\begin{aligned}(1+x'^2)[\alpha(y_0^2-y^2)-2c(y_0-y)] &= 2g(y_0-y) \implies \\ (1+x'^2)(\alpha y + \alpha y_0 - 2c) &= 2g\end{aligned}\quad (21)$$

سرانجام، با جاگذاری $\alpha y_0 = 2c$ ،

$$y(1+x'^2) = \frac{2g}{\alpha} = \frac{2gT^2}{\pi^2} \quad (22)$$

که همان چیزی است که از حل مسئله با تبدیل لاپلاس به دست می آید. جواب این معادله دیفرانسیل منحنی چرخ زاد است [3]:

$$\begin{aligned}x(\beta) &= \frac{gT^2}{\pi^2}(\beta + \sin \beta) \\ y(\beta) &= \frac{gT^2}{\pi^2}(1 - \cos \beta)\end{aligned}\quad (23)$$

برای اطلاعات بیشتر در مورد سابقه تاریخی این مسئله ها می توانید به [4] مراجعه کنید.

مرجع ها

- [1] مثال ساده ای این مقاله و هم چنین راه حل مسئله ی خم کم ترین زمان از یکی از شماره های قدیمی مجله ی یکان گرفته شده است.
- [2] طرح و حل مسئله ی خم کم ترین زمان به روش نوری منتسب به یوهان برنوتی است.

[3] W. E. Boyce & R. C. DiPrima; "Elementary differential equations and boundary value problems", fifth edition (John Wiley and Sons Inc., 1992).

[4] S. Chandrasekhar; "The problem of the brachistochrone" in "Newton's Principia for the common reader", (Oxford University Press, 1996) 571-578.