

<p>نام درس: ریاضی نام دبیر: بیگی تاریخ امتحان: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت امتحان: ۸ صبح مدت امتحان: ۸۰ دقیقه</p>	<p>جمهوری اسلامی ایران اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۳ تهران دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه</p> <p></p>	<p>نام و نام خانوادگی: قطع و رشته: دهم ریاضی و تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: ۲</p>
۱	« سوالات »	۲
۱.۲۵	<p>متناهی یا نامتناهی بودن مجموعه های زیر را مشخص کنید.</p> <p>الف- مجموعه اعداد طبیعی ب- مجموعه شمارنده های طبیعی عدد ۳۶ پ- بازه <math>(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2})</math> ت- <math>A = \{x \in N \mid 1 &lt; x &lt; 2\}</math> ث- مجموعه ای مضرب های طبیعی عدد ۱۰۰</p>	۱
۰.۲۵	<p>اگر <math>A \subseteq B</math> مجموعه ای متناهی باشد، آنگاه <math>A</math> متناهی خواهد بود یا نامتناهی؟</p>	۲
۱.۵	<p>در یک کلاس ۳۱ نفری، تعداد ۱۴ نفر از دانش آموزان عضو گروه سرود و ۱۹ نفر از آنها عضو گروه تئاترند. اگر ۵ نفر از دانش آموزان این کلاس عضو هردو گروه باشند، مطلوبست:</p> <p>الف- تعداد دانش آموزانی که فقط عضو گروه سرودند. ب- تعداد دانش آموزانی که عضو هیچ یک از این دو گروه نیستند.</p>	۳
۲	<p>در یک الگوی خطی، جملات چهارم و دهم به ترتیب ۱۷ و ۴۱ می باشند، جمله‌ی عمومی الگو را بیابید.</p>	۴
۲	<p>جملات سوم و ششم یک دنباله‌ی هندسی به ترتیب ۱۲ و ۹۶ می باشند، دنباله را مشخص کنید (<math>a_1 = 9</math>).</p>	۵
۱.۵	<p>اگر <math>\tan \alpha = \frac{-4}{3}</math> و <math>\alpha</math> زاویه‌ای در ناحیه‌ی چهارم مثلثاتی باشد، نسبت های دیگر مثلثاتی زاویه‌ی <math>\alpha</math> را بدست آورید.</p>	۶
۲	<p>با فرض با معنی بودن هر کسر، درستی تساوی مقابل را بررسی کنید.</p> $\frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} = \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta}$	۷
۱.۵	<p>در شکل زیر معادله‌ی خط <math>\Delta</math> را بیابید.</p>	۸
۱	<p>مساحت متوازی الاضلاع شکل مقابل را بیابید.</p>	۹
۱.۵	<p>برای هر عدد رادیکالی زیر اگر حاصل آن یک عدد صحیح است. جواب را بنویسید در غیر این صورت دو عدد صحیح متواالی بنویسید که عدد رادیکالی موردنظر بین آنها باشد.</p> <p>(الف) <math>\sqrt[7]{400}</math> (ب) <math>\sqrt[5]{120}</math></p>	۱۰

۱		مقدار تقریبی عدد $\sqrt{10}$ را تا یک رقم اعشار بنویسید.	۱۱
۰.۵		یکی از علامت های $>$ یا $<$ را در <input type="radio"/> قرار دهید.	۱۲
	(الف) $(0.5)^2$ (ب) $\sqrt[3]{0.125}$		
۱.۷۵		با استفاده از اتحادها طرف دوم تساوی های زیر را بنویسید.	۱۳
	(الف) $(2y + 1)^3$ (ب) $(x - 1)(x^2 + x + 1)(x^2 + 1)$		
۱.۲۵		اگر $a \times b = 7$ و $a + b = 10$ آنگاه حاصل $a^3 + b^3$ را بیابید.	۱۴
۱	$\frac{1}{\sqrt[3]{x} - 2}$	خرج کسر مقابل را گویا کنید.	۱۵
۲۰		موفق و مؤید باشید <b>بیگی</b>	

نام درس: ریاضی نام دبیر: بیگی تاریخ امتحان: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت امتحان: ۸ صبح مدت امتحان: ۸۰ دقیقه	جمهوری اسلامی ایران اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره کی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۳ تهران دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه 	<b>پاسخ نامه سوالات</b>
--	---	-------------------------

ردیف	راهنمای تصحیح	ردیف
۱	الف-نامتناهی      ب-متناهی      پ-نمتناهی      ت-نماناھی      ث-نماناھی	
۲		متناهی
۳	$n(U) = ۳۱ \quad n(S) = ۱۴ \quad n(T) = ۱۹ \quad n(S \cap T) = ۵$ $n(\text{ فقط } S) = n(S) - n(S \cap T) = ۱۴ - ۵ = ۹$ $n(S \cup T) = n(S) + n(T) - n(S \cap T) = ۱۴ + ۱۹ - ۵ \rightarrow n(S \cup T) = ۲۸$ $n(\text{ هیچ گروه}) = n(U) - n(S \cup T) = ۳۱ - ۲۸ = ۳$	
۴	$C_۱ = ۱۷ \quad C_{۱.} = ۴۱ \quad C_n = an + b$ $\begin{cases} ۱۷ = ۱.a + b \\ ۴۱ = ۱.a + b \end{cases} \quad ۲۴ = ۵a \quad a = ۴ \quad b = ۱ \quad C_n = ۴a + ۱$	
۵	$a_۱ = ۹۶ \quad a_۲ = ۱۲ \quad a_۱, q = ?$ $۹۶ = a_۱ q^۱ \quad ۱۲ = a_۱ q^۰ \quad \lambda = q^۱ \rightarrow q = ۲ \rightarrow a_۱ = ۳$	
۶	$\tan \alpha = \frac{-۴}{۳}$ ربع چهارم $\cos^۱ \alpha = \frac{۱}{۱ + \tan^۱ \alpha} = \frac{۱}{۱ + \frac{۹}{۱۶}} = \frac{۱}{\frac{۲۵}{۱۶}} = \frac{۱۶}{۲۵} = \frac{۹}{۲۵} \rightarrow \cos \alpha = \pm \frac{۳}{۵} \rightarrow \cos \alpha = \frac{۳}{۵}$ $\sin^۱ \alpha = ۱ - \cos^۱ \alpha = ۱ - \frac{۹}{۲۵} = \frac{۱۶}{۲۵} \rightarrow \sin \alpha = \pm \frac{۴}{۵} \rightarrow \sin \alpha = \frac{-۴}{۵}$ $\cot \alpha = \frac{۱}{\tan \alpha} = \frac{۱}{\frac{-۴}{۳}} = -\frac{۳}{۴}$	
۷	$\frac{\cos \theta}{۱ + \sin \theta} = \frac{۱ - \sin \theta}{\cos \theta}$ $\text{طرف اول: } \frac{\cos \theta}{۱ + \sin \theta} \times \frac{۱ - \sin \theta}{۱ - \sin \theta} = \frac{\cos \theta.(۱ - \sin \theta)}{۱ - \sin^۲ \theta} = \frac{\cos \theta.(۱ - \sin \theta)}{\cos^۲ \theta} = \frac{۱ - \sin \theta}{\cos \theta} = \text{طرف دوم}$	
۸	$\alpha = ۳۰^\circ \rightarrow \beta = ۶۰^\circ \rightarrow \alpha = ۱۲۰^\circ$ $m = \tan \alpha = \tan ۱۲۰^\circ = -\tan ۶۰^\circ = -\sqrt{۳}, (-۲, ۰)$ $y - y_۱ = m(x - x_۱) \rightarrow y - \cdot = -\sqrt{۳}(x + ۲) \rightarrow$ $y = -\sqrt{۳}x - ۲\sqrt{۳}$	
۹	 $AB = DC = ۱$ $S = AB \times AD \times \sin ۶۰^\circ \rightarrow S = ۱ \times ۱\sqrt{۳} \times \frac{\sqrt{۳}}{۲} \rightarrow S = ۱\sqrt{۳}$	

۱۰

$$\sqrt[5]{400} : 3^5 < 400 < 4^5 \rightarrow 3 < \sqrt[5]{400} < 4$$

$$-\sqrt[5]{120} : 3^4 < 120 < 4^4 \rightarrow 3 < \sqrt[5]{120} < 4 \rightarrow -4 < -\sqrt[5]{120} < -3$$

۱۱

$$\sqrt{10} : 3^2 < 10 < 4^2 \rightarrow 3 < \sqrt{10} < 4$$

عدد ۱۰ به عدد ۹ نزدیکتر است پس:

$$(3.1)^2 = 9.61, (3.2)^2 = 10.24 \rightarrow \sqrt{10} \cong 3.1$$

۱۲

$$(\cdot.5)^2 > (\cdot.5)^3$$

$$b - \sqrt[3]{0.125} < \sqrt[3]{0.125}$$

۱۳

$$a - (2y + 1)^3 = 8y^3 + 12y^2 + 6y + 1$$

$$b - (x - 1)(x^3 + x + 1)(x^3 - 1) = (x^3 - 1)(x^3 + 1) = x^6 - 1$$

۱۴

$$a + b = 10, a \times b = 7$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b) = 10^3 - 3(7)(10) = 1000 - 210 = 790.$$

۱۵

$$\frac{1}{\sqrt[3]{x} - 2} \times \frac{\sqrt[3]{x^2} + 4 + 2\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x^2} + 4 + 2\sqrt[3]{x}} = \frac{\sqrt[3]{x^2} + 4 + 2\sqrt[3]{x}}{x - 8}$$