


هندسه ۱


● فصل‌های ۱ و ۲



زاویه، مثلث

زاویه:

زاویه، جزئی از صفحه است که دو نیم خط با مبدأ مشترک و مجموعه‌ی نقاط محدود به دو نیم خط مزبور را شامل باشد.



هر یک از دو نیم خط Ox, Oy را یک "ضلع" و نقطه O ، مبدأ مشترک آنها، «رأس زاویه» نام دارد. زاویه را با واحدهای مختلف مانند درجه، گراد و رادیان نمایش می‌دهند که رابطه‌ی زیر را با هم دارند:

$$\frac{\text{deg}}{180} = \frac{\text{grad}}{200} = \frac{\text{rad}}{\pi}$$


تعاریف:

- ☆ دو زاویه را متمم یکدیگر گویند، هرگاه مجموع اندازه‌های آنها 90° باشد.
- ☆ دو زاویه را مکمل یکدیگر گویند، هرگاه مجموع اندازه‌های آنها 180° باشد.
- ☆ دو زاویه را که در رأس و یک ضلع مشترک باشند و دو ضلع غیرمشترک آنها در طرفین ضلع مشترک واقع باشد، مجاور می‌نامیم.



☆ خطی که از رأس زاویه گذشته و زاویه را نصف کند نیمساز زاویه نامیده می‌شود.

☆ دو زاویه را که رأس مشترک داشته باشند و اضلاع آنها دو به دو بر امتداد یکدیگر و در جهات مختلف باشند، متقابل به رأس نامند.





قضایا و خواص:

۱- دو زاویه‌ی متقابل به رأس مساویند و نیمسازهایشان بر یک خط مستقیم قرار دارند.


۲- اگر اضلاع دو زاویه، نظیر به نظیر با یکدیگر موازی باشند، دو زاویه یا مساوی یکدیگر هستند یا مکمل یکدیگر.



۳- اگر اضلاع دو زاویه، نظیر به نظیر بر یکدیگر عمود باشند، دو زاویه مساوی (اگر رأس زاویه‌ی دوم خارج از زاویه‌ی اول یا روی یکی از اضلاع آن باشد) و یا مکمل هستند. (اگر رأس زاویه دوم داخل زاویه اول باشد)



۴- اگر دو خط موازی توسط یک خط مورب قطع شوند، ۸ زاویه پدید می‌آید که یا مساوی و یا مکمل یکدیگر می‌باشند.




$$\hat{1} = \hat{3} = \hat{5} = \hat{7}$$

$$\hat{2} = \hat{4} = \hat{6} = \hat{8}$$

$$\hat{4} + \hat{5} = 180^\circ$$

$$\hat{3} + \hat{6} = 180^\circ$$

مثال: تفاضل دو زاویه مجاور 10° درجه است. اگر زاویه بین نیمسازهای آنها $\frac{3}{4}$ زاویه بزرگتر باشد، اندازه زاویه کوچکتر را بیابید.



کحل: اگر زاویه بزرگتر را X و زاویه کوچکتر را Y فرض کنیم، داریم:

$$\left. \begin{aligned} x - y &= 10 \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{2} &= \frac{3}{4}x \rightarrow x + y = \frac{3}{2}x \rightarrow \frac{x}{2} - y = 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow 2y - y = 10 \rightarrow y = 10$$

مثال: مجموع دو زاویه 75° است. مجموع مکمل‌های آنها چند درجه است؟

کحل:

$$\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 75^\circ$$

$$(180^\circ - \hat{\alpha}) + (180^\circ - \hat{\beta}) = 360^\circ - (\hat{\alpha} + \hat{\beta}) = 360^\circ - 75^\circ = 285^\circ$$

مثال: دو زاویه A و B متمم یکدیگر می‌باشند. اندازه زاویه A برابر $\frac{4}{9}$ اندازه مکمل زاویه B است. اندازه زاویه


A چند درجه است؟

کحل:

$$\left. \begin{aligned} \hat{A} + \hat{B} &= 90^\circ \\ \hat{A} &= \frac{4}{9}(180^\circ - \hat{B}) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{A} + \left(180^\circ - \frac{9}{4}\hat{A}\right) = 90^\circ \Rightarrow \frac{5}{4}\hat{A} = 90^\circ \Rightarrow \hat{A} = 72^\circ$$

مثال: زاویه XOY و نیمساز آن om را در نظر می‌گیریم، نیم خط OZ را به دلخواه در خارج زاویه رسم می‌کنیم، زاویه

moz برابر کدام است؟



$$\frac{x\hat{o}z + y\hat{o}z}{2} \quad (2)$$

$$\frac{m\hat{o}z + x\hat{o}z}{2} \quad (4)$$


$$\frac{x\hat{o}y}{2} \quad (1)$$

$$\frac{x\hat{o}z - y\hat{o}z}{2} \quad (3)$$


کحل:

$$\left. \begin{aligned} m\hat{o}z &= x\hat{o}z - x\hat{o}m \\ m\hat{o}z &= y\hat{o}z + y\hat{o}m \end{aligned} \right\} \Rightarrow x\hat{o}m = y\hat{o}m \Rightarrow m\hat{o}z = \frac{x\hat{o}z + y\hat{o}z}{2}$$

مثال: در شکل مقابل دو خط d و d' موازیند. اندازه زاویه α را بیابید.



کحل:



$$\left. \begin{aligned} d' \parallel d'' &\Rightarrow \hat{B}_2 = 40^\circ \\ d'' \parallel d'' &\Rightarrow \hat{A}_2 = \hat{B}_1 = 96^\circ - 40^\circ = 56^\circ \\ d \parallel d'' &\Rightarrow \hat{A}_1 = 52^\circ \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{A} = 56^\circ + 52^\circ = 108^\circ$$

مث:

اگر سه نقطه‌ی غیرواقع بر یک خط مستقیم را دو به دو با سه پاره‌خط به هم وصل کنیم، شکل حاصل را «مثلث» می‌نامند.

الف) تعاریف، قضایا و اصول کلی، خواص اضلاع و زوایا:

۱- حالات همنهشتی (تساوی) دو مثلث:

قضیه: دو مثلث در حالت‌های زیر با هم همنهشت (مساوی) اند:

- ۱- تساوی دو ضلع و زاویه بین دو ضلع (ض ز ض)
- ۲- تساوی دو زاویه و ضلع بین دو زاویه (ز ض ز)
- ۳- تساوی سه ضلع (ض ض ض)
- ۴- تساوی دو ضلع و زاویه مقابل به ضلع بزرگتر.

حالات همنهشتی مثلثهای خاص:

الف) دو مثلث قائم‌الزاویه در حالات زیر همنهشت‌اند:


- ۱- تساوی وتر و یک ضلع (حالت ۴).
- ۲- تساوی وتر و یک زاویه حاده (حالت ۲).
- ۳- تساوی دو ضلع زاویه‌ی قائمه (حالت ۱).

ب) دو مثلث متساوی‌الساقین در حالت تساوی یک ضلع و یک زاویه‌ی متناظر همنهشت‌اند.

ج) دو مثلث متساوی‌الاضلاع در حالت تساوی یک ضلع همنهشت‌اند.

مثال: اگر P نقطه‌ای دلخواه روی BC باشد، AC = CD و AB = BD، ثابت کنید: AP = PD


کحل:



$$\left. \begin{array}{l} \hat{B}_1 = \hat{B}_2 \\ \triangle ABC = \triangle BCD \rightarrow AB = BD \\ \text{BP مشترک} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{ض ز ض} \\ \Rightarrow \triangle ABP = \triangle BPD \Rightarrow AP = PD \end{array}$$

مثال: در شکل مقابل ثابت کنید: AB = CD


کحل:



$$\left. \begin{array}{l} \hat{B} = \hat{C} \\ \text{BC مشترک} \\ \hat{B}^* = \hat{C}^* \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{ز ض ز} \\ \Rightarrow \triangle ABC = \triangle DCB \rightarrow AB = CD \end{array}$$

مثال: در شکل روبه‌رو ثابت کنید: BC = DE


کحل:




$$\left. \begin{array}{l} AE = AC \\ AD = AB \\ \hat{A} \text{ مشترک} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{ض ض ض} \\ \Rightarrow \triangle ABC = \triangle ADE \rightarrow DE = BC \end{array}$$

مثال: ثابت کنید AB = CE و $\hat{C} = \hat{D}$

کحل:



$$\left. \begin{array}{l} BD = BC \rightarrow \hat{C}_1 = \hat{D}_1 \rightarrow \hat{C}_2 = \hat{D}_2 \\ AC = CD \\ BC = DE \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{ض ض ض} \\ \Rightarrow \triangle ABC = \triangle CDE \rightarrow \begin{cases} AB = CE \\ \hat{C} = \hat{D} \end{cases} \end{array}$$



مثال: دو دایره به مراکز A و B یکدیگر را در C و D قطع می کنند. ثابت کنید:

الف) $\hat{A}CB = \hat{A}DB$

ب) AB عمود منصف CD است.

کحل:

$$\left. \begin{array}{l} AC = AD \\ BC = BD \\ AB = AB \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta ABC = \Delta ADB \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \hat{A}_1 = \hat{A}_2 \\ AE = AE \\ AC = AD \\ \hat{A}CB = \hat{A}DB \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta ACE = \Delta ADE \rightarrow CE = ED$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} \hat{E}_1 = \hat{E}_2 \\ \hat{E}_1 + \hat{E}_2 = 180^\circ \end{array} \right\} \Rightarrow \hat{E}_1 = \hat{E}_2 = 90^\circ$$


مثال: ناحیه درون یک مثلث متساوی الاضلاع را به ۲، ۳، ۴ و ۶ قسمت همنهشت تقسیم کنید.

کحل:




۲- روابط زوایای مثلث:

قضیه: مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180° و مجموع زوایای خارجی آن 360° است و هر زاویه‌ی خارجی با مجموع دو زاویه‌ی داخلی غیرمجاورش برابر است.




$$\begin{aligned} \hat{A}_1 + \hat{B}_1 + \hat{C}_1 &= 180^\circ \\ \hat{A}_2 + \hat{B}_2 + \hat{C}_2 &= 360^\circ \\ \hat{A}_2 &= \hat{B}_1 + \hat{C}_1 \end{aligned}$$

مثال: در شکل‌های زیر زوایای مجهول را به دست آورید.




کحل:



$$\begin{aligned} 2(*+o) &= 180 \\ \Rightarrow x &= 180 - (*+o) = 90 \end{aligned}$$

مثال: در شکل زیر ثابت کنید: $\hat{x} + \hat{y} = \hat{B} + \hat{D}$

کحل:




$$\left. \begin{array}{l} \text{زاویه خارجی } y = \hat{D}_1 + \hat{B}_1 \\ \text{زاویه خارجی } x = \hat{D}_2 + \hat{B}_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \hat{x} + \hat{y} = \hat{B} + \hat{D}$$

مثال: زاویه‌های مثلثی متناسب با اعداد ۸، ۵ و ۲ می‌باشند. اندازه‌ی کوچکترین زاویه‌ی خارجی این مثلث چند درجه است؟
 که حل: وقتی می‌گویند سه عدد با سه عدد دیگر متناسبند، یعنی نسبت تقسیم دوه‌دوی آن‌ها مقدار یکسانی است:

$$\frac{x}{2} = \frac{y}{5} = \frac{z}{8} = k \rightarrow 2k + 5k + 8k = 180 \rightarrow k = \frac{180}{15} = 12 \Rightarrow \text{کوچکترین زاویه خارجی} = 2k + 5k = 84$$

مثال: در داخل مثلث ABC نقطه‌ی دلخواه O را به دو رأس C, B وصل می‌کنیم. اگر $\hat{C} = 30^\circ$ و $\hat{B} = 60^\circ$ باشد کدام رابطه صحیح است؟



$$90^\circ < \hat{B}OC < 150^\circ \quad (2)$$

$$30^\circ < \hat{B}OC < 90^\circ \quad (1)$$


$$90^\circ < \hat{B}OC < 180^\circ \quad (4)$$

$$120^\circ < \hat{B}OC < 180^\circ \quad (3)$$

که حل: همواره زاویه‌ی خارجی از هر زاویه‌ی داخلی غیرمجاور با خودش بزرگ‌تر است.

$$\hat{D}_1 > \hat{A} \quad (\text{زاویه خارجی})$$

$$\left. \begin{aligned} \hat{B}OC > \hat{A} = 90^\circ \\ \hat{B}OC + \hat{O}BC + \hat{O}CB = 180^\circ \Rightarrow \hat{B}OC < 180^\circ \end{aligned} \right\} \Rightarrow 180^\circ > \hat{B}OC > 90^\circ$$




$$\hat{B}OC > \hat{D}_1 \quad (\text{زاویه خارجی})$$

مثال: در شکل مقابل مجموع زوایای \hat{A} ، \hat{B} ، \hat{C} ، \hat{D} و \hat{E} کدام است؟

که حل:

روش اول:




$$\left. \begin{aligned} \hat{A} + \hat{E} + \hat{F} = 180^\circ \\ \hat{C} + \hat{G} + \hat{D} = 180^\circ \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{A} + \hat{C} + \hat{F} + \hat{G} + \hat{E} + \hat{D} = 360^\circ$$

$$\hat{B} + 180^\circ - \hat{F} + 180^\circ - \hat{G} = 180^\circ \Rightarrow \hat{B} = \hat{F} + \hat{G} - 180^\circ \Rightarrow$$

$$\hat{A} + \hat{C} + (\hat{B} + 180^\circ) + \hat{E} + \hat{D} = 360^\circ \Rightarrow \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} + \hat{E} = 180^\circ$$

روش دوم:



$$\left. \begin{aligned} \hat{F}_1 = \hat{A} + \hat{E} \\ \hat{G}_1 = \hat{C} + \hat{D} \\ \hat{F}_1 + \hat{G}_1 + \hat{B} = 180^\circ \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{A} + \hat{E} + \hat{C} + \hat{D} + \hat{B} = 180^\circ$$

مثال: در شکل مقابل زاویه‌ی $\hat{B}AC = 52^\circ$ ، مجموع دو زاویه‌ی D و E چند درجه است؟



که حل:

دو مثلث ABE و BCD طبق برابری دو ضلع و زاویه‌ی بین با هم برابرند.

پس $\hat{E} = \hat{B}_1$ و $\hat{A}_1 = \hat{D}$ می‌باشد. حال داریم:

$$\hat{A}BC: \hat{A} = 52^\circ \Rightarrow 2\alpha = 180^\circ - 52^\circ = 128^\circ \Rightarrow \alpha = 64^\circ$$


$$\Rightarrow \hat{D} + \hat{E} = \hat{D} + \hat{B}_1 = \hat{A}CB = \alpha = 64^\circ$$



۳- روابط طولی در مثلث:

الف) شرط وجود مثلث:

قضیه: در هر مثلث، هر ضلع از مجموع دو ضلع دیگر کوچکتر و از قدر مطلق تفاضل آنها بزرگتر است.



$$|a-b| < c < a+b$$

$$|a-c| < b < c+a$$

$$|b-c| < a < b+c$$

پس شرط لازم و کافی برای آن که سه عدد مثبت a ، b و c ، طول اضلاع یک مثلث باشند، آن است که هر سه نامساوی $a < b+c$ ، $b < a+c$ و $c < a+b$ برقرار باشد. ضمن آن که اگر c بزرگترین ضلع مثلث باشد، شرط لازم و کافی برای

وجود مثلث آن است که: $c < a+b$

مثال: اگر a ، b و c اضلاع مثلث ABC و $a \geq b \geq c$ باشد، آن گاه نشان دهید:

$$\frac{1}{3} (\text{محیط}) \leq \frac{1}{3} (\text{محیط}) < \frac{1}{2} (\text{محیط}) \leq \frac{1}{3} (\text{محیط}) < \frac{1}{2} (\text{محیط}) < \frac{1}{3} (\text{محیط})$$

که حل:

$$\left. \begin{array}{l} a \geq b \\ a \geq c \end{array} \right\} \rightarrow 2a \geq b+c \rightarrow 2a \geq a+b+c = \text{محیط} \rightarrow a \geq \frac{1}{3} (\text{محیط})$$

$$\text{محیط} < 2a \rightarrow a < \frac{1}{2} (\text{محیط})$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 < c \leq a \\ 0 < c \leq b \end{array} \right\} \rightarrow 0 < 2c \leq a+b \rightarrow 0 < 2c \leq a+b+c \rightarrow 0 < c \leq \frac{1}{3} (\text{محیط})$$

مثال: با کدام سه طول داده شده می توان مثلث ساخت؟ (a ، b مثبت اند)

$$(۲) \quad a+b, b+1, a+1$$

$$(۱) \quad a+b+1, b, a$$

$$(۴) \quad 3a, 2a, a-2$$

$$(۳) \quad 2a^2 + 3a + 1, (a+1)^2, a^2$$

که حل: باید اعداد در شرط وجود مثلث صدق کنند.

$$۱) \quad a+b+1 > a+b \quad \text{غ ق}$$

$$۲) \quad a+b < a+b+2, \quad 2a+b+1 > b+1, \quad 2b+a+1 > a+1 \Rightarrow \text{شرایط وجود مثلث را دارد پس قابل قبول است}$$

$$۳) \quad 2a^2 + 3a + 1 > (a+1)^2 + a^2 \quad \text{غ ق}$$

$$۴) \quad 3a > 2a + (a-2) \quad \text{غ ق}$$

مثال: تعداد مثلث هایی که اندازه های اضلاع آنها سه عدد طبیعی متوالی اند، کدام است؟


که حل: قضیه ی وجود مثلث را می نویسیم:

$$n+2 < (n+1) + n \rightarrow n > 1$$

برای $n > 1$ این نامساوی همواره برقرار است، در نتیجه بی شمار جواب داریم.

ب) قضیه پاره‌خط واصل بین وسط دو ضلع مثلث:


پاره‌خطی که وسط‌های دو ضلع مثلثی را به هم وصل می‌کند، با ضلع سوم موازی و نصف آن است.



$$MN \parallel BC, \quad MN = \frac{1}{2} BC$$


این پاره‌خط ارتفاع، میانہ و نیم‌ساز نظیر رأس A را نیز نصف می‌کند. به‌طور کلی پاره‌خط MN، مکان هندسی وسط‌های کلیه پاره‌خط‌هایی است که یک سر آن نقطه A و سر دیگر آن روی پاره‌خط BC است.

قضیه‌ی عکس: اگر از وسط ضلع مثلثی خطی موازی ضلعی دیگر رسم کنیم، ضلع سوم را نصف می‌کند و اندازه پاره‌خط حاصل نصف ضلع موازی آن خواهد بود.



نکته: با وصل کردن اوساط اضلاع هر مثلث به هم، مثلث به چهار مثلث هم‌نهشت (و در نتیجه هم‌مساحت) افزاز می‌شود.

مثال: در مثلث ABC اگر $AB = 12$ و $AC = 8$ و از نقطه M وسط ضلع BC خطی موازی با AB رسم کنیم تا



نیم‌ساز داخلی زاویه A را در نقطه N قطع کند اندازه MN کدام است؟


کحل: چون M وسط BC است، پس M' نیز وسط AC می‌باشد، لذا:

$$MM' = \frac{1}{2} AB = 6 \quad \Rightarrow \quad AM' = NM' = 4 \Rightarrow MN = 6 - 4 = 2$$

$$MM' \parallel AB \Rightarrow N = \hat{A}_1 = \hat{A}_2$$


مثال: یک مثلث را به چهار مثلث هم‌نهشت تقسیم کرده‌ایم. محیط مثلث اولیه چند برابر محیط یکی از مثلث‌های هم‌نهشت است؟

کحل: با توجه به این که اضلاع مثلث جدید نصف اضلاع مثلث اولیه‌اند، لذا: چون اضلاع نصف شده‌اند محیط اولیه ۲ برابر محیط ثانویه است.

**۴- روابط بین اضلاع و زوایا:**

قضیه تناظر اضلاع (با زوایا): در هر مثلث، زاویه بزرگتر متناظر به ضلع بزرگتر است

و بالعکس:



$$AC > AB \Leftrightarrow \hat{B} > \hat{C}$$

مثال: اگر BC بزرگترین ضلع مثلث ABC باشد، برای زاویه \hat{A} کدام حکم همواره درست است؟

(۱) منفرجه است. (۲) حاده است. (۳) قائمه است. (۴) بزرگتر از 60° است.

کحل: با استفاده از قضیه‌ی تناظر اضلاع با زوایا:

$$BC > AB \Rightarrow \hat{A} > \hat{C}$$

$$\Rightarrow 2\hat{A} > \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ - \hat{A} \Rightarrow 3\hat{A} > 180^\circ \Rightarrow \hat{A} > 60^\circ$$

$$BC > AC \Rightarrow \hat{A} > \hat{B}$$

مثال: اگر یکی از زوایای مثلث با اضلاع غیر مساوی، برابر 60° باشد ضلع مقابل به آن زاویه:

- (۱) کوچکترین ضلع مثلث است. (۲) بزرگترین ضلع مثلث است. (۳) ضلع متوسط مثلث است. (۴) با این اطلاعات قابل تعیین نیست.

که حل:


$$\left. \begin{aligned} \hat{A} &= 60^\circ \\ \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} &= 180^\circ \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{B} + \hat{C} = 120^\circ$$

با توجه به صورت سؤال $\hat{B} \neq \hat{C}$. پس یکی از این دو زاویه بزرگتر از 60° و دیگری کوچکتر از 60° است.

فرض می‌کنیم $\hat{C} < 60^\circ, \hat{B} > 60^\circ$ پس $\hat{C} < \hat{A} < \hat{B} \Rightarrow c < a < b$

مثال: در مثلث ABC نیمساز داخلی زاویه \hat{A} ضلع BC را در نقطه‌ی D قطع می‌کند. کدام نامساوی زیر همواره درست است؟

- (۱) $AB > BD$ (۲) $DA > DB$ (۳) $AB > AD$ (۴) $DB > DA$




$$\left. \begin{aligned} \hat{D} &= \hat{A}_2 + \hat{C} \Rightarrow \hat{D} > \hat{A}_2 \\ \hat{A}_2 &= \hat{A}_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{D} > \hat{A}_1 \Rightarrow AB > BD$$

که حل: همواره زاویه‌ی خارجی از دو زاویه‌ی داخلی غیرمجاور بزرگتر است:

مثال: در مثلث PAK نقطه‌ی M روی ضلع PK قرار دارد. اگر $AM = AK$ ، کدام همواره درست است؟

(۱) $AM > PM$ (۲) $AK > MK$

(۳) $AP > MK$ (۴) $AP > AK$



که حل: همواره زاویه‌ی خارجی از دو زاویه‌ی داخلی غیرمجاور بزرگتر است:

$$\left. \begin{aligned} \hat{M}_1 &> \hat{P} \text{ زاویه خارجی} \\ AM &= AK \Rightarrow \hat{M}_1 = \hat{K} \end{aligned} \right\} \rightarrow K > P \rightarrow AP > AK$$


ب) مساحت مثلث:

مساحت مثلث ABC برابر است با:

$$S = \frac{1}{2} ah_a = \frac{1}{2} bh_b = \frac{1}{2} ch_c \Rightarrow S = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} ab \sin C$$

نتیجه: بین مثلث‌هایی که دو ضلع ثابت دارند، مساحت مثلثی ماکزیمم است که قائم‌الزاویه باشد.

قضیه هرون: اگر p نصف محیط مثلث باشد، مساحت مثلث از رابطه روبه‌رو محاسبه می‌گردد: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$




مثال: در شکل زیر ۳ مربع به اضلاع ۳، ۴ و ۵ کنار هم قرار گرفته‌اند. مساحت

قسمت هاشورخورده چقدر است؟

که حل:

$$S = (25 + 16 + 9) - \left(\frac{12 \times 5}{2}\right) = 20$$


مثال: اگر $BM = 2MC$ و $DC = 2AD$ حاصل $\frac{S_{MDC}}{S_{ABC}}$ چقدر است؟



که حل:

$$\left. \begin{aligned} \frac{S_{AMC}}{S_{ABC}} &= \frac{1}{2} \\ \frac{S_{MCD}}{S_{AMC}} &= \frac{2}{4} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{S_{MCD}}{S_{ABC}} = \frac{1}{4}$$

مثال: در شکل مقابل، نسبت مساحت مثلث OBD به مساحت OCE کدام است؟




کحل: بنا بر عکس قضیه‌ی تالس چون $\frac{4}{5} = \frac{6}{7/5}$ است پس $DE \parallel BC$ است.

چون دو مثلث $\triangle BEC$ و $\triangle DBC$ دارای قاعده‌های برابر و ارتفاع‌های برابرند با حذف

مثلث مشترک $\triangle BOC$ خواهیم داشت:

$$S_{\triangle DBC} = S_{\triangle BEC} \Rightarrow S_{\triangle OBD} = S_{\triangle OCE} \Rightarrow \frac{S_{\triangle OBD}}{S_{\triangle OCE}} = 1$$

مثال: هر ضلع مثلث متساوی‌الاضلاع زیر، به نسبت‌های ۱ و ۳ تقسیم شده است. مساحت مثلث سایه‌زده چند برابر مساحت




مثلث متساوی‌الاضلاع است؟

کحل:

چون اضلاع مثلث به نسبت‌های یکسان تقسیم شده‌اند. مثلث هاشور خورده هم متساوی‌الاضلاع است که البته این موضوع

با توجه به قضیه‌ی کسینوس‌ها نیز قابل تحقیق است.




$$S_{ABC} = \frac{1}{2} a \times a \times \sin 60^\circ = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$S_{MCN} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} a \times \frac{1}{4} a \times \sin 60^\circ = \frac{3}{16} S_{ABC}$$

$$\rightarrow S_{MNP} = S_{ABC} - 3S_{MCN} = (1 - 3 \times \frac{3}{16}) S_{ABC} = \frac{7}{16} S_{ABC}$$

مثال: در خارج یک مربع به ضلع ۲ واحد بر روی هر دو ضلع مجاور آن، مثلث متساوی‌الاضلاع ساخته شده است. مساحت

مثلث ABC کدام است؟




۴ (۴)

۲ + √۳ (۳)

۲√۳ (۲)

۱ + √۳ (۱)

کحل:



$$S_1 = \frac{2^2 \sqrt{3}}{4} = \sqrt{3}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \sin 150^\circ = 1$$

$$S_{ABC} = S_1 + 2S_2 = \sqrt{3} + 2$$

مثال: در مثلثی به اضلاع ۵، ۶ و ۷، طول ارتفاع وارد بر ضلع به طول ۶ کدام است؟

$$2p = 18 \Rightarrow p = 9$$

کحل:

با استفاده از فرمول هرون:

$$s = \sqrt{9(9-5)(9-6)(9-7)} = \sqrt{9 \times 4 \times 3 \times 2} = 6\sqrt{6}$$

$$\frac{1}{2} \times 6 \times h = 6\sqrt{6} \Rightarrow h = 2\sqrt{6}$$


مثال: اگر یک راس مثلثی مرکز دایره‌ای به شعاع ۶ و دو راس دیگرش روی این دایره باشند، بیشترین مساحت این مثلث کدام است؟
 که حل:

$$S = \frac{1}{2} R \times R \sin \theta = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 \sin \theta = 18 \sin \theta$$

ماکزیم مساحت هنگامی است که $\sin \theta = 1$ باشد پس $S_{\max} = 18$

ه) قضیه‌ی سینوس‌ها و کسینوس‌ها:

دو رابطه بسیار مهم زیر در مثلث برقرارند:



$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}} = 2R$$

رابطه سینوس‌ها شعاع دایره محیطی: R

$$\begin{cases} a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A} \\ b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{B} \\ c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C} \end{cases}$$

رابطه کسینوس‌ها

مثال: در مثلثی داریم $a \neq b = c$ و $a = 6$. اگر شعاع دایره‌ی محیطی این مثلث $2\sqrt{3}$ باشد، اندازه‌ی b کدام است؟

که حل: با استفاده از قضیه‌ی سینوس‌ها:

$$\frac{a}{\sin A} = 2R = 4\sqrt{3} \Rightarrow \frac{6}{\sin A} = 4\sqrt{3} \Rightarrow \sin A = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

چون $a = b$ می‌شود غیر قابل قبول است $\hat{A} = 60^\circ$

یا

$$\hat{A} = 120^\circ \Rightarrow \hat{B} = \hat{C} = 30^\circ \Rightarrow \frac{b}{\sin B} = 2R \Rightarrow b = 4\sqrt{3} \sin 30^\circ = 2\sqrt{3}$$

مثال: اگر در مثلثی رابطه‌ی $b^2 + c^2 = a^2(b+c)$ برقرار باشد، مقدار زاویه‌ی \hat{A} کدام است؟

که حل:

$$b^2 + c^2 = a^2(b+c) \Rightarrow a^2 = \frac{(b^2 + c^2 - bc)(b+c)}{(b+c)} = b^2 + c^2 - bc$$

با استفاده از قضیه‌ی کسینوس‌ها و مقایسه‌ی آن با رابطه‌ی گفته شده:

$$\left. \begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - bc \\ a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \end{aligned} \right\} \Rightarrow 2 \cos A = 1 \Rightarrow \cos A = \frac{1}{2} \Rightarrow \hat{A} = 60^\circ$$

(د) قضیه‌ی فیثاغورس:

در هر مثلث $\triangle ABC$ داریم:

$$\hat{A} > 90 \Leftrightarrow a^2 > b^2 + c^2$$

$$\hat{A} = 90 \Leftrightarrow a^2 = b^2 + c^2$$


$$\hat{A} < 90 \Leftrightarrow a^2 < b^2 + c^2$$

قضیه فیثاغورس:

که مورد اول و سوم هم بر اساس قضیه‌ی کسینوس‌ها و هم بر اساس قضیه‌ی لولا قابل اثبات است.

نکته: اعداد فیثاغورسی معروف عبارتند از:

$$(3, 4, 5) - (5, 12, 13) - (7, 24, 25) - (8, 15, 17) - (9, 40, 41) - (12, 35, 37) - (20, 21, 29)$$



مثال: اگر از یک نقطه‌ی دلخواه داخل مثلث، سه عمود بر اضلاع رسم کنیم.

نشان دهید بین قطعات حاصل رابطه زیر برقرار است:

$$x^2 + y^2 + z^2 = m^2 + n^2 + k^2$$

حـل: با نوشتن قضیه‌ی فیثاغورس در مثلث‌های قائم‌الزاویه‌ای که وترشان مشترک است، داریم:

$$\left. \begin{aligned} \alpha^2 + z^2 &= \beta^2 + n^2 \\ \alpha^2 + k^2 &= x^2 + \gamma^2 \\ \beta^2 + y^2 &= \gamma^2 + m^2 \end{aligned} \right\} \rightarrow m^2 + n^2 + k^2 + (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) = x^2 + y^2 + z^2 + (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)$$

$$\rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = m^2 + n^2 + k^2$$

مثال: در مثلث $\triangle ABC$ اگر $b=5$ ، $c=12$ و $\hat{A} < 90^\circ$ باشد، برای ضلع a کدام گزاره درست است؟


- (۱) $13 < a < 17$ (۲) $7 < a < 13$ (۳) $7 < a < 17$ (۴) $a < 13$

حـل:

$$\left. \begin{aligned} A < 90 \Rightarrow a^2 < b^2 + c^2 \Rightarrow a^2 < 169 \Rightarrow a < 13 \\ |b - c| < a < b + c \Rightarrow 7 < a < 17 \end{aligned} \right\} \Rightarrow 7 < a < 13$$

مثال: در شکل زیر $ABCD$ و $EFGD$ مربع هستند. مساحت مربع $EFGD$ را بیابید.

حـل: اگر قطر مربع $ABCD$ را یک‌بار بر اساس قطر مربع $EDGF$ و بار دیگر با توجه به ضلع بنویسیم، خواهیم داشت:



$$x + x\sqrt{2} = (2 + \sqrt{2})\sqrt{2} = 2\sqrt{2} + 2$$

$$x(1 + \sqrt{2}) = 2(\sqrt{2} + 1) \rightarrow x = 2$$


$$\rightarrow S_{EFGD} = x^2 = 4$$

نکته: در هر مثلث قائم‌الزاویه‌ی متساوی‌الساقین به ساق a ، وتر $a\sqrt{2}$ است.


مثال: در شکل مقابل $ABCD$ مربع به ضلع a است. $\frac{x}{a}$ را بیابید.

حـل: با نوشتن قضیه‌ی فیثاغورس در مثلث AOH ، داریم:

$$(a-x)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = x^2 \rightarrow x^2 + a^2 - 2ax + \frac{a^2}{4} = x^2 \rightarrow 2ax = \frac{5a^2}{4} \rightarrow x = \frac{5a}{8} \rightarrow \frac{x}{a} = \frac{5}{8}$$



مثال: در شکل زیر رأس‌های هر مربع اوساط اضلاع مربع دیگر است. اگر طول ضلع مربع ABCD برابر با ۸ باشد، طول ضلع مربع A'B'C'D' را بیابید.



کحل: چون وتر مثلث قائم‌الزاویه‌ی متساوی‌الساقینی به ساق a ، $a\sqrt{2}$ است، لذا چون ضلع

نصف می‌شود ضلع مربع جدید $\frac{\sqrt{2}}{2}$ برابر ضلع مربع قبلی است.

$$\rightarrow 8 \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 8 \times \left(\frac{2\sqrt{2}}{8}\right) = 2\sqrt{2}$$

مثال: اگر در مثلثی رابطه $a^n = b^n + c^n$ برقرار باشد، ($n > 2$) آن‌گاه کدام صحیح است؟

- (۱) $\hat{A} > 90^\circ$ (۲) $60^\circ < \hat{A} < 90^\circ$ (۳) $\hat{A} < 60^\circ$ (۴) $\hat{A} < 45^\circ$

کحل:

$$a^n = b^n + c^n \rightarrow a^n > b^n \rightarrow a > b \rightarrow \frac{b}{a} < 1$$

$$a^n > c^n \rightarrow a > c \rightarrow \frac{c}{a} < 1$$

چون a بزرگ‌ترین ضلع است و قبلاً گفتیم، زاویه‌ی مقابل به بزرگ‌ترین ضلع حتماً بزرگ‌تر از 60° است، پس $\hat{A} > 60^\circ$


$$a^2 a^{n-2} = b^2 b^{n-2} + c^2 c^{n-2} \rightarrow a^2 = b^2 \left(\frac{b}{a}\right)^{n-2} + c^2 \left(\frac{c}{a}\right)^{n-2} < b^2 + c^2 \rightarrow \hat{A} < 90^\circ$$

مثال: یک متوازی‌الاضلاع از یک مربع و دو مثلث قائم‌الزاویه‌ی مساوی هم تشکیل شده است. اگر مساحت مربع و یک مثلث قائم‌الزاویه به ترتیب ۶۴ و ۲۴ واحد مربع باشند، محیط متوازی‌الاضلاع کدام است؟

- (۱) ۳۲ (۲) ۳۶ (۳) ۴۸ (۴) ۵۴

$$a^2 = 64 \Rightarrow a = 8$$

کحل:



$$\frac{ba}{2} = 24 \Rightarrow ab = 48 \Rightarrow b = 6$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = 10$$

$$\Rightarrow \text{محیط} = 2(a + b + c) = 2(8 + 6 + 10) = 48$$

مثال: در مربعی به ضلع a ، کوچک‌ترین مربع ممکن را به طریقی محاط می‌کنیم که هر رأس مربع بر روی ضلع مربع اصلی قرار گیرد. نسبت ضلع این مربع به ضلع مربع اصلی کدام است؟


- (۱) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (۲) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (۳) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۴) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

کحل:

برای آن‌که ضلع مربع کوچک‌ترین مقدار ممکن باشد، باید رأس مربع کوچک‌تر وسط

ضلع مربع بزرگ‌تر قرار گیرد که در این صورت:

$$x = \frac{a}{2}\sqrt{2} \Rightarrow \frac{x}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$




$$\begin{cases} z^2 = x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy = a^2 - 2xy \\ x+y = a \end{cases}$$

اثبات:

چون جمع دو متغیر مقدار ثابتی است، ضرب آن‌ها زمانی ماکسیمم است که با هم برابر

$$\Rightarrow x = y = \frac{a}{2} \quad \text{باشند (که در این صورت } z \text{ مینیمم می‌شود).}$$



مثال: در یک مثلث قائم الزاویه، طول اضلاع قائم به نسبت ۱ و ۳ و مساحت ۶۰ واحد مربع است. ارتفاع وارد بر وتر چقدر است؟


۸ (۴)

۶ (۳)

۴√۲ (۲)

۵ (۱)

کحل:




$$S_{ABC} = \frac{k \times 3k}{2} = 60 \Rightarrow k^2 = 40 \Rightarrow k = 2\sqrt{10}$$

$$h \times \sqrt{10}k = k \times 3k \Rightarrow h = \frac{3}{\sqrt{10}}k = \frac{3}{\sqrt{10}} \times 2\sqrt{10} = 6$$

۵) اجزای دیگر مثلث:

۱) میانه:


پاره‌خطی که یک سر آن رأس مثلث و سر دیگرش وسط ضلع مقابل آن رأس باشد، میانه‌ی نظیر آن رأس از مثلث نامیده می‌شود.



نکات:

۱- هر میانه‌ی مثلث مساحت آن را نصف می‌کند. یا به تعبیر دیگر، میانه مثلث را به دو مثلث معادل تقسیم می‌کند.

مثال: هر یک از اضلاع مثلث ABC را به اندازه‌ی خودش در یک جهت امتداد می‌دهیم تا مثلث MNP حاصل شود.




مساحت مثلث MNP چند برابر مساحت مثلث ABC است؟

کحل: اگر از C به M و از B به N و از A به P وصل کنیم، این خطوط در مثلث‌هایی که قرار دارند میانه‌اند، لذا مساحت را نصف می‌کنند، پس داریم:

$$\begin{cases} S_{\Delta ABC} = S_{\Delta ACM} = S_{\Delta MCN} \\ S_{\Delta ABC} = S_{\Delta ABP} = S_{\Delta MAP} \Rightarrow S_{\Delta MNP} = 7S_{\Delta ABC} \\ S_{\Delta ABC} = S_{\Delta BCN} = S_{\Delta PBN} \end{cases}$$

۲- سه میانه‌ی مثلث از یک نقطه می‌گذرند (همرسند) و در آن نقطه یکدیگر را به نسبت یک به دو تقسیم می‌کنند. این نقطه مرکز ثقل مثلث نیز می‌باشد.




$$\frac{GA'}{A'B'} = \frac{GB'}{B'C'} = \frac{GC'}{C'A'} = \frac{1}{2}$$

۳- سه میانه‌ی هر مثلث، آن مثلث را به شش مثلث هم‌مساحت (معادل) تقسیم می‌کنند.

$$S_{\Delta GBC} = S_{\Delta GAC} = S_{\Delta AGB} = \frac{1}{3}S_{\Delta ABC}$$

$$S_{\Delta AGM'} = S_{\Delta GM'C} = S_{\Delta GCM} = S_{\Delta MGB} = S_{\Delta BGM''} = S_{\Delta M''GA} = \frac{1}{6}S_{\Delta ABC}$$



مثال: در مثلث ABC نقطه G مرکز ثقل و نقطه E وسط AG می‌باشد. مساحت


مثلث AME چه کسری از مساحت مثلث ABC است؟

کحل: در مثلث AGM، EM میانه است. لذا:


$$S_{\Delta AME} = \frac{1}{2}S_{\Delta AGM}$$

$$\Rightarrow S_{\Delta AME} = \frac{1}{12}S_{\Delta ABC}$$

$$ABC \text{ مرکز ثقل مثلث } \Rightarrow S_{\Delta AGM} = \frac{1}{6}S_{\Delta ABC}$$



مثال: در چهار ضلعی ABCD، M، N، P و Q وسطهای اضلاع می باشند. مساحت




چهارضلعی AFCE چه کسری از مساحت چهارضلعی ABCD است؟

کحل: اگر قطر AC را رسم کنیم، دو مثلث تشکیل می شود که AN، CM، AP و CQ میانهای آن هستند، لذا با توجه به خاصیت گفته شده داریم:

$$S_{\triangle AEC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ACB} \Rightarrow S_{AFCE} = \frac{1}{3} S_{ABCD}$$

$$S_{\triangle AFC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ADC}$$

مثال: در شکل مقابل G مرکز مثلث، P وسط BG و Q وسط CG است. مساحت چهارضلعی MPGQ چه کسری از




مساحت مثلث ABC است؟

کحل:


$$S_{PGQM} = S_{PGM} + S_{GQM} = \frac{S}{12} + \frac{S}{12} = \frac{S}{6}$$

مثال: در شکل مقابل نقاط M و N وسط دو ضلع هستند. مساحت بزرگترین مثلث، چند برابر مساحت مثلث سایه زده است؟




کحل:

می دانیم در هر مثلث با رسم سه میانه، ۶ مثلث هم مساحت ایجاد می شود. هم چنین در هر مثلث با وصل کردن وسط اضلاع، ۴ مثلث هم نهشت و در نتیجه هم مساحت ایجاد می شود.



$$S_{\triangle MNP} = \frac{1}{4} S_{\triangle ABC}, S_{\triangle MNO} = \frac{2}{6} S_{\triangle MNP} = \frac{1}{12} S_{\triangle ABC}$$

مثال: در شکل مقابل، دو مربع مساوی کنار هم قرار دارند. مساحت ناحیه ی سایه زده چند برابر مساحت یک مربع است؟



$$\frac{1}{6} \quad (۱)$$

$$\frac{1}{9} \quad (۲)$$


$$\frac{\sqrt{2}}{9} \quad (۴)$$

$$\frac{2}{9} \quad (۳)$$

کحل:

چون دو خط رسم شده برای مثلث حاصل میانه اند، لذا مساحت قسمت هاشور خورده $\frac{1}{6}$ مساحت مثلث است. مساحت مثلث نصف مجموع مساحت های دو مربع است، یعنی با مساحت یکی از مربع ها مساوی است. پس مساحت قسمت هاشور


خورده $\frac{1}{6}$ مساحت یک مربع است.



۴- دو رأس هر مثلث، از میانه ی نظیر رأس سوم به یک فاصله اند و به عکس اگر دو رأس مثلث از خطی که از رأس سوم می گذرد به یک فاصله باشند، آن خط میانه است. (آن خط نباید با ضلع سوم موازی باشد).


$$AM \Leftrightarrow BH = CH'$$

۵- نسبت فاصله های هر نقطه ی میانه از دو ضلع مجاور آن، برابر است با عکس نسبت آن دو ضلع:



$$\frac{DH}{DH'} = \frac{AC}{AB}$$

۲) نیمساز:



پاره‌خطی که به یک رأس از مثلث و ضلع مقابل آن محدود است و زاویه‌ی آن رأس را نصف می‌کند، نیمساز مثلث نامیده می‌شود. هر مثلث دارای سه نیمساز داخلی و سه نیمساز خارجی است. سه نیمساز داخلی از یک نقطه می‌گذرند.

نیمسازهای خارجی دو زاویه و نیمساز داخلی زاویه‌ی سوم نیز از یک نقطه می‌گذرند که آن نقطه نیز از سه ضلع مثلث به یک فاصله است و لذا می‌توان دایره‌ای بر یک ضلع و امتداد دو ضلع دیگر مثلث مماس کرد که آن نقطه (محل تلاقی نیمسازهای خارجی دو زاویه و نیمساز داخلی زاویه‌ی سوم) مرکز آن دایره می‌باشد. این دایره، دایره‌ی محاطی خارجی مثلث نام دارد. هر مثلث سه دایره‌ی محاطی خارجی دارد.

مثال: سه خط دایره‌دو متقاطع در یک صفحه مفروضند. چند نقطه در این صفحه می‌توان یافت که از هر سه خط مزبور به یک فاصله باشد؟

کحل:

سه خط یک مثلث می‌سازند و سه مرکز دایره‌ی محاطی خارجی و یک مرکز دایره محاطی داخلی از سه ضلع به یک فاصله‌اند، پس ۴ نقطه با این خاصیت وجود دارد.

مثال: محل تلاقی کدام دسته خط از دسته خط‌های زیر همواره داخل مثلث است؟

(۱) میانها و نیمسازهای داخلی

(۲) ارتفاع‌ها و میانها

(۳) ارتفاع‌ها و عمودمنصف‌ها

(۴) عمودمنصف‌ها و نیمسازها


کحل: تنها میانها و نیمسازهای داخلی تمام نقاطشان داخل مثلث می‌باشد، لذا محل تلاقیشان نیز داخل مثلث می‌باشد.

نکات:

۱- نیمساز زاویه‌ی داخلی هر رأس مثلث بر نیمساز زاویه‌ی خارجی همان رأس عمود است.

مثال: در مثلث ABC ، اگر طول نیمسازهای داخلی و خارجی زاویه‌ی A برابر باشند، $|\hat{B} - \hat{C}|$ کدام است؟

کحل:




با توجه به نکته‌ی فوق $A = 90^\circ$ و داریم $AD' = AD$ در نتیجه $\hat{D}' = \hat{D} = 45^\circ$

$$\left. \begin{aligned} \hat{B} &= 180^\circ - 45^\circ - \frac{\hat{A}}{2} \\ \hat{C} &= 45^\circ - \frac{\hat{A}}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow |\hat{B} - \hat{C}| = 90^\circ$$

مثال: هرگاه I مرکز دایره‌ی محاطی داخلی و I_a, I_b, I_c مراکز دایره‌ی محاطی خارجی مثلث ABC باشند، در مثلثی که

رئوسش I_a, I_b, I_c می‌باشد، I کدام است؟



(۱) مرکز ثقل

(۲) مرکز دایره‌ی محاطی داخلی


(۳) محل تلاقی سه ارتفاع

(۴) مرکز دایره‌ی محیطی

کحل:

چون IC نیمساز داخلی و $I_b I_a$ نیمساز خارجی رأس C است، لذا بر هم عمودند و به

دلیل مشابه $I_a A$ و $I_b B$ نیز ارتفاعند و I محل تلاقی ارتفاع‌ها است.




۲- زاویه‌ی بین دو نیمساز داخلی زوایای C, B در مثلث ABC مساوی $90^\circ + \frac{\hat{A}}{2}$ است.


۳- زاویه‌ی بین دو نیمساز خارجی زوایای C, B در مثلث ABC مساوی $90^\circ - \frac{\hat{A}}{2}$ است.

۴- زاویه‌ی بین نیمساز داخلی زاویه‌ی C و نیمساز خارجی زاویه‌ی B در مثلث ABC مساوی $\frac{\hat{A}}{2}$ است.

۵- در هر مثلث زاویه‌ی بین ارتفاع و نیمساز هر رأس برابر است با نصف قدر مطلق تفاضل زاویه‌های دو رأس دیگر.



$$\hat{HAD} = \frac{1}{2} |\hat{B} - \hat{C}|$$




۶- هر گاه از نقطه‌ی تلاقی نیمسازهای داخلی دو رأس یک مثلث، خطی موازی با ضلع واقع بین آن دو رأس رسم کنیم تا دو ضلع دیگر مثلث را قطع کند پاره‌خط پدید آمده برابر است با مجموع بخش‌های ایجاد شده روی دو ضلع مثلث که مجاور با دو رأس اولیه هستند.

$$DE = DB + EC$$

(۳) ارتفاع:

پاره‌خطی که یک سر آن بر رأس مثلث و سر دیگرش روی ضلع مقابل (یا امتداد آن) قرار دارد و بر آن ضلع عمود است، ارتفاع نظیر آن رأس مثلث نامیده می‌شود.



نکات:

۱- ارتفاع نظیر هر رأس در مثلث با ضلع کوچکتر، زاویه کمتری می‌سازد.

$$AB < AC \Rightarrow \hat{A}_1 < \hat{A}_2$$

مثال: در مثلث ABC ، $AC > AB$ ، میانه AM ، نیمساز AD و ارتفاع AH می‌باشد. کدام گزینه همواره صحیح است؟

(۱) AM بین AD و AH قرار دارد.

(۲) AD بین AM و AH قرار دارد.


(۳) AH بین AD و AM قرار دارد.

(۴) بسته به شکل مثلث هر سه حالت ممکن است.


کحل: با استفاده از قضیه‌ی تناظر بین اضلاع و زوایا داریم:

$$AC > AB \Rightarrow \hat{M}AC < \hat{M}AB \Rightarrow AD < AM$$

$$AC > AB \Rightarrow \hat{B} > \hat{C} \Rightarrow \hat{B}AH < \hat{H}AC \Rightarrow AH < AD$$



۲- در هر مثلث، نسبت اندازه‌ی هر دو ضلع برابر است با نسبت عکس ارتفاع‌های نظیر آن دو ضلع.




$$\frac{a}{c} = \frac{h_c}{h_a}$$

نتیجه: کلیه‌ی روابطی که در مورد اضلاع مثلث برقرار است، در مورد عکس ارتفاع‌های مثلث نیز برقرار است. مثلاً:

$$|b-c| < a < b+c \Rightarrow \left| \frac{1}{h_b} - \frac{1}{h_c} \right| < \frac{1}{h_a} < \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c}$$

مثال: اگر طول اضلاع مثلثی ۲، ۳ و ۳ سانتی‌متر باشد طول ارتفاع وارد بر ساق مثلث چقدر است؟



$$AH = \sqrt{3^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2} = 2\sqrt{2}$$

کحل: با استفاده از قضیه‌ی فیثاغورس:

با استفاده از تساوی مساحت‌ها از دو رابطه:

$$AH \times BC = BH' \times AC \Rightarrow BH' = \frac{2\sqrt{2} \times 2}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

مثال: اگر در مثلث ABC داشته باشیم: $\frac{a}{b} = \frac{h_a}{h_b}$ آن‌گاه مثلث ABC چگونه مثلثی است؟

(۱) قائم‌الزاویه (۲) متساوی‌الاضلاع (۳) متساوی‌الساقین (۴) نامشخص

کحل: با توجه به تساوی مساحت‌ها:

$$ah_a = bh_b \rightarrow \frac{b}{a} = \frac{h_a}{h_b} = \frac{a}{b} \rightarrow a = b$$

۲- اگر همه‌ی زوایای مثلثی حاده باشند، کلیه‌ی ارتفاع‌های مثلث داخل آن قرار می‌گیرند. اما اگر مثلثی یک زاویه‌ی منفرجه داشته باشد، ارتفاع‌های نظیر اضلاع آن زاویه بر امتداد اضلاع وارد می‌شوند. در مثلث قائم‌الزاویه هم ۲ تا از ارتفاع‌ها بر اضلاع منطبقند.

مثال: اگر در مثلث ABC زاویه‌ی $A = 92^\circ$ باشد، کدام یک از گزاره‌های زیر صحیح است؟

- (۱) نقطه‌ی تلاقی سه میانه خارج مثلث است. (۲) نقطه‌ی تلاقی سه نیمساز خارج مثلث است.
 (۳) نقطه‌ی تلاقی سه ارتفاع خارج مثلث است. (۴) نقطه‌ی تلاقی سه ارتفاع روی ضلع BC می‌باشد.


کحل: اگر در مثلثی یک زاویه منفرجه باشد، ارتفاع‌های نظیر اضلاع زاویه منفرجه در خارج مثلث بر امتداد آن اضلاع وارد می‌شوند.

۳- سه ارتفاع مثلث هم‌سند. **موسسه آموزشی فرهنگی**


۱۴ عمود منصف‌های مثلث:

خطی که در وسط هر ضلع مثلث بر آن عمود است، عمودمنصف مثلث نامیده می‌شود. مثلث دارای سه عمودمنصف است که از یک نقطه می‌گذرند که از سه رأس مثلث به یک فاصله است. لذا می‌توان از این سه نقطه یک دایره عبور داد که مرکز آن محل تلاقی سه عمودمنصف مثلث می‌باشد. این نقطه مرکز دایره‌ی محیطی مثلث است.


نکته: در مثلث حاده‌الزاویه سه عمود منصف در درون مثلث هم‌سند. در مثلث قائم‌الزاویه سه عمودمنصف در روی وتر هم‌سند و در مثلث منفرجه‌الزاویه سه عمودمنصف بیرون مثلث هم‌سند.



ABC حاده‌الزاویه



ABC قائم‌الزاویه




ABC منفرجه‌الزاویه

۹) فواید مثلث‌های قاص:


۱) مثلث متساوی‌الساقین:

مثلثی که دو ضلع برابر دارد متساوی‌الساقین نامیده می‌شود.




نکات:

۱- در هر مثلث متساوی‌الساقین دو زاویه مجاور به قاعده با هم مساویند و به عکس اگر دو زاویه‌ی مثلثی مساوی باشند آن مثلث متساوی‌الساقین است. مثال: در شکل‌های زیر متغیرها را بیابید.




کحل: با توجه به تساوی زوایای نظیر ساق در مثلث متساوی‌الساقین داریم:




مثال: در این شکل x کدام است؟

کحل:




با توجه به تساوی زوایای نظیر ساق در مثلث متساوی‌الساقین داریم:

$$\left. \begin{aligned} \alpha + \beta + x + 90^\circ \\ \alpha + \beta + x = 180^\circ \end{aligned} \right\} \Rightarrow x + 90^\circ + x = 180^\circ \rightarrow x = 45^\circ$$



مثال: اگر در مثلث متساوی‌الساقین ABC طول نیمساز داخلی B برابر طول قاعده‌ی BC باشد، زاویه‌ی AM را بیابید.

کحل: با توجه به خواص مثلث متساوی‌الساقین داریم:




$$\left. \begin{aligned} \hat{A} &= 180^\circ - 2\hat{C} \\ BD = BC &\Rightarrow \hat{C} = \hat{D}_1 \Rightarrow \hat{B}_1 = 180^\circ - 2\hat{C} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{A} = \hat{B}_1$$

$$\hat{A} + 2\hat{B} = 180^\circ \Rightarrow \hat{A} + 4\hat{B}_1 = 180^\circ \Rightarrow \hat{A} + 4\hat{A} = 180^\circ \Rightarrow 5\hat{A} = 180^\circ \Rightarrow \hat{A} = 36^\circ$$

مثال: یکی از زاویه‌های مثلث متساوی‌الساقین برابر ۱۰۰° است. نیمساز خارجی یکی از زوایا ضلع مقابل را با کدام زاویه قطع می‌کند؟

کحل: با توجه به خواص مثلث متساوی‌الساقین داریم:




$$\left. \begin{aligned} \hat{B} + \hat{C} &= 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ \\ \hat{B} &= \hat{C} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{B} = \hat{C} = 40^\circ$$

$$\left. \begin{aligned} \hat{A}_2 &= 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ \\ \hat{B}_2 &= \frac{1}{2}(180^\circ - 40^\circ) = 70^\circ \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{B}_2 + \hat{A}_2 = 70^\circ + 80^\circ = 150^\circ$$

$$\hat{D} = 180^\circ - (\hat{B}_2 + \hat{A}_2) = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$$

مثال: در مثلث متساوی الساقین ABC ($\hat{A} = 32^\circ, AB=AC$) قاعده BC را به اندازه‌ی ساق تا نقطه‌ی D امتداد می‌دهیم.


زاویه‌ی ADC چقدر است؟



کحل: با توجه به خواص مثلث متساوی الساقین داریم:

$$B = C_1 = 74 \Rightarrow C_2 = 180 - 74 = 106 \Rightarrow \hat{ADC} = \frac{180 - 106}{2} = 37$$


مثال: اگر در شکل زیر $BC=BD=AD$ و $\hat{C} = 20^\circ$ باشد، زاویه‌ی \hat{D} چند درجه است؟



کحل: همان‌طور که در یکی از مسائل قبل در حالت کلی نیز اثبات شد، داریم:

$$\hat{D}_1 = \hat{C} = 20 \rightarrow \hat{B}_1 = 40 \rightarrow \hat{A} = 40 \rightarrow \hat{D} = \hat{A} + \hat{C} = 60$$


مثال: در شکل مقابل دو مثلث کناری متساوی الساقین‌اند و زاویه $\hat{A} = 100^\circ$ ، دو خط d و d' با زاویه چند درجه



مقاطع‌اند؟

- (۱) ۲۰
- (۲) ۵۰
- (۳) ۴۵
- (۴) ۴۰

کحل:




$$180 - 2\beta + 180 - 2\alpha + A = 180$$

$$\Rightarrow 2(\alpha + \beta) - A = 180$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = \frac{180 + 100}{2} = 140$$

$$\theta = 180 - (\alpha + \beta) = 40$$


مثال: در شکل مقابل، یک مربع و یک لوزی با زاویه 60° درجه، در یک ضلع مشترک‌اند. بزرگترین زاویه متوازی‌الاضلاع



$ABCD$ چند درجه است؟

- (۱) ۱۰۰
- (۲) ۱۰۵
- (۳) ۱۲۰
- (۴) ۱۳۵

حل:



مثال: در مثلث ABC بر روی ضلع BC پاره خط‌های $BM=BA$ و $CN=CA$ را جدا می‌کنیم، اگر زاویه $\hat{A} = 72^\circ$

باشد، زاویه MAN چند درجه است؟


- (۱) ۵۴
- (۲) ۵۲
- (۳) ۴۸
- (۴) ۴۲

کحل:

$$\hat{MAN} = 180 - (\alpha + \beta)$$

$$\hat{B} + \hat{C} = 108 = 180 - 2\alpha + 180 - 2\beta = 360 - 2(\alpha + \beta)$$

$$\Rightarrow 180 - (\alpha + \beta) = 54 = \hat{MAN}$$




۲- در هر مثلث متساوی الساقین میانه‌های وارد بر ساق‌ها با هم و ارتفاعات وارد بر ساق‌ها با هم مساوی هستند و نیمسازهای زوایای مقابل به ساق‌ها نیز با هم مساوی هستند، عکس این مطالب نیز درست است.

۳- در مثلث متساوی الساقین نیمساز زاویه‌ی رأس، ارتفاع، میانه و عمود منصف وارد بر قاعده بر هم منطبق هستند و بالعکس. مثال: در مثلثی به طول اضلاع ۱۳، ۱۳ و ۱۰ واحد، فاصله‌ی نقطه‌ی تلاقی میانه‌ها از دورترین رأس آن کدام است؟

کحل:

در مثلث متساوی‌الاضلاع، محل تقاطع میانه‌ها روی ارتفاع وارد بر قاعده قرار دارد.



$$AH = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$$

چون میانه‌ها همدیگر را به نسبت ۱ به ۲ تقسیم می‌کنند داریم:

$$AG = \frac{2}{3} AH = 8$$

$$GH = \frac{1}{3} AH = 4$$

لذا بر اساس رابطه‌ی فیثاغورث داریم:

$$GH^2 + HC^2 = GC^2 \rightarrow 4^2 + 5^2 = GC^2 \Rightarrow GC = \sqrt{41}$$



که چون $6 < \sqrt{41} < 7$ است پس A دورترین رأس محسوب می‌شود:

$$AG = 8$$

البته می‌دانیم میانه‌ی وارد بر کوچک‌ترین ضلع، بزرگ‌ترین میانه است.

۴- مساحت مثلث متساوی‌الساقین با قاعده‌ی a و ساق b مساوی است با:

$$\frac{1}{2} a \sqrt{b^2 - \frac{a^2}{4}}$$



۵- هر گاه در مثلث ABC نیمساز خارجی رأس A با ضلع BC موازی باشد، $AB = AC$ است و بالعکس.

$$AD \parallel BC \Leftrightarrow AB = AC$$


۷) مثلث متساوی‌الاضلاع:

مثلثی که ۳ ضلع برابر داشته باشد، متساوی‌الاضلاع نام دارد.

نکات:


۱- تمام زوایای مثلث متساوی‌الاضلاع 60° است. لذا تمام ویژگی‌های مثلث متساوی‌الساقین درباره‌ی مثلث متساوی‌الاضلاع برقرار است. به اضافه آن‌که در مثلث متساوی‌الاضلاع، محل برخورد ارتفاع‌ها، میانه‌ها، نیمسازها و عمود منصف‌ها بر هم منطبق‌اند.

مثال: در شکل‌های زیر یک ضلع مثلث‌های متساوی‌الاضلاع بر یک ضلع مربع منطبق است. کلیه زوایا را به دست آورید.



کحل:

با توجه به زوایای مربع و مثلث متساوی الاضلاع و خواص مثلث متساوی الساقین می توانیم تمام زوایا را به دست آوریم .



$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

۲- در مثلث متساوی الاضلاع ABC، اگر طول هر ضلع برابر با a باشد اندازه ارتفاع نظیر هر رأس برابر است با

و مساحت مثلث $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ می باشد.

۳) مثلث قائم الزاویه:

مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد، قائم الزاویه نام دارد.

نکات:

۱- در هر مثلث قائم الزاویه میانه‌ی وارد بر وتر نصف وتر است و برعکس اگر در مثلثی میانه‌ی وارد بر یک ضلع، نصف آن ضلع باشد، آن مثلث در رأس روبه‌رو به آن ضلع قائم الزاویه است.

مثال: در مثلثی یکی از زوایا 30° و تفاضل دو زاویه دیگر نیز 30° می باشد. در صورتی که طول بزرگترین ضلع این مثلث ۸ باشد، طول میانه‌ی وارد بر این ضلع کدام است؟

کحل:

$$\left. \begin{aligned} \hat{B} = 30^\circ \Rightarrow \hat{A} + \hat{C} = 150^\circ \\ \hat{A} - \hat{C} = 30^\circ \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{C} = 60^\circ \Rightarrow \hat{A} = 90^\circ$$

لذا مثلث ABC قائم الزاویه است و بزرگترین ضلع آن وتر آن است و می دانیم میانه‌ی وارد بر وتر نصف وتر است، لذا:

$$AM = \frac{BC}{2} = 4$$

مثال: اگر در مثلث ABC میانه‌های اضلاع AB و AC بر هم عمود باشند، میانه‌ی BC برابر با کدام است؟

2BC (۴)

BC (۳)

$\frac{3}{2}BC$ (۲)



$\frac{1}{3}BC$ (۱)

کحل:

$$GM'' = \frac{1}{2}BC \rightarrow AM'' = \frac{3}{2}BC$$

در مثلث قائم الزاویه ($A = 90^\circ$):

$$m_b^2 + m_c^2 = 5m_a^2 = \frac{5}{4}a^2$$




مثال: اندازه‌ی دو ضلع قائم از مثلث قائم‌الزاویه‌ای ۸ و $2\sqrt{11}$ واحد است. فاصله‌ی نقطه‌ی تلاقی میانه‌ها از وسط وتر این مثلث کدام است؟

۳ (۴)

۲ (۳)

 $\sqrt{3}$ (۲) $\sqrt{2}$ (۱)

حل:




$$BC = \sqrt{4 \times 11 + 64} = \sqrt{108} = \sqrt{4 \times 27} = 6\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow AM = \frac{BC}{2} = 3\sqrt{3} \Rightarrow GM = \frac{1}{3} AM = \sqrt{3}$$

۲- در هر مثلث قائم‌الزاویه، ضلع مقابل به زاویه‌ی 30° نصف وتر است و بالعکس.

مثال: در یک مثلث متساوی‌الساقین ارتفاع وارد بر یک ساق نصف آن ساق است. زاویه‌ی بین این ارتفاع و ضلع BC کدام است؟


حل:



$$BH = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} AB \Rightarrow \hat{A} = 30^\circ \Rightarrow \hat{B} = \hat{C} = 75^\circ \Rightarrow \hat{B}_1 + \hat{C} = 90^\circ \Rightarrow \hat{B}_1 = 90^\circ - 75^\circ = 15^\circ$$

مثال: در مثلث متساوی‌الساقین ABC، زاویه‌ی رأس 120° و قاعده‌ی آن ۱۲ سانتی‌متر است. مجموع فواصل یک نقطه روی قاعده‌ی مثلث از دو ساق آن چقدر است؟

حل:



مجموع فواصل یک نقطه روی قاعده‌ی مثلث متساوی‌الساقین از دو ساق برابر است با ارتفاع وارد بر ساق:

$$BH = \frac{1}{2} BC = 6$$


۴- اگر در مثلث قائم‌الزاویه یک زاویه 15° باشد، ارتفاع وارد بر وتر ربع وتر است.

مثال: در مثلث ABC می‌دانیم: $\hat{B} - \hat{C} = 30^\circ$ می‌باشد، در این صورت فاصله‌ی نقطه‌ی H، پای ارتفاع AH، از نیمساز AD کدام است؟

$$(1) \frac{1}{3} AH \quad (2) \frac{1}{4} AD \quad (3) \frac{1}{3} AD \quad (4) \frac{1}{8} BC$$


حل: زاویه‌ی بین ارتفاع و میانه‌ی وارد بر وتر در مثلث قائم‌الزاویه برابر است با:

$$\hat{HAD} = \frac{1}{2} |\hat{B} - \hat{C}| = \frac{1}{2} \times 30^\circ = 15^\circ \Rightarrow HH' = \frac{1}{4} AD$$



فاصله‌ی H از نیمساز AD (ارتفاع مثلث AHD) وتر مثلث (AD) است.

۵- در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABC، پاره‌خط‌های AH، AD و AM به ترتیب ارتفاع، نیمساز و میانه‌ی وارد بر وتر BC هستند، در این صورت روابط زیر برقرارند:




$$\hat{A}_1 = \hat{A}_4 = \hat{C}$$

$$\hat{A}_2 = \hat{A}_3$$


$$\hat{A}_2 + \hat{A}_3 + \hat{A}_4 = \hat{B}$$

۶- در هر مثلث قائم الزاویه، زاویه بین ارتفاع و میانه‌ی وارد بر وتر برابر است با قدر مطلق تفاضل دو زاویه‌ی حاده مثلث.

$$H\hat{A}M = |\hat{B} - \hat{C}|$$



مثال: در مثلث قائم الزاویه‌ای، زاویه‌ی بین ارتفاع و میانه‌ی وارد بر وتر 26° است. کوچکترین زاویه‌ی مثلث چند درجه است؟
 کحل: طبق نکته‌ی فوق:




$$\left. \begin{aligned} |\hat{B} - \hat{C}| = 26^\circ \\ \hat{B} > \hat{C} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \hat{B} - \hat{C} = 26^\circ \\ \hat{B} + \hat{C} = 90^\circ \end{aligned} \Rightarrow 2\hat{C} = 90^\circ - 26^\circ \Rightarrow \hat{C} = 32^\circ$$

مثال: در مثلث قائم الزاویه‌ی ABC ($\hat{A} = 90^\circ$)، اندازه‌ی زاویه‌ی بین نیمساز و میانه‌ی نظیر رأس A کدام است؟

$$(1) \quad |\hat{B} - \hat{C}| \quad (2) \quad \frac{1}{2}|\hat{B} - \hat{C}| \quad (3) \quad \frac{1}{4}|\hat{B} - 2\hat{C}| \quad (4) \quad \frac{1}{4}|\hat{B} - \hat{C}|$$

کحل: زاویه‌ی بین ارتفاع و میانه‌ی وارد بر وتر در مثلث قائم الزاویه برابر است با:




$$H\hat{A}D = \frac{1}{2}|\hat{B} - \hat{C}|$$

$$\text{در مثلث قائم الزاویه } \hat{A}_2 = \hat{A}_3 \text{ لذا } \hat{D}A\hat{M} = \frac{1}{4}|\hat{B} - \hat{C}|$$

۷- اگر در یک مثلث قائم الزاویه، ارتفاع نظیر وتر رسم شود، سه مثلث متشابه به وجود می‌آید:

$$ABH \sim ACH \sim ABC$$



$$AB^2 = BH \times BC$$

$$AC^2 = CH \times BC$$

$$AH^2 = BH \times CH$$


لذا در مثلث قائم الزاویه داریم:

یعنی هر ضلع واسط هندسی بین طول تصور آن ضلع بر وتر و طول وتر مثلث می‌باشد. همچنین ارتفاع وارد بر وتر، میانگین هندسی دو قطعه‌ای است که آن ارتفاع بر روی وتر جدا می‌کند. (طریقه‌ی رسم میانگین هندسی)

تذکر: این روابط معکوس پذیر نمی‌باشند یعنی از برقرار بودن هیچ یک از روابط فوق در یک مثلث نمی‌توان نتیجه گرفت مثلث قائم الزاویه است.

مثال: مطابق شکل مقابل طول پاره خط BH برابر ۸ می‌باشد. در صورتی که وتر BC برابر ۱۰ باشد، ارتفاع وارد بر وتر BC و طول ضلع AB را بیابید.

کحل: با توجه به روابط گفته شده:




$$\left. \begin{aligned} BC = 10 \\ BH = 8 \end{aligned} \right\} \Rightarrow CH = 2 \quad AH^2 = BH \times CH = 8 \times 2 = 16 \Rightarrow AH = 4$$

$$AB^2 = BH \times BC \Rightarrow AB^2 = 8 \times 10 = 80 \Rightarrow AB = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$$

مثال: در مستطیل شکل مقابل $\hat{P} = 90^\circ$ و $3AP = BP = 9$ ، طول DP کدام است؟

کحل: اگر از P به CD عمود کنیم، قطعاتی که ارتفاع روی CD ایجاد می‌کند با AP و PB برابر است. لذا:




$$DP^2 = AP \times AB = 3 \times 12 = 36 \rightarrow DP = 6$$

مثال: در مثلث ABC ($\hat{A} = 90^\circ$) ارتفاع AH و میانه AM را رسم می‌کنیم. اگر HB و HC به ترتیب ۴ و ۹ واحد باشند،

مساحت مثلث AMH کدام است؟


کحل: با توجه به روابط گفته شده:



$$\left. \begin{aligned} AH^2 &= BH \times CH = 4 \times 9 \rightarrow AH = 6 \\ BM &= \frac{13}{2} = 6\frac{1}{2} \\ BH &= 4 \end{aligned} \right\} \rightarrow HM = 2\frac{1}{2} \rightarrow S = \frac{2\frac{1}{2} \times 6}{2} = 7\frac{1}{2}$$

مثال: در یک مثلث قائم‌الزاویه اندازه‌های میانه و ارتفاع وارد بر وتر به ترتیب ۳ و $2\sqrt{2}$ است. اندازه‌ی ضلع متوسط این مثلث کدام است؟

کحل: با توجه به روابط گفته شده:



$$\begin{aligned} AM &= 3 \rightarrow BC = 6 \\ HM &= \sqrt{AM^2 - AH^2} = \sqrt{9 - 8} = 1 \rightarrow BH = 2, CH = 4 \\ \rightarrow AC^2 &= CH \times BC = 4 \times 6 \rightarrow AC = 2\sqrt{6} \end{aligned}$$


مثال: در یک مستطیل به طول ۱۳ و عرض ۶ واحد، دایره‌ای به قطر طول مستطیل، ضلع مقابل آن را در دو نقطه M و N

قطع می‌کند. فاصله‌ی این دو نقطه چند واحد است؟

کحل: مثلث MBC در رأس M قائمه است (چون BC قطر دایره است و زاویه‌ی

محاطی روبه‌رو به قطر، 90° است). حال در مثلث قائم‌الزاویه ارتفاع وارد بر وتر،

واسطه‌ی هندسی بین دو قطعه‌ی ایجاد شده بر وتر است. بنابراین:



$$6^2 = x(13-x) \Rightarrow x^2 - 13x + 36 = 0 \Rightarrow (x-4)(x-9) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x=4 \\ x=9 \end{cases}$$


بنابراین قطعه‌ی کوچکتر یعنی $BH = 4$ می‌باشد و در نتیجه $AM = 4$ و به همین

ترتیب $ND = 4$. در نتیجه $MN = 13 - (4+4) = 5$.

مثال: در مثلث ABC ، $AC = \frac{\sqrt{5}}{2} AB$ ، $\hat{A} = 90^\circ$ و ارتفاع AH و میانه AM رسم شده‌اند. مساحت مثلث ABC چند

برابر مساحت مثلث AMH است؟

کحل: ارتفاع AH در هر دو مثلث ABC و AHM مشترک است، بنابراین



$$\frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta AHM}} = \frac{BC}{MH} \quad (*)$$

کافیست نسبت قاعده‌ها را حساب کنیم:

با فرض $AB = x$ و $BH = y$ داریم:


$$AB = x, AC = \frac{\sqrt{5}}{2}x \xrightarrow{\text{قضیه فیثاغورس در مثلث } ABC} BC^2 = AB^2 + AC^2 = x^2 + \left(\frac{\sqrt{5}}{2}x\right)^2 = \frac{9}{4}x^2$$

$$\Rightarrow BC = \frac{3}{2}x \xrightarrow{\text{میانه } AM \text{ در مثلث } ABC} BM = \frac{3}{4}x$$

می‌دانیم در هر مثلث قائم‌الزاویه، هر ضلع زاویه‌ی قائمه، واسطه‌ی هندسی بین وتر و تصویر همان ضلع روی وتر است، پس:

$$AB^2 = BC \cdot BH \Rightarrow x^2 = y \times \frac{3}{2}x \Rightarrow y = \frac{2}{3}x \Rightarrow MH = \frac{3}{4}x - \frac{2}{3}x = \frac{1}{12}x \Rightarrow \frac{BC}{MH} = \frac{\frac{3}{2}x}{\frac{1}{12}x} = 18$$

بر اساس رابطه‌ی (*)، می‌توان گفت که مساحت مثلث ABC ، ۱۸ برابر مساحت مثلث AMH است.



مثال: در بزرگ‌ترین مثلث قائم‌الزاویه مقابل، اندازه بزرگ‌ترین میانه کدام است؟


(۱) $\sqrt{50}$

(۲) $\sqrt{65}$

(۳) $\sqrt{70}$

کحل:

بزرگ‌ترین میانه نظیر کوچک‌ترین ضلع است.



$$h^2 = 4 \times 6 \Rightarrow h = 2\sqrt{6}$$

$$a = \sqrt{h^2 + 4^2} = \sqrt{24 + 16} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$

$$b = \sqrt{h^2 + 6^2} = \sqrt{24 + 36} = \sqrt{60} = 2\sqrt{15}$$

$$AM = \sqrt{b^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{60 + 10} = \sqrt{70}$$

مثال: در یک ذوزنقهی متساوی‌الساقین، قطر عمود بر ساق است. اگر اندازه‌ی قاعده‌ی بزرگ‌تر و قطر آن به ترتیب ۱۰ و ۸

واحد باشند، اندازه‌ی قاعده‌ی کوچک‌تر چند واحد است؟

(۱) $2/8$


(۲) $3/2$

(۳) $3/6$

(۴) $4/2$

(۱) $2/8$

کحل:



$$AB = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6$$

$$AB^2 = x \times 10 \Rightarrow x = \frac{36}{10} = 3/6$$

$$AD = 10 - 2x = 10 - 7/2 = 2/8$$

مؤسسه آموزشی فرهنگی