

با سمه تعالی

نام و نام خانوادگی :	رشته: ریاضی فیزیک	تعداد صفحه: ۱	مدت امتحان: ۱۵۰ دقیقه
ساعت شروع: ۸ صبح	دوره‌ی پیش‌دانشگاهی	تاریخ امتحان: ۱۳۹۶/۶/۸	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۳۹۶ مرکز سنجش آموزش و پژوهش <a href="http://ace.medu.ir">http://ace.medu.ir</a>			

سوالات (پاسخ نامه دارد)

ردیف

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) بلا مانع است.	
۱	جواب نامعادله $x^3 - 7x^2 + 10x < 0$ را به صورت بازه بنویسید سپس مرکز و شعاع بازه را مشخص کنید.
۲	جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید: الف) اگر برای هر عدد حقیقی $h$ مثبت داشته باشیم $h < x - 2 \leq 0$ مقدار $x$ برابر با ..... است ب) دنباله $\left\{ \frac{1}{n} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{3n} \right\}$ همگرا به عدد ..... است. ج) کوچکترین عضو کران بالای بازه $(-2, 6]$ برابر با ..... است
۳	دنباله $\left\{ (-1)^n \frac{n}{n+1} \right\}$ مفروض است یکنواختی و همگرا بود. این دنباله را بررسی کنید.
۴	با کمک حد دنباله ثابت کنید تابع $f(x) = \begin{cases} x+3 & x > 1 \\ 2x & x < 1 \end{cases}$ در $x=1$ حد ندارد.
۵	به کمک قضیه بولزانو ثابت کنید معادله $\sin x - x^3 + x + 1 = 0$ حداقل یک ریشه در بازه $[0, \pi]$ دارد.
۶	فرض کنید درآمد حاصل از تولید $x$ واحد از محصولی $R(x) = 0.1x^3 - 3x^2 + 1$ درآمد نهایی را در سطح تولید ۱۸۰۰ واحد حساب کنید.
۷	به کمک تعریف مشتق، مشتق‌پذیری تابع $f(x) = x x-1 $ در $x=1$ بررسی کنید.
۸	نقاطی از منحنی $y = \tan x$ را در بازه $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ چنان تعیین کنید که مماس بر منحنی با خط $y = 2x$ موازی باشد.
۹	معادله خط مماس بر منحنی $y = x^3 - x^2 - xy + y^2 - 1 = 0$ در نقطه $A(1, 1)$ واقع بر منحنی را بدست آورید.
۱۰	مشتق بگیرید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست). $y = \ln(x^2 + 4x)$ (الف) $y = \sqrt{x} e^{3x}$ (ب)
۱۱	نقاط بحرانی تابع $f(x) = \sqrt{3x+2}\cos x$ را روی بازه $[0, 2\pi]$ بدست آورید.
۱۲	اکسترمم‌های مطلق تابع $f(x) = x^4 - 2x^3 + 2$ را در بازه $[-2, 1]$ بدست آورید.
۱۳	جدول رفتار و نمودار تابع $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ رارسم کنید.
۱۴	الف) جمع $\sum_{j=1}^n \frac{j^2}{n^3}$ را بسط دهید. ب) جمع روی رو را با استفاده از نماد $\sum$ بنویسید.
۱۵	مقدار میانگین $f(x) = 2x + \sqrt{x}$ را بر بازه $[0, 9]$ بدست آورید.
۱۶	حاصل انتگرال نامعین $\int (\sin 2x + \frac{1}{x} + e^{5x}) dx$ را بیابید.
۲۰	مجموع نمره موفق باشید

با اسمه تعالی

مدت امتحان: ۱۵۰ دقیقه	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: حساب دیفرانسیل و انتگرال
تاریخ امتحان: ۱۳۹۶/۶/۸	پیش‌دانشگاهی	
مرکز سنجش آموزش و پژوهش <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۳۹۶	
نمره	راهنمای تصحیح	ردیف

۱	$x^2 - 7x + 10 < 0 \rightarrow (x-2)(x-5) < 0 \xrightarrow{(. / ۲۵)} x \in (2, 5) \quad (. / ۲۵)$ $a = \frac{5+2}{2} = \frac{7}{2} \quad (. / ۲۵) \quad r = \frac{5-2}{2} = \frac{3}{2} \quad (. / ۲۵)$	۱	
۰/۷۵	(ج) ۶ (۰/۲۵) (ج) ۶ (۰/۲۵) (ب) همگرایی $e^x$ (۰/۲۵) (الف) ۲ (۰/۲۵)	۲	
۱/۲۵	$-\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots \rightarrow$ یکنوانیست $\xrightarrow{(. / ۵)}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} = \begin{cases} 1 & n=2k \\ -1 & n=2k+1 \end{cases} \Rightarrow$ واگر است $\xrightarrow{(. / ۷۵)}$	۳	
۱/۵	$a_n = 1 + \frac{1}{n}$ $b_n = 1 - \frac{1}{n}$	$\xrightarrow{(. / ۵)} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1 \xrightarrow{(. / ۲۵)} \begin{cases} \liminf(a_n) = 1 & (. / ۲۵) \\ \liminf(b_n) = 0 & (. / ۲۵) \end{cases}$ پس تابع در $x=1$ حد دارد $\xrightarrow{(. / ۲۵)}$	۴
۱/۵	$f(0) = 1$ $f(\pi) = -\pi^2 + \pi + 1 < 0$	$\xrightarrow{(. / ۵)} f(0), f(\pi) < 0 \quad (. / ۲۵)$ پس بنا بر قضیه بولزانو معادله $\sin x - x^2 + x + 1 = 0$ در بازه $[0, \pi]$ حداقل یک ریشه دارد. $\xrightarrow{(. / ۲۵)}$	۵
۱	$R'(x) = 0/2x - 3 \xrightarrow{(. / ۵)} R'(1800) = 357 \quad (. / ۵)$	۶	
۱/۵	$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x x-1 -1}{x-1} \xrightarrow{(. / ۲۵)} \begin{cases} f'_+(1) = 1 & (. / ۲۵) \\ f'_-(1) = -1 & (. / ۲۵) \end{cases}$	تابع $f$ در $x=1$ پیوسته است. $\xrightarrow{(. / ۲۵)}$ پس تابع $f$ در $x=1$ مشتق‌پذیر نیست. $\xrightarrow{(. / ۲۵)}$	۷
۱/۵	$y' = 1 + \tan^2 x$ $m=2$	$\xrightarrow{(. / ۵)} 1 + \tan^2 x = 2 \xrightarrow{(. / ۲۵)} \tan x = \pm 1 \xrightarrow{(. / ۲۵)} x = \pm \frac{\pi}{4} \xrightarrow{(. / ۲۵)} A\left(\frac{\pi}{4}, 1\right), B\left(-\frac{\pi}{4}, -1\right) \quad (. / ۲۵)$	۸
۱	$y'_x = \frac{f'_x}{f'_y} = \frac{2x-y}{-x+2y} \xrightarrow{(. / ۲۵)} m = -1 \quad (. / ۲۵) \rightarrow y = -x + 2 \quad (. / ۲۵)$	۹	
۱	(الف) $y' = \frac{2x+4}{x^2+4x} \quad (. / ۵)$ (ب) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{rx} + re^{rx} \sqrt{x} \quad (. / ۵)$	۱۰	

ادامه در برگه دوم

با اسمه تعالی

مدت امتحان: ۱۵۰ دقیقه	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: حساب دیفرانسیل و انتگرال
تاریخ امتحان: ۱۳۹۶/۶/۸		پیش‌دانشگاهی
مرکز سنجش آموزش و بورس http://aee.medu.ir		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۳۹۶
نمره	راهنمای تصحیح	ردیف

۱	$f'(x) = \sqrt{3} - 2\sin x \xrightarrow[\text{(.)/25}]{f'(x)=0} \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\text{.)/25} \rightarrow x = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \quad (\text{.)/5}$	نقاط بحرانی ۱۱																																
۱/۵	$f'(x) = 4x^3 - 6x^2 = 0 \xrightarrow[\text{(.)/25}]{f'(x)=0} x = 0 \quad (\text{.)/25}$ $x = \frac{3}{2} \quad (\text{.)/25}$ $f(0) = 2 \quad (\text{.)/25}$ $f(1) = 1 \quad (\text{.)/25}$ $f(-2) = 34 \quad (\text{.)/25}$ مینیمم مطلق	غایق ۱۲																																
۲	$D_f = \mathbb{R}, f'(x) = 3x^2 - 6x = 0 \xrightarrow[\text{(.)/25}]{f'(x)=0} x = 0, 2 \quad (\text{.)/25}$ $f''(x) = 6x - 6 = 0 \xrightarrow[\text{(.)/25}]{f''(x)=0} x = 1 \quad (\text{.)/25}$ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">x</td> <td style="padding: 5px;">-∞</td> <td style="padding: 5px;">+</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">+∞</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">y'</td> <td style="padding: 5px;">+</td> <td style="padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">+</td> <td style="padding: 5px;">+</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">y''</td> <td style="padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">+</td> <td style="padding: 5px;">+</td> <td style="padding: 5px;">+</td> <td style="padding: 5px;">+</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">γ</td> <td style="padding: 5px;">-∞ ↗</td> <td style="padding: 5px;">1 ↘</td> <td style="padding: 5px;">-1 ↘</td> <td style="padding: 5px;">-2 ↗</td> <td style="padding: 5px;">+∞</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>	x	-∞	+	1	-	2	-	+∞	y'	+	-	-	-	+	+		y''	-	-	+	+	+	+		γ	-∞ ↗	1 ↘	-1 ↘	-2 ↗	+∞			۱۳
x	-∞	+	1	-	2	-	+∞																											
y'	+	-	-	-	+	+																												
y''	-	-	+	+	+	+																												
γ	-∞ ↗	1 ↘	-1 ↘	-2 ↗	+∞																													
۱/۵	$\sum_{j=1}^n \frac{j^2}{n^2} = \frac{1^2}{n^2} + \frac{2^2}{n^2} + \frac{3^2}{n^2} + \dots + \frac{n^2}{n^2} \quad (\text{.)/75}$ $A = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n+1} \quad (\text{.)/75}$	(الف) (ب)																																
۱/۲۵	$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{9-0} \int_0^9 (2x + \sqrt{x}) dx = \frac{1}{9} \left( x^2 + \frac{2}{3} x \sqrt{x} \right) \Big _0^9 = \frac{81+18}{9} = 11 \quad (\text{.)/25}$ مقدار میانگین	۱۵																																
۰/۷۵	$F(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x + \ln x  + \frac{1}{5} e^{5x} + C \quad (\text{.)/75}$	۱۶																																
۲۰	همکاران گرامی، ضمن عرض خسته نباشید، به سایر راه حل های صحیح به تناسب نمره تعلق گیرد. با تشکر																																	