

آیا میدانستید با عضویت در سایت جزوه بان میتوانید به صورت رایگان جزوایات و نمونه

سوالات دانشگاهی را دانلود کنید؟؟

فقط کافه روی لینک زیر ضربه بزنید

ورود به سایت جزوه بان

Jozveban.ir

telegram.me/jozveban

sapp.ir/sopnuu

جزوات و نمونه سوالات پیام نور



@sopnuu

jozveban.ir

98-99-1



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۲۴۰

DSM-IV - کدام نوع افسردگی بدون مالیخولیا می نامد؟

۱. افسردگی درون زاد ۲. افسردگی برون زاد ۳. افسردگی مضاعف ۴. افسردگی یک قطبی

- نظریه درماندگی آموخته شده توسط چه کسی مطرح شد؟

۱. سلیگمن ۲. مزلو ۳. بک ۴. آلیس

- کدام گزینه جزء نشانه های شناختی افسردگی است؟

۱. احساس حقارت و بی کفايتی ۲. فلج ارادی ۳. کندی در رفتار و گفتار ۴. نظر مثبت نسبت به دیگران

- با توجه به نظریه "درماندگی آموخته شده" افسردگی حاصل سه اسناد برای رویداد منفی است که باشد.

۱. پایدار - درونی - کلی ۲. پایدار - بیرونی - جزئی ۳. ناپایدار - بیرونی - جزئی

- سن معمول برای شروع یک دوره افسردگی کدام است؟

۱. ۳۰ تا ۳۵ سالگی ۲. ۲۴ تا ۲۹ سالگی ۳. ۱۸ تا ۲۴ سالگی ۴. ۳۵ تا ۴۰ سالگی

- کدام یک از موارد زیر جزء دسته داروهای ضد افسردگی بازدارنده های مونوآمینو اکسیداز هستند؟

۱. آمی تریپتیلن ۲. فنلزین ۳. سرتالین ۴. پروکستین

- کدام مورد جزء عوامل خطرساز برای خودکشی است؟

۱. جنسیت موثر ۲. تاہل ۳. حافظه آسیب دیده ۴. خواب زیاد

- هورمونی که معمولاً در مغز میانی و هیپوتالاموس یافت می شود و در ابتلا به اختلال عاطفی فصلی دخیل می باشد کدام است؟

۱. ملاتونین ۲. سروتونین ۳. نوراپی نفرین ۴. اکسی توسین

- کدام یک از موارد زیر جزء نشانه های افراد مانیای است؟

۱. آرام صحبت می کنند. ۲. ناکامی را خودشان تجربه می کنند. ۳. قضاوت قوی دارند. ۴. پر زرق و برق هستند.

- کدام یک جزء نشانه های اسکیزوفرنیا که بلولر عنوان کرده است ، می باشد؟

۱. توهם ۲. آشفتگی تداعی ها ۳. هذیان ۴. فقدان عاطفه

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰، مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱

۱۱- کدام گزینه جزء نشانه های اسکیزوفرنیا بر اساس تشخیص DSM است؟

۱. رفتار منظم ۲. توهمندی و هذیان ۳. گفتارسلیس ۴. پرحرفی

۱۲- شایع ترین نوع اسکیزوفرنی کدام است؟

۱. آشفته ۲. پارانوئید ۳. کاتاتونیک ۴. باقی مانده

۱۳- درمان اسکیزوفرنیا با کلوزاپین ممکن است چه عوارضی داشته باشد؟

۱. خواب آلودگی ۲. دپرسن ۳. آگرانولوسیتوسیز ۴. افزایش وزن

۱۴- کدام یک از موارد زیر در درمان اسکیزوفرنیا، دارو درمانی را بهبود می بخشد؟

۱. خانواده درمانی ۲. مدیریت استرس ۳. گروه درمانی ۴. تغییر باورها

۱۵- مدل شبیه نظریه فروم ریچمن در مورد اسکیزوفرنیا چیست؟

۱. نظریه دوسوکور ۲. نظریه ذهن ۳. نظریه علت اجتماعی ۴. نظریه راندگی اجتماعی

۱۶- کدام یک از گروه های زیر بیشتر در معرض ابتلا به اسکیزوفرنیا هستند؟

۱. متولدین ماه های بهار ۲. متولدین ماه های تابستان ۳. متولدین ماه های پاییز ۴. متولدین ماه های زمستان

۱۷- مصرف کدام یک از موارد زیر در بروز اسکیزوفرنی دخالت دارد؟

۱. کوکائین ۲. هروئین ۳. مورفین ۴. حشیش

۱۸- مشهودترین نشانه اسکیزوفرنی کدام است؟

۱. آشفتگی در فرآیندهای تفکر ۲. انزواج اجتماعی ۳. توهمندی شنیداری ۴. افکار هزینی

۱۹- نقطه اوج سن شروع اسکیزوفرنی در زنان در چند سالگی است؟

۱. ۲۰- ۲۶ سالگی ۲. ۳۲- ۳۶ سالگی ۳. ۳۶- ۴۵ سالگی ۴. ۴۵- ۴۹ سالگی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰، مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱

-۲۰- کرتکس پره فرونتمال دور سولاترال راست در کدام حافظه را نشان می دهد؟

- ۱. حافظه کوتاه مدت، حافظه کاری
- ۲. حافظه بلندمدت
- ۳. حافظه کاری، حافظه بلند مدت
- ۴. حافظه کاری

-۲۱- کدام مناطق مغزی در اسکیزوفرنی تحت تاثیر قرار گیرند؟

- ۱. لوپ های پیشانی
- ۲. هیپوalamوس
- ۳. تalamوس
- ۴. لوپ پس سری

-۲۲- کدام یک از این داروها برای درمان نشانه های منفی اسکیزوفرنی موفق تر عمل کرده است؟

- ۱. کلوزاپین
- ۲. هالوپریدول
- ۳. کلرپرومازین
- ۴. ایمی پرامین

-۲۳- درمان شناختی- رفتاری اسکیزوفرنی شامل چه درمان هایی است؟

- ۱. دارو درمانی
- ۲. نظر به تاریخچه زندگی فرد و مشکلات شخصیتی
- ۳. مدیریت استرس و تغییر باورها
- ۴. خانواده درمانی

-۲۴- در کدام اختلال شخصیتی فرد مبتلا هیجانی و پر زرق و برق می باشد؟

- ۱. دوری گزینی
- ۲. ضد اجتماعی
- ۳. پارانوئید
- ۴. اسکیزوئید

-۲۵- کدام اختلال در مردان شایع تر است؟

- ۱. نمایشی
- ۲. مرزی
- ۳. خودشیفتہ
- ۴. اسکیزوتاپیال

-۲۶- کدام مورد جزء مشخصه های اصلی تشخیص اختلال نمایشی است؟

- ۱. تجربه هیجانی سطحی
- ۲. روابط بی ثبات
- ۳. ترس از مخالفت با دگران
- ۴. نیاز شدید به محبت

-۲۷- افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانویایید از کدام مکانیسم دفاعی استفاده می کنند؟

- ۱. جبران
- ۲. فرافکنی
- ۳. واپس روی
- ۴. جداسازی

-۲۸- کدام اختلال از جوانی شروع می شود و به آن اختلال شخصیت منفی گرانیز می گویند؟

- ۱. منفعل پرخاشگر
- ۲. افسرده
- ۳. وابسته
- ۴. وسواسی-جبری

-۲۹- کدام مورد از شایع ترین اختلال های شخصیت در کلینیک های روانی است؟

- ۱. وابسته
- ۲. وسواسی-جبری
- ۳. مرزی
- ۴. ضد اجتماعی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰۶۱

-۳۰- افراد مبتلا به این اختلال احتمالاً بیشتر از افراد دیگر به دوره‌ای از اسکیزوفرنی مبتلا می‌شوند؟

۴. پارانویایید

۳. اسکیزوئید

۲. اسکیزوتاپیال

۱. هیسترویونیک

-۳۱- از بین رفتن دوره‌های ماهانه (آمنوریا) از پیامدهای کدام مورد است؟

۲. بی اشتھایی روانی

۴. اختلال خواب

۱. چاقی

۳. پراشتھایی روانی

-۳۲- کدام قسمت مغز موجب سیری می‌شود؟

۴. هیپوفیز

۳. هیپوتالموس شکمی

۲. هیپوتالموس جانبی

۱. تalamوس

-۳۳- شیوع پراشتھایی روانی در چند درصد جمعیت عمومی گزارش شده است؟

۴. ۱۰ درصد

۳. ۰/۵ تا ۱ درصد

۲. ۵ درصد

۱. ۲ درصد

-۳۴- در تبیین نظریه پردازان فرویدی، در مورد مبتلایان به پراشتھایی روانی و بی اشتھایی روانی به ترتیب کدام موارد صحیح است؟

۲. فاقد کنترل نهاد- فاقد قدرت فراخود

۴. فاقد کنترل فراخود- فاقد قدرت خود

۱. فاقد کنترل خود- فاقد قدرت فراخود

۳. فاقد قدرت خود- فاقد کنترل فراخود

-۳۵- روان تحلیلگران برای درمان پراشتھایی روانی میل به عینی سازی کدام مکانیسم‌های دفاعی دارند؟

۲. واپس روی و انکار

۴. واکنش وارونه و فرافکنی

۱. درون فکنی و برون فکنی

۳. جبران و سرکوب

-۳۶- خواب چند مرحله کلی و اختصاصی دارد؟

۲. ۲ مرحله کلی و ۵ مرحله اختصاصی

۴. ۳ مرحله کلی و ۵ مرحله اختصاصی

۱. ۳ مرحله کلی و ۴ مرحله اختصاصی

۳. ۲ مرحله کلی و ۴ مرحله اختصاصی

-۳۷- مهمترین درمان نارکولپسی چیست؟

۲. مداخلات خانوادگی

۴. شوک درمانی

۱. دارودرمانی

۳. درمان‌های شناختی رفتاری

-۳۸- کدام یک از داروهای زیر برای درمان پراشتھایی روانی موثر واقع شده است؟

۴. سرتالین

۳. ایمی پرامین

۲. آنتی هیستامین

۱. فلوکستین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۲۴۰

۳۹- مهمترین نظریه پذیرفته شده در مورد اختلال هویت جنسی کدام است؟

۴. زیست شناختی

۳. روان تحلیل گری

۲. شرطی شدن

۱. شناختی

۴۰- مهمترین انتقال دهنده عصبی که به بیماری آلزایمر مربوط است کدام است؟

۴. اکسی توسمین

۳. دوپامین

۲. سروتونین

۱. استیل کولین

شماره سؤال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱	ب	عادی
۲	الف	عادی
۳	الف	عادی
۴	الف	عادی
۵	ب	عادی
۶	ب	عادی
۷	ج	عادی
۸	الف	عادی
۹	د	عادی
۱۰	ب	عادی
۱۱	ب	عادی
۱۲	ب	عادی
۱۳	ج	عادی
۱۴	الف	عادی
۱۵	الف	عادی
۱۶	د	عادی
۱۷	الف	عادی
۱۸	الف	عادی
۱۹	ب	عادی
۲۰	ج	عادی
۲۱	الف	عادی
۲۲	الف	عادی
۲۳	د	عادی
۲۴	ب	عادی
۲۵	ج	عادی
۲۶	الف	عادی
۲۷	ب	عادی
۲۸	الف	عادی
۲۹	الف	عادی
۳۰	ب	عادی
۳۱	ب	عادی
۳۲	ج	عادی
۳۳	ج	عادی
۳۴	د	عادی
۳۵	الف	عادی
۳۶	ب	عادی
۳۷	الف	عادی
۳۸	الف	عادی
۳۹	ب	عادی
۴۰	الف	عادی

97-98-2



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): قسطی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسطی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۲۴۰

۱- نشانه اصلی اختلالات خلقی چیست؟

۴. بی قراری

۳. توهمندی

۲. هذیان

۱. افسردگی

۲- کدام نوع افسردگی براساس زمان و دوره عود آن را مشخص می گردد؟

۴. اساسی

۳. مضاعف

۲. پس از زایمان

۱. تک قطبی

۳- حالت خفیف تر اختلال دو قطبی کدام گزینه است؟

۴. افسردگی اساسی

۳. افسردگی تک قطبی

۲. ادواری خوبی

۱. افسردگی خوبی

۴- فلجه ارادی جزء کدام یک از نشانه های افراد افسرده است؟

۴. انگیزشی

۳. زیست شناختی

۲. فیزیولوژیکی

۱. شناختی

۵- در کدام حالت افسردگی افزایش وزن دیده می شود؟

۴. اساسی

۳. خفیف

۲. شدید

۱. متوسط

۶- کدام نوع افسردگی را بدون مالیخولیا می نامند؟

۴. خفیف

۳. بروزن زاد

۲. مضاعف

۱. درون زاد

۷- پایین آمدن سطح کدام یک از انتقال دهنده های زیر باعث بروز افسردگی می شود؟

۴. سروتونین

۳. استیل کولین

۲. اپی نفرین

۱. دوپامین

۸- مهمترین ناحیه دخیل در افسردگی کدام یک از گزینه های زیر است؟

۴. هیپوتalamوس

۳. تalamوس

۲. آمیگدال

۱. لیمیک

۹- طبق نظریه فروید فرد افسرده در طی دوره غمگینی به کدام مرحله برگشت می کند؟

۴. تناسلی

۳. نهفتگی

۲. دهانی

۱. مقعدی

۱۰- احساس گرسنگی مربوط به کدام قسمت مغز است؟

۴. هیپوفیز

۳. تalamوس

۲. هیپو تalamوس شکمی

۱. هیپو تalamوس جانبی

۱۱- از نظر کراپلین دوران طولانی ناتوانی شدید اجتماعی از مشخصات کدام یک از بیماری های زیر است؟

۴. اسکیزوفرنی پنهان

۳. جنون زودرس

۲. افسردگی

۱. اسکیزوفرنی آشکار

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): قستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰۵ - روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱

۱۲- فقدان هذیان، گفتار آشفته و کاتاتونیک از نشانه های کدام نوع اختلال اسکیزوفرنی می باشد؟

۴. پارانویید

۳. کاتاتونیک

۲. باقی مانده

۱. آشفته

۱۳- شروع بیماری اسکیزوفرنی بین چه سنی صورت می گیرد؟

۲۶-۳۲

۲۰-۲۸

۲۰-۲۶

۲۰-۳۹

۱۴- مشغولیت ذهنی در مورد مقررات و جزئیات ، فقدان انعطاف پذیری ، کمال گرایی ، احتکار اشیاء ، حساسیت جزء کدام یک از اختلالات شخصیت زیر می باشد ؟

۲. پارانوئید

۴. وسواسی - اجباری

۱. دوری گزین

۳. نمایشی

۱۵- اجتناب از روابط نزدیک، انتخاب فعالیت های انفرادی و سردی هیجانی از مشخصه های کدام اختلال است؟

۴. اسکیزویید

۳. مرزی

۲. دوری گزین

۱. اسکیزوتاپیال

۱۶- کدام یک از عوامل زیر از نشانه های اختلال شخصیت ضد اجتماعی است؟

۲. برون گرایی بالا

۴. جدیت بیشتر

۱. روان رنجورخویی پایین

۳. هم رایی بالا

۱۷- تمایل به فکر و خیال و نگرانی ، بدینی و احساس گناه و پشیمانی از ویژگی های اصلی کدام اختلال است؟

۴. پارانویید

۳. دوری گزین

۲. افسرده

۱. منفعل پرخاشگر

۱۸-

معمول اوج سن ابتلا به بی اشتهاهی روانی در زنان کدام است؟

۲. ۱۸ تا ۴۰

۴. ۱۴ تا ۱۸

۱. ۴۰ به بالا

۳. ۲۰ تا ۲۵

۱۹- فرد باید چند درصد از وزن خود را از دست بدهد تا به مراقبت های خاص نیاز داشته باشد؟

۴. ۲۵٪

۳. ۳۰٪

۲. ۵۰٪

۱. ۷۰٪

۲۰- تغذیه مجدد مربوط به کدام درمانی اختلال تغذیه ای می باشد؟

۴. بینش درمانی

۳. رفتار درمانی

۲. خانواده درمانی

۱. شناختی رفتاری

۲۱- کودکانی که دچار شب ادراری یا راه رفتن حین خواب هستند در کدام مرحله مشکل دارند؟

۴. اول و چهارم

۳. سوم و چهارم

۲. دوم و سوم

۱. اول و دوم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): قسطی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسطی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰۵ - روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱

۲۲- کدام یک از نابهنجاری های زیر جزء اختلال هایی که در حین خواب روی می دهند؟

۴. حمله خواب

۳. بی خوابی

۲. پرخوابی

۱. کابوس

۲۳- کاتاپلکسی چیست؟

۱. خشک زدگی

۳. توهمندی پیش از خواب

۲. توهمندی پس از خواب

۴. فلجه خواب

۲۴- خواب متناقض بعد از کدام مرحله رخ می دهد؟

۴. چهارم

۳. سوم

۲. دوم

۱. اول

۲۵- تفاوت وحشت شبانه و کابوس در چیست؟

۱. در وحشت شبانه فرد با ترس فراوان از خواب بیدار می شود و اغلب رویای دیده شده را به خاطر می آورد.

۲. در وحشت شبانه فرد به طور معمولی از خواب بیدار می شود ولی وحشت زیادی را تجربه کرده و رویای دیده شده را به خاطر نمی آورد.

۳. در وحشت شبانه فرد با ترس فراوان از خواب بیدار شده اما رویای دیده شده را به خاطر نمی آورد.

۴. در وحشت شبانه فرد به طور معمولی از خواب بیدار شده ولی وحشت زیادی را تجربه کرده و رویای دیده شده را به خاطر می آورد.

۲۶- به تمایل فرد به رابطه جنسی با اشیاء چه گفته می شود؟

۴. بیزاری جنسی

۳. سادیسم جنسی

۲. پارافیلیا

۱. پدوفیلیا

۲۷- به مجموعه ای از اختلالات که با مشکل در واکنش جنسی همراه است چه می گویند؟

۴. اختلال نعروظ

۳. بیزاری جنسی

۲. اعتیاد جنسی

۱. بدکارکردی جنسی

۲۸- کدام یک از اختلالات زیر جزء اختلالات میل جنسی است؟

۲. انزال زودرس

۱. اختلالات نعروظ

۴. اختلال بیزاری جنسی

۳. اختلال اوج لذت جنسی

۲۹- انقباض غیرارادی قسمت خارجی اندام تناسلی زن چه نامیده می شود؟

۴. سرد مزاجی

۳. درد جنسی

۲. واژینیسم

۱. مقاربت دردنگ

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): قسطی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسطی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰۵ - روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱

-۳۰- مهمترین دارویی که برای درمان اختلال نعوظ به کار برد می شود چیست؟

۴. سیپروهیپادین

۳. سیلدنافیل

۲. بنزودپازین

۱. زالپلون

-۳۱- درمانگر برای درمان کدام اختلال از شوک الکتریکی استفاده می کند؟

۴. سادیسم جنسی

۳. پدوافیلیا

۲. پارافیلیا

۱. مبدل پوشی

-۳۲- مرحله اول جراحی اختلال هویت جنسی شامل کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۲. تزریق پروژسترون

۱. جراحی متمرکز به صفات اولیه

۴. تزریق هورمون جنس مخالف

۳. تزریق تسترون

-۳۳- آسیب دیدن توانایی ها برای انجام اعمال هدف مند علیرغم سالم بودن کارکردهای حرکتی چه می نامند؟

۴. آپراکسیا

۳. آگنوزیا

۲. آفازیا

۱. آمنزیا

-۳۴- عدم تشخیص اشیاء علیرغم سالم بودن کارکردهای حسی چه نامیده می شود؟

۴. آگنوزیا

۳. آمنزیا

۲. آپراکسیا

۱. آفازیا

-۳۵- در مرحله نهایی بیماری آلزایمر کدام یک از گزینه های زیر اتفاق می افتد؟

۲. گفتار دچار مشکل می شود.

۱. حافظه پیش گستر از بین می رود.

۴. هیجان آسیب می بیند.

۳. حافظه پس گستر از بین می رود.

-۳۶- کدام یک از جفت ژن های زیر در ابتلاء به بیماری آلزایمر دخالت دارند؟

۴. ۱۴-۱۸-۲۱

۳. ۱۴-۱۹-۲۱

۲. ۱۴-۱۸-۲۰

۱. ۱۴-۱۹-۲۰

-۳۷- مهمترین انتقال دهنده عصبی که به بیماری آلزایمر مربوط است کدام است؟

۴. دوپامین

۳. سروتونین

۲. آدرنالین

۱. استیل کولین

-۳۸- کدام یک از اختلالات زیر می تواند فعالیت دستگاه ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار دهد؟

۴. استرس

۳. آلزایمر

۲. فلج چندگانه

۱. افسردگی

-۳۹- فقدان سلول های رنگدانه ای در جسم سیاه و هسته رنگی مغز در کدام بیماری دیده می شود؟

۴. دمانس

۳. هانتینگتون

۲. پارکینسون

۱. مالتیپل اسکلروزیس

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): قستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۲۴۰۵

۴۰- دومین اختلال شایع عصب شناختی کدام است؟

۴. پارکینسون

۳. آلزایمر

۲. سکته

۱. صرع

1217240 - 97-98-2

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	الف	عادی
۲	ب	عادی
۳	ب	عادی
۴	د	عادی
۵	ج	عادی
۶	ج	عادی
۷	د	عادی
۸	الف	عادی
۹	ب	عادی
۱۰	الف	عادی
۱۱	ج	عادی
۱۲	ب	عادی
۱۳	الف	عادی
۱۴	د	عادی
۱۵	د	عادی
۱۶	الف	عادی
۱۷	ب	عادی
۱۸	د	عادی
۱۹	د	عادی
۲۰	ب	عادی
۲۱	ج	عادی
۲۲	الف	عادی
۲۳	الف	عادی
۲۴	د	عادی
۲۵	ب	عادی
۲۶	ب	عادی
۲۷	الف	عادی
۲۸	د	عادی
۲۹	ب	عادی
۳۰	ج	عادی
۳۱	الف	عادی
۳۲	د	عادی
۳۳	د	عادی
۳۴	د	عادی
۳۵	ب	عادی
۳۶	ج	عادی
۳۷	الف	عادی
۳۸	د	عادی
۳۹	ب	عادی
۴۰	الف	عادی

97-98-1



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

 رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
 روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۲۴۰، ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی عمومی

۱- ویژگی اصلی کدام اختلال شخصیت، الگوی پایداری از سوءظن و عدم اعتماد به دیگران است؟

۱. پارانویا ۲. ضد اجتماعی ۳. اسکیزوئید ۴. دوری گزین

۲- مهمترین ناحیه دخیل در افسردگی می باشد؟

۱. سیستم لیمبیک ۲. تalamوس ۳. هیپو تالاموس ۴. هیپوفیز

۳- کدام گزینه معمولا مشهورترین نشانه اسکیزوفرنی است؟

۱. آشفتگی در فرایندهای فکری ۲. توهم ۳. گفتار آشفته ۴. فقدان عاطفه

۴- فرضیه دوپامین مربوط به کدام اختلال است؟

۱. اسکیزوفرنی ۲. MDD ۳. اختلال بی نظمی خلقی ایدایی

۵- برخی از مطالعات استرس مادر را در به وجود آمدن این اختلال دخیل دانسته اند؟

۱. فوبی ۲. افسردگی ۳. وسواس ۴. اسکیزوفرنیا

۶- یکی از ناتوان کننده ترین اختلال های مربوط به بهداشت روانی است؟

۱. افسردگی ۲. شیدایی ۳. اسکیزوفرنی ۴. MDD

۷- DSM-IV-TR ده نوع اختلال شخصیتی را در چند خوشه معرفی می کند؟

۱. ۱ ۲. ۲ ۳. ۳ ۴. ۴ ۵. ۵

۸- معمولا خواب REM - non به چند مرحله کوچکتر تقسیم می شود؟

۱. ۱ ۲. ۲ ۳. ۳ ۴. ۴

۹- برای تشخیص این بیماری نقص ها باید به یک آسیب در کارکرد اجتماعی منجر گردد؟

۱. آلزایمر ۲. صرع ۳. پارکینسون ۴. MS

۱۰- دومین اختلال شایع عصب شناختی بعد از سکته است؟

۱. پارکینسون ۲. صرع ۳. الزایمر ۴. زوال عقل

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰، مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱ -، روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۲۴۰

۱۱- شایع ترین نوع اسکیزوفرنیا کدام گزینه است؟

۴. نوع باقی مانده

۳. نوع کاتانویک

۲. نوع آشفته

۱. نوع پارانویید

۱۲- یکی از مباحثه انگیزترین و شدیدترین اختلال های روانی است؟

۴. وسوس

۳. اسکیزوفرنی

۲. مانیا

۱. افسردگی

۱۳- SAD مربوط به کدام اختلال است؟

۲. اختلال اسکیزوافکتیو

۴. اختلال افسردگی فصلی

۱. اختلال اسکیزوفرنی شکل

۳. اختلال هذیانی

۱۴- از نظر چه کسی خودکشی نشان دهنده یک آرزوی سرکوب شده برای کشتن یک موضوع محبوب از دست رفته است؟

۴. اریکسون

۳. فروید

۲. سلیگمن

۱. بک

۱۵- هم اکنون چند دسته داروی ضد افسردگی به کار می رود؟

۵. ۴

۴. ۳

۳. ۲

۲. ۱

۱۶- کدام انتقال دهنده ها از نظر زیست شناختی در سبب شناسی افسردگی دخیل دانسته شده اند؟

۲. دوپامین و گابا

۴. نور اپی نفرین و سروتونین

۱. دوپامین و استیل کولین

۳. اپی نفرین و نور اپی نفرین

۱۷- در کدام اختلال شخصیتی افراد، هیجانی، خودنما و پرزرق و برق هستند؟

۴. مرزی

۳. وسوسی- جبری

۲. وابسته

۱. پارانوئید

۱۸- کدام اختلال رایجترین اختلال روانی می باشد؟

۴. افسردگی

۳. وسوس

۲. فوبی

۱. اضطراب

۱۹- معمولاً اختلالات شخصیت از چه سنی قابل تشخیص است؟

۲. پانزده سال به بالا

۴. بیست و پنج سال به بالا

۱. هفت سال به بالا

۳. هیجده سال به بالا

۲۰- ویژگی کدام دسته از اختلالات شخصیت، عجیب و غریب یا نامتعارف بودن است؟

۴. پارانوئید

۳. دوری گزین

۲. نمایشی

۱. وابسته

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

روش تحقیقی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰، مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱

-۲۱- در کدام نوع از اختلالات شخصیت، خویشتن از نظر اجتماعی ناکارآمد و بی تفاوت است؟

۱. ضد اجتماعی ۲. وابسته ۳. اسکیزوئید ۴. پارانوئید

-۲۲- کدام مورد به عنوان اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه معروف است؟

۱. اسکیزوئید ۲. اسکیزوتاپیال ۳. مرزی ۴. دوری گزین

-۲۳- قبل‌به کدام اختلال شخصیت، هیستریک گفته می‌شد؟

۱. ضد اجتماعی ۲. مرزی ۳. خودشیفته ۴. نمایشی

-۲۴- مکانیسم دفاعی در کدام اختلال شخصیت، جداسازی است و همه چیز را به کاملاً خوب یا کاملاً بد تقسیم می‌کند؟

۱. پارانوئید ۲. دوری گزین ۳. مرزی ۴. اسکیزوئید

-۲۵- به کدام مورد اختلال شخصیت منفی گرا گفته می‌شود؟

۱. وسوسی - جبری ۲. پارانوئید ۳. افسرده ۴. منفعل پرخاشگر

-۲۶- کدام یک از مراحل خواب non-REM، خواب عمیق نامیده می‌شود؟

۱. سوم و چهارم ۲. دوم و سوم ۳. اول و دوم ۴. اول و سوم

-۲۷- اولین دور از خواب REM معمولاً چه مدت بعد از به خواب رفتن رخ می‌دهد؟

۱. نیم ساعت تا یک ساعت ۲. یک ساعت تا یک ساعت و نیم

۳. دو ساعت تا دو ساعت و نیم ۴. یک ربع تا یک ساعت

-۲۸- کدام مورد به نابهنجاری‌های همراه خواب مربوط است؟

۱. بدخوابی ۲. بی خوابی اولیه ۳. حمله خواب ۴. کابوس

-۲۹- درمان کدام مورد از مشکل ترین مسائل در اختلالات خواب است؟

۱. بی خوابی اولیه ۲. اختلال خواب مرتبط با تنفس

۳. حمله خواب ۴. وحشت شبانه

-۳۰- اصلی ترین ملاک تشخیص در کدام اختلال، حملات غیرقابل مقاومت خواب در طول روز به مدت حداقل ۳ ماه است؟

۱. پرخوابی اولیه ۲. نارکولپسی ۳. خواب گردی ۴. کاتاپلکسی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
۱۲۱۷۲۴۰ - مشاوره، روانشناسی

۳۱- مهمترین داروی درمان وحشت شبانه و خوابگردی چیست؟

۴. دیازپام

۳. داروهای سه حلقه ای

۲. زولپیدم

۱. ضد افسردگی

۳۲- مشکل در پاسخ جنسی را چه می نامند؟

۲. بدکارکردی های جنسی

۱. پارافیلیاها

۴. تحریک جنسی

۳. اختلال هویت جنسی

۳۳- کدام درمان توسط مسترز و جانسون در رابطه با مشکل نعروظی مطرح شد؟

۲. پیش نظاره گری خویشتن

۱. تمرکز بر آمادگی پذیرش حسی

۴. وابستگی تخیلی جنسی

۳.

۳۴- در کدام اختلال جنسی افراد معتقدند که با جنسیت غلط به دنیا آمده اند؟

۲. هویت جنسی

۱. مبدل پوشی

۴. یادگارخواهی جنسی

۳. بدکارکردی های جنسی

۳۵- در کدام اختلال، فرد با رفتارهای خشونت آمیز و آسیب رسان نسبت به موضوع جنسی خود به برانگیختگی جنسی می رسد؟

۴. مازوخیسم جنسی

۳. سادیسم جنسی

۱. نمایشگری جنسی

۳۶- مهمترین نظریه های پذیرفته شده در مورد اختلال هویت جنسی کدامند؟

۲. اضطراب جدایی مفرط اولیه

۱. شرطی شدن در مراحل اولیه زندگی

۴. جلب رضایت و توجه مفرط فرزندان توسط مادر

۳. آشفتگی هورمون های جنسی

۳۷- بر اساس نظر مسترز و جانسون رایج ترین علت مربوط به اختلال نعروظی چیست؟

۴. هورمونی

۳. یادگیری

۲. روان شناختی

۱. جسمانی

۳۸- حدود چند درصد از جمعیت عمومی مبتلا به اختلال شخصیت مرزی هستند؟

۴. پنج درصد

۳. سه درصد

۲. دو درصد

۱. یک درصد

۳۹- کدام اختلال در ICD-10 تحت عنوان اختلال شخصیت مضطرب مطرح شده است؟

۴. دوری گزین

۳. وسوسی - جبری

۲. وابسته

۱. مرزی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۲۴۰

۴۰- کدام دسته از داروها جهت کاهش و کنترل دوره های پرخاشجویی تکانشی مفیدند؟

۱. باربیتورات ها - لیتیوم
۲. بازدارنده جذب مجدد سروتونین- ال دو پا
۳. لیتیوم - بازدارنده جذب مجدد سروتونین
۴. محرک ها- ال دو پا

شماره سؤال	ياسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	الف	عادی
۲	الف	عادی
۳	الف	عادی
۴	الف	عادی
۵	د	عادی
۶	ج	عادی
۷	الف	عادی
۸	د	عادی
۹	الف	عادی
۱۰	ب	عادی
۱۱	الف	عادی
۱۲	ج	عادی
۱۳	د	عادی
۱۴	ج	عادی
۱۵	ب	عادی
۱۶	د	عادی
۱۷	د	عادی
۱۸	د	عادی
۱۹	ج	عادی
۲۰	د	عادی
۲۱	الف	عادی
۲۲	ب	عادی
۲۳	د	عادی
۲۴	ج	عادی
۲۵	د	عادی
۲۶	الف	عادی
۲۷	ب	عادی
۲۸	د	عادی
۲۹	الف	عادی
۳۰	ب	عادی
۳۱	د	عادی
۳۲	ب	عادی
۳۳	الف	عادی
۳۴	ب	عادی
۳۵	ج	عادی
۳۶	الف	عادی
۳۷	ب	عادی
۳۸	ب	عادی
۳۹	د	عادی
۴۰	ج	عادی

96-97-3



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

 روشه تحقیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
 مشاوره، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰، ۱۲۱۷۰۶۱ -

۱- افسردگی نشانه اصلی کدام اختلالات است؟

۴. روان پریش ها

۳. اختلالات خلقی

۲. روان گسیختگی ها

۱. سایکوزها

۲- حالت خفیف تر اختلال دوقطبی کدام گزینه است؟

۴. اسکیزوفرنی

۳. افسردگی مضاعف

۲. افسردگی فصلی

۱. ادوارخویی

۳- احساس های شکست، بی کفایتی و حقارت جزء کدام دسته از نشانه های افسردگی است؟

۴. فیزیولوژی

۳. شناختی

۲. انگیزشی

۱. هیجانی

۴- مهمترین ناحیه دخیل در افسردگی کدام قسمت مغز است؟

۴. مخچه

۳. هیپوکامپ

۲. سیستم لیمبیک

۱. رافه

۵- به خطای منطقی گفته می شود که فرد به غلط خود را مسئول رویدادهای منفی در پیرامون خود می داند؟

۴. بزرگ نمایی

۳. تعمیم مفرط

۲. استنباط دلخواه

۱. شخصی سازی

۶- خودکشی در افراد دارای اسکیزوفرنی بیشتر در نتیجه چیست؟

۴. ناآرامی درونی

۳. هذیان و توهمند

۲. داروی مصرفی

۱. یأس و نومیدی

۷- اولین کسی که بین دو قطب اصلی بیماری های روانی شدید تمایز گذاشت کدام دانشمند بود؟

۴. کراپلین

۳. اشنایدر

۲. راتر

۱. بلولر

۸- خلق بی حالت، فقدان تکلم یا بی ارادگی جزء کدام ملاک های تشخیصی اسکیزوفرنی است؟

۴. نشانه های منفی

۳. گفتار آشفته

۲. توهمند

۱. هذیان ها

۹- نقطه اوج سن شروع برای زنان در اختلال اسکیزوفرنی کدام گزینه است؟

۴. ۳۰-۴۰ سال

۳. ۲۰-۲۸ سال

۲. ۲۶-۳۲ سال

۱. ۲۰-۲۹ سال

۱۰- ضایعه در کدام قسمت اسکیزوفرنی نوع پارانویید همراه با توهمند شناوایی شدید ایجاد می کند؟

۲. لوب تمپورال نیمکره چپ

۴. لوب پس سری

۱. لوب تمپورال نیمکره راست

۳. لوب آهیانه ای

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - مشاوره، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱

۱۱- این بحث که اسکیزوفرنیا یک عامل سقوط به پایگاه اجتماعی پایین تر است مربوط به کدام نظریه است؟

- ۱. نظریه علت اجتماعی
- ۲. نظریه راندگی اجتماعی
- ۳. نظریه بد ارتباطی
- ۴. نظریه روانکاوی

۱۲- بنتال و همکاران به کدام نوع هذیان ها اشاره داشتند که افراد دارای این نوع باورها تحریف های شناختی دارند که در بیشتر اختلال ها رایج هستند؟

- ۱. بزرگ منشی
- ۲. انتشار فکر
- ۳. مذهبی
- ۴. تعقیب و آزار

۱۳- ویژگی نوع اسکیزوفرنیا کاتاتونیک در کدام گزینه آمده است؟

- ۱. آشفتگی خلقی
- ۲. آشفتگی گفتاری
- ۳. آشفتگی روانی حرکتی بارز
- ۴. هذیان های پارانوییدی

۱۴- کدام اختلالات شخصیت در زنان شایع است؟

- ۱. ضد اجتماعی و خودشیفته
- ۲. نمایشی و مرزی
- ۳. وابسته و دوری گزین
- ۴. اسکیزوئید و اسکیزوتاپیال

۱۵- اجتناب از روابط نزدیک، فعالیتهای لذت بخش کم و از نظر هیجانی سرد ویژگی کدام نوع اختلال شخصیت است؟

- ۱. اسکیزوئید
- ۲. پارانوئید
- ۳. مرزی
- ۴. ضد اجتماعی

۱۶- در کدام اختلال مبتلایان همه چیز را به کاملا بد یا کاملا خوب تقسیم میکنند؟

- ۱. شخصیت مرزی
- ۲. شخصیت نمایشی
- ۳. شخصیت اسکیزوئید
- ۴. شخصیت وابسته

۱۷- برای افراد مبتلاء به اختلال شخصیت که سنی پایین تر از ۳۰ سال دارند مهمترین مسئله احتمال کدام گزینه است؟

- ۱. خودزنی
- ۲. فرار از منزل
- ۳. پرخاشگری
- ۴. خودکشی

۱۸- موثرترین مداخلات روان شناختی برای اختلال شخصیت ضد اجتماعی کدام گزینه است؟

- ۱. شناختی-رفتاری
- ۲. شناختی
- ۳. درمان معطوف به خانواده
- ۴. روان کاوی

۱۹- بر اساس مدل پنج عاملی مکره، کدام یک از گزینه های زیر برای اختلال شخصیت ضد اجتماعی مطرح شده است؟

- ۱. روان رنجورخویی بالا
- ۲. برون گرایی پایین
- ۳. کمال گرایی
- ۴. علاقه به تنها یی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
۱۲۱۷۲۴۰ - مشاوره، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱

۲۰- در ICD-10 اختلال شخصیت مرزی چه نامیده شده است؟

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ۱. اسکیزوفرنی سرپایی | ۲. اسکیزوفرنی شبه نروتیک |
| ۳. اختلال شخصیت هیجانی بی ثبات | ۴. شخصیت "انگارکه" |

۲۱- اگر فردی چند درصد وزن عادی خود را از دست بدهد تشخیص بی اشتهايی روانی داده می شود؟

- | | |
|------------|------------|
| ۱. ۱۵ درصد | ۲. ۳۰ درصد |
| ۳. ۴۰ درصد | ۴. ۱۰ درصد |

۲۲- کدام گزینه در مورد بی اشتهايی روانی صحیح است؟

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ۱. در خصوص متوجه به خویشتن نمرات پایینی می گیرند | ۲. جرأت مندی نمرات بالاتری می گیرند |
| ۳. در بین زنان گروههای اجتماعی -اقتصادی بالا قرار دارند | ۴. سطح تحصیلاتشان پایین است |

۲۳- نتایج مطالعات نشان داده است که سطح پایین کدام انتقال دهنده در اختلالات تغذیه ای پایین تر از حد معمول است؟

- | | |
|-------------|-------------|
| ۱. کورتیزول | ۲. سروتونین |
| ۳. گابا | ۴. دوپامین |

۲۴- طبق کدام نظریه بی اشتهايی روانی واکنشی در مقابل خواست های نوجوانان برای استقلال بیشتر و افزایش عملکرد اجتماعی و جنسی است؟

- | | |
|----------------|--------------------|
| ۱. رفتارگرها | ۲. شناخت گراها |
| ۳. انسان گراها | ۴. روان تحلیل گرها |

۲۵- به تجمع زیاد چربی در بدن گفته می شود در زن ها معمولاً ۲۵ درصد وزن بدن و در مرد ها تقریباً ۱۸ درصد وزن را چربی تشکیل می دهد؟

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ۱. چاقی | ۲. بی اشتهايی روانی |
| ۳. پراشتهايی روانی | ۴. جوع |

۲۶- نظریه نقطه تثبیت به کدام قسمت مغز مربوط می شود؟

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ۱. تalamوس | ۲. هیپوتalamوس |
| ۳. هیپوتalamوس خلفی | ۴. هیپوتalamوس شکمی |

۲۷- بخش ترمیمی خواب که برای رفع خستگی و احساس نیرومندی در طول روز ضروری است کدام گزینه است؟

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ۱. REM | ۲. مرحله اول خواب |
| ۳. مرحله دوم خواب | ۴. خواب عمیق |

۲۸- کدام گروه سنی نصف یا بیشتر خوابشان در مرحله REM است؟

- | | |
|-------------|--------------|
| ۱. نوجوانان | ۲. سالمندان |
| ۳. کودکان | ۴. میانسالان |

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - مشاوره، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱

-۲۹- حملات غیر قابل مقاومت خواب در طول روز که حداقل به مدت ۳ ماه ادامه داشته باشد مربوط به کدام اختلال خواب است؟

۴. خواب گردی

۳. آپنه

۲. بی خوابی اولیه

۱. نارکولپسی

-۳۰- شایع ترین اختلال خواب کدام یک از موارد زیر است؟

۴. پاراسومنیاها

۳. اختلال کابوس

۲. نارکولپسی

۱. بی خوابی اولیه

-۳۱- واژینیسم مربوط به طبقه از اختلالات است؟

۴. درد جنسی

۳. اوج لذت جنسی

۲. تحریک جنسی

۱. میل جنسی

-۳۲- رایج ترین علت اختلال نعوظ کدام گزینه است؟

۴. کروموزمی

۳. ژنتیکی

۲. جسمی

۱. روان شناختی

-۳۳- افراد مبتلا به کدام اختلال معتقدند که با جنسیت غلط به دنیا آمده اند؟

۴. نعوظ

۳. واژینیسم

۲. هویت جنسی

۱. مبدل پوشی

-۳۴- مهمترین نظریه های پذیرفته شده در مورد اختلال هویت جنسی کدام گزینه است؟

۲. نظریه های شناختی

۱. نظریه های شرطی شدن

۴. نظریه روان کاوی

۳. نظریه های اجتماعی

-۳۵- در تبیین شناختی اختلال نعوظی از نظر بن کرافت چه عاملی عملکرد جنسی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد؟

۲. اضطراب

۱. ترس

۴. تمایلات پرخاشگرانه

۳. تمایلات همجنس گرایانه

-۳۶- آسیب دیدن توانایی ها برای انجام اعمال هدفمندانه علی رغم سالم بودن کارکردهای حرکتی مربوط به کدام گزینه است؟

۴. آپراکسی

۳. آگنوزیا

۲. آفازی

۱. آمنزی

-۳۷- فقدان حافظه مربوط به کدام گزینه است؟

۴. آگنوزی

۳. آمنزی

۲. دمانس

۱. آفازی

-۳۸- مصرف کدام ویتامین ها از ابتلاء به بیماری آلزایمر جلوگیری می کند؟

A, D . ۴

B6, B12 . ۳

E,B1 . ۲

D . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - مشاوره، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۹- کدام اختلال در اثر اختلالات موجود در سیستم اینمنی یا عفونت ویروسی به وجود می آید؟

MS . ۴

۳. زوال عقل

۲. دمانس

۱. پارکینسون

۴۰- در سبب شناسی بیماری پارکینسون علت بروز بیماری کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۲. آشفتگی هیجانی

۱. شخصیت غیر قابل انعطاف

۴. ضربه های روانی

۳. فقدان سلولهای رنگدانه ای در جسم سیاه

1217240 - 96-97-3

رقم السؤال	ماسن صحيح	وضعية كليد
١	ج	عادي
٢	الف	عادي
٣	ج	عادي
٤	ب	عادي
٥	الف	عادي
٦	الف	عادي
٧	د	عادي
٨	د	عادي
٩	ب	عادي
١٠	ب	عادي
١١	ب	عادي
١٢	د	عادي
١٣	ج	عادي
١٤	ب	عادي
١٥	الف	عادي
١٦	الف	عادي
١٧	د	عادي
١٨	د	عادي
١٩	ب	عادي
٢٠	ج	عادي
٢١	الف	عادي
٢٢	ج	عادي
٢٣	ب	عادي
٢٤	د	عادي
٢٥	الف	عادي
٢٦	ب	عادي
٢٧	د	عادي
٢٨	ج	عادي
٢٩	الف	عادي
٣٠	الف	عادي
٣١	د	عادي
٣٢	الف	عادي
٣٣	ب	عادي
٣٤	الف	عادي
٣٥	ب	عادي
٣٦	د	عادي
٣٧	ج	عادي
٣٨	ج	عادي
٣٩	د	عادي
٤٠	ج	عادي

96-97-2



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰ - ، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ -

۱- اختلال وحشت شبانه چه زمانی از خواب رخ می دهد؟

- ۱. ثلث اول شب حالت خواب عمیق
- ۲. ثلث دوم شب حالت خواب عمیق non-REM
- ۳. ثلث سوم حالت REM
- ۴. ثلث اول خواب

۲- اختلال شخصیت در چه زمانی تشخیص داده می شود؟

- ۱. افراد ۱۲ سال به بالا (نوجوان)
- ۲. افراد ۶ سال به بالا
- ۳. افراد ۱۸ سال به بالا
- ۴. دوران کودکی

۳- اختلالات اسکیزوئید و وسواسی - جبری، به ترتیب جزو کدام یک از اختلالات شخصیت هستند؟

- ۱. عجیب و غریب، هیجانی
- ۲. نامتعارف، مضطرب
- ۳. هیجانی، مضطرب
- ۴. مضطرب، نامتعارف

۴- نیاز افراطی به تحسین، فقدان همدلی، خیالبافی درباره موفقیت و قدرت، از مشخصه های اصلی کدام اختلال است؟

- ۱. دوری گزین
- ۲. وابسته
- ۳. خود شیفتنه
- ۴. نمایشی

۵- مدل پنج عاملی کوستا و مکره از شخصیت ضد اجتماعی در کدام مقوله زیر می گنجد؟

- ۱. صراحت پایین، روان رنجور خویی پایین، برون گرایی پایین، هم رایی پایین، فقدان وظیفه شناسی
- ۲. وظیفه شناسی پایین، درون گرایی پایین، هم رایی پایین، صراحت پایین، روان رنجور خویی پایین
- ۳. روان رنجور خویی بالا، صراحت پایین، برون گرایی پایین، هم رایی پایین، فقدان وظیفه شناسی و جدیت
- ۴. صراحت بالا، روان رنجور خویی بالا، جدیت و وظیفه شناسی پایین، هم رایی بالا، برون گرایی بالا

۶- شیوع اختلال شخصیت نمایشی چند درصد و در کدام جنس بیشتر است؟

- ۱. ۲ تا ۳ درصد، مرد
- ۲. ۲ تا ۳ درصد، زن
- ۳. ۱ تا ۲ درصد، زن
- ۴. ۲ درصد، مرد

۷- در بین مبتلایان به شخصیت ضد اجتماعی، کدام اختلال شایع است؟

- ۱. اسکیزوتاپیال
- ۲. دوری گزین
- ۳. نمایشی
- ۴. افسردگی

۸- شایع ترین اختلال شخصیت که در کلینیک های بهداشت روانی مشاهده می شود، کدام است؟

- ۱. ضد اجتماعی
- ۲. پارانوئیدی
- ۳. افسرد
- ۴. وابسته

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی گوایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۹۸ - ، روانشناسی گوایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - ، مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۲۹ -

۹- کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های اختلال منفعل پرخاشگر است؟

۱. بدون دلیل از افراد صاحب قدرت انتقاد کرده و آنها را تحقیر می کند
۲. در مورد دیگران منفی باف، منتقد و نکته سنج عمل می کند
۳. به جزئیات و مسائل حاشیه ای توجه زیادی دارد
۴. خلق روزمره بطور بارز با اندوه و دلتنهای همراه است

۱۰- کدام مرحله از خواب حافظه را تحکیم می بخشد؟

۱. مرحله سوم و چهارم non_Rem
۲. مرحله دوم non_Rem
۳. Rem
۴. مرحله اول non_Rem

۱۱- نابهنجاری های درون زا در مکانیزم های ایجاد کننده یا تنظیم کننده زمان خواب و بیداری موجب کدام دسته از اختلالات خواب می شود؟

۱. اختلالات اولیه خواب

۲. اختلال خواب ناشی از مواد

۱۲- به بی خوابی اولیه ای که سه شب در هفته و به مدت بیش از یک ماه طول بکشد، چه می گویند؟

۱. دیس سومنیا
۲. نارکولپسی
۳. آپنه
۴. بی خوابی مزمن

۱۳- درمان کدام اختلال خواب از مشکل ترین مسایل در اختلال خواب است؟

۱. خواب گردی
۲. اختلال کابوس
۳. بی خوابی اولیه
۴. دندان سایی

۱۴- در بی خوابی دور باطل بین چه عواملی شکل می گیرد؟

۱. اضطراب - بی خوابی
۲. ترس - بی خوابی
۳. ترس - رویداد استرس زا
۴. اضطراب - کابوس

۱۵- مهم ترین درمان نارکولپسی کدام است؟

۱. درمان آرمیدگی
۲. دارودرمانی
۳. درمان شناختی-رفتاری
۴. شرطی سازی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی گوایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گوایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ -، مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۱۶- اختلال واژینیسم جزء کدام طبقه اختلالات جنسی است؟

۲. اختلالات میل جنسی

۱. اختلالات مربوط به درد جنسی

۴. بدکارکردی جنسی ناشی از مواد

۳. بدکارکردی ناشی از بیماری جسمی

۱۷- به تمایلات یا رفتار جنسی نابهنجار که برای خود فرد، شریک جنسی و یا کل جامعه مضر است، چه می گویند؟

۴. پارافیلیا

۳. نمایشگری جنسی

۲. یادگارخواهی

۱. بیزاری جنسی

۱۸- اختلال هویت جنسی از چه سنی قابل ردیابی است؟

۲. قبل از بلوغ

۱. بعد از سه سالگی

۴. زمان بلوغ و آشکار شدن علائم جنسیتی

۳. قبل از سه سالگی

۱۹- نظریه نیوکامب درباره علل مبدل پوشی مردان چیست؟

۱. مادر مبتلایان معمولاً صمیمی و حمایتگر و پدرشان سرد و تهدید کننده هستند

۲. هر کودکی هر گاه لباس جنس مخالف را بپوشد، تقویت شده و رفتار را ادامه می دهد

۳. مادران مردان مبدل پوش نگرش خصوصت آمیز نسبت به مردان دارند

۴. مردان مبدل پوش نسبت به مردان دیگر، والدین خود را فاقد ویژگیهای مربوط به نوع جنس و بیشتر دارای ویژگیهای جنس مقابله ارزیابی می کنند

۲۰- برای درمان بی خوابی اگر فرد طی چند دقیقه به خواب نرود باید از رختخواب بلند شود؟

۴. ۳۰ دقیقه

۳. ۱۰ دقیقه

۲. ۲۰ دقیقه

۱. ۴۰ دقیقه

۲۱- چند درصد مردم بی خوابی مزمن را گزارش می کنند؟

۴. ۱۰ الی ۱۵ درصد

۳. ۲۰ الی ۲۵ درصد

۲. ۳۰ الی ۴۰ درصد

۱. ۵ الی ۱۰ درصد

۲۲- مردان چند برابر زنان در اثراقدم به خودکشی می میرند؟

۴. مساوی

۳. چهار برابر

۲. دو برابر

۱. سه برابر

۲۳- مهم ترین ناحیه دخیل در افسردگی می باشد؟

۴. کمربند قدامی

۳. سیستم لیمبیک

۲. هیپوکامپ و مخچه

۱. بادامه و آمیانه

۲۴- نظریه درماندگی آموخته شده مربوط به چه کسی می باشد؟

۴. سلیگمن

۳. الیس

۲. فروید

۱. بک

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی گوایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گوایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ -، مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

-۲۵- در نظریه آرون بک افسردگی با کدام گزینه همراه است؟

- ۱. طرحواره های منفی در بزرگسالی
- ۲. دیدگاه مثبت به خود ، دنیا و جهان
- ۳. دیدگاه منفی درباره خود، جهان و آینده
- ۴. دیدگاه منفی نسبت به خود و مثبت درباره دیگران

-۲۶- کدام یک از انتقال دهنده های عصبی در افسردگی نقش دارد؟

- ۱. دوپامین - گابا
- ۲. سروتونین - نوراپی نفرین
- ۳. اعتماد به نفس پایین
- ۴. آندورفین-آدرنالین

-۲۷- کدام گزینه مربوط به مانیا می باشد؟

- ۱. افزایش خواب
- ۲. عزت نفس کاذب
- ۳. کم حرفی
- ۴. اکس توسین

-۲۸- کدام هورمون در ابتلا به افسردگی فصلی دخیل دانسته شده است؟

- ۱. ملاتونین
- ۲. نوراپی نفرین
- ۳. پرولاکتین
- ۴. اکس توسین

-۲۹- کدام گزینه سه طبقه اصلی داروهای ضد افسردگی می باشد؟

- ۱. ضد تشنج ها، دیاکوت ، لیتیوم

۲. بازدارنده های منوآمین اکسیداز، ضد افسردگی سه حلقوی، بازدارنده جذب سروتونین

- ۳. ضد افسردگی سه حلقه ای، لیتیوم، MAO

- ۴. ضد افسردگی MAO پارنات، لیتیوم

-۳۰- یکی از مداخلات دارویی جهت مقابله با عوارض بیماری آلزایمر بالا بردن سطوح کدام انتقال دهنده عصبی در مغز بیماران می باشد؟

- ۱. دوپامین
- ۲. سروتونین
- ۳. استیل کولین
- ۴. اپی نفرین

-۳۱- کدام گزینه مربوط به نشانه های منفی اسکیزوفرنی می باشد؟

- ۱. بی ارادگی و ناگویی ، هذیان
- ۲. بی ارادگی و ناگویی، افت عاطفی
- ۳. توهم هذیان
- ۴. توهم هذیان

-۳۲- اسکیزوفرنیا مربوط به افزایش کدام انتقال دهنده عصبی می باشد؟

- ۱. اپی نفرین
- ۲. سروتونین
- ۳. دوپامین
- ۴. گابا

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی گوایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گوایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ -، مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

-۳۳- به وسیله مطالعات PET کارکرد آسیبی کدام لوب در بیماران اسکیزوفرنی گزارش شده است؟

۴. گیجگاهی

۳. پس سری

۲. آهیانه ای

۱. پیشانی

-۳۴- کدام نوع اسکیزوفرنی با آشتفتگی های روانی - حرکتی بازر مشخص می شود؟

۴. آشفته

۳. باقی مانده

۲. کاتاتونیک

۱. پارانوئید

-۳۵- کدام یک از گزینه های زیرشیدیدترین اختلال روانی می باشد؟

۴. آلزایمر

۳. فوبی

۲. اسکیزوفرنی

۱. افسردگی

-۳۶- LH مربوط به کدام گزینه می باشد.

۴. هیپوفیز

۳. هیپو تالاموس جانبی

۲. هیپو تالاموس شکمی

۱. تالاموس

-۳۷- اوج سن بی اشتهاای روانی چند سالگی می باشد؟

۱۲ . ۴

۳۵ تا ۳۰ . ۳

۲۵ تا ۱۸ . ۲

۱. ۱۴ تا ۱۸

-۳۸- بر اساس DSM-IV-TR اسکیزوفرنیا چند نوع می باشد؟

۲ . ۴

۴ . ۳

۵ . ۲

۳ . ۱

-۳۹- برای درمان اسکیزوفرنیا کدام دارو جزء داروهای جدید می باشد؟

۴. کلوzapین

۳. لورازپام

۲. کلرو پرومازین

۱. فنو تیازین ها

-۴۰- کدام گزینه نتیجه تخریب پیش رس سیستم های مغزی است و نرون های هیپو کامپی تخریب می شوند؟

۲. زوال عقل عروقی

۱. دلیریوم

۴. زوال عقل پیشانی-گیجگاهی

۳. آلزایمر

1217240 - 96-97-2

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	الف	عادی
۲	ج	عادی
۳	ب	عادی
۴	ج	عادی
۵	الف	عادی
۶	ب	عادی
۷	د	عادی
۸	د	عادی
۹	الف	عادی
۱۰	ج	عادی
۱۱	الف	عادی
۱۲	د	عادی
۱۳	ج	عادی
۱۴	الف	عادی
۱۵	ب	عادی
۱۶	الف	عادی
۱۷	د	عادی
۱۸	ج	عادی
۱۹	د	عادی
۲۰	ب	عادی
۲۱	د	عادی
۲۲	الف	عادی
۲۳	ج	عادی
۲۴	د	عادی
۲۵	ج	عادی
۲۶	ب	عادی
۲۷	ب	عادی
۲۸	الف	عادی
۲۹	ب	عادی
۳۰	ج	عادی
۳۱	ب	عادی
۳۲	ج	عادی
۳۳	الف	عادی
۳۴	ب	عادی
۳۵	ب	عادی
۳۶	ج	عادی
۳۷	الف	عادی
۳۸	ج	عادی
۳۹	د	عادی
۴۰	ج	عادی

96-97-1



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

و شهه تحصیلی / کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - ، مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۱- کدام گزینه مربوط به دسته رشد هیجانی ، خود نما می باشد؟

۱. پارانوئید ۲. مرزی ۳. وابسته ۴. اسکیزوئید

۲- در کدام دسته از اختلالات شخصیتی ، تحت تاثیر استرس ، واقعیت سنجی فرد به آسانی درهم می شکند؟

۱. اختلال شخصیت اجتنابی ۲. اختلال شخصیت نمایشی
۳. اختلال شخصیت وابسته ۴. اختلال شخصیت اسکیزوتاپیال

۳- اختلال شخصیت مرزی ، معمولاً در کدام دوره زندگی فرد شروع می شود؟

۱. کودکی ۲. بزرگسالی ۳. نوجوانی ۴. میانسالی

۴- افراد مبتلا به کدام دسته از اختلال شخصیتی ، معمولاً شغل های حاشیه ای انتخاب می کنند ، پیشرفت کمی دارند ولی در حرفة شان راضی بنظر می رسد؟

۱. اختلال شخصیت وسواسی - جبری ۲. اختلال شخصیت ضد اجتماعی
۳. اختلال شخصیت دوری گزین

۵- مازوخیست های اخلاقی چه زمانی احساس لذت می کنند؟

۱. وقتی مورد تحقیر دیگران قرار گیرند.
۲. وقتی خشونت فیزیکی انجام دهند.
۳. وقتی با دیگران بصورت پرخاشگرانه رفتار کنند.
۴. وقتی دیگران را مورد تحقیر قرار می دهند.

۶- کدامیک از موارد زیر ، جزء ویژگی اصلی اختلال شخصیتی نمایشی محسوب می شود؟

۱. حسود و پرنخوت ۲. تجربه هیجانی سطحی
۳. احساس عدم کفایت ۴. رفتارهای اغواگری جنسی متناسب

۷- اسب آبی مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. هیپوکامپ ۲. بادامه ۳. مخچه ۴. سیستم لیمبیک

۸- در نزدیکی های صبح کل دوره خواب فرد ، در کدامیک از مراحل زیر سپری می شود؟

۱. در مراحل ۱ و ۲ و خواب REM
۲. در مراحل ۲ و ۳ خواب REM
۳. در مراحل ۲ و ۳ خواب NREM
۴. در مراحل ۱ و ۲ و خواب REM

۹- از بین رفتن ناگهانی قوام عضلانی چه نامیده می شود؟

۱. تجربه کاتاپلکسی ۲. هیپناگوژیک
۳. هیپنوپامیک ۴. آپنه

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی گوایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۹۸ - ، روانشناسی گوایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - ، مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۲۹ -

۱۰- در کدامیک از انواع پارافیلیا، فرد با رفتارهای خشونت آمیز و آسیب رساندن نسبت به موضوع جنسی خود، به برانگیختگی جنسی دست می یابد؟

۱. مازوخیسم جنسی ۲. نمایشگری جنسی ۳. سادیسم جنسی ۴. یادگارخواهی جنسی

۱۱- مهمترین درمان دارویی شناخته شده برای اختلال نعروظی چه می باشد؟

۱. کلوzapین ۲. سیلدنافیل ۳. دسی پرامین ۴. پروزاک

۱۲- کدامیک از نظریه های زیر، عمدتاً به فرآیند تقویت رفتارهای جنسی مقابل در کودکان از سوی والدین تاکید دارد؟

۱. شناختی ۲. شرطی شدن در مراحل اولیه زندگی ۳. روان تحلیلی ۴. زیست شناختی

۱۳- در کدامیک از اختلالات زیر، باید دست کم در طول زندگی یک دورهٔ هیپومانیک و یک دورهٔ افسردگی اساسی وجود داشته باشد؟

۱. اختلال دو قطبی II ۲. اختلال دو قطبی I ۳. افسردگی خویی ۴. ادواری خویی

۱۴- افسردگی با کدامیک از انتقال دهنده های عصبی زیر ارتباط دارد؟

۱. سطوح بالای نور اپی نفرین و دو پامین ۲. سطوح بالای نور اپی نفرین و سروتونین ۳. سطوح بالای ملاتونین و دو پامین ۴. سطوح بالای نور اپی نفرین و سروتونین

۱۵- داروهای ضد افسردگی چند روز زمان نیاز دارند تا افسردگی را کاهش دهند؟

۱. ۱۰ تا ۲۰ روز ۲. ۲۸ روز ۳. ۱۵ روز ۴. ۷ تا ۱۴ روز

۱۶- تریپتوفان، مادهٔ پیشتاز اصلی کدامیک از انتقال دهنده های عصبی زیر است؟

۱. اپی نفرین ۲. استیل کولین ۳. سروتونین ۴. دوپامین

۱۷- کدامیک از موارد زیر به شخص کمک می کند تا میزان اهمیت هیجانی یک محرك را بسنجد؟

۱. هیپوکامپ ۲. بادامه ۳. تalamوس ۴. هیپوتالاموس

۱۸- هورمون اصلی فشار روانی چیست؟

۱. کورتیزول ۲. تیروکسین ۳. آدرنالین ۴. گونادوتروفین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

روش تحقیقی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ -، مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

-۱۹- در کدام یک از نظریه های زیر، افکار و باورهای منفی علت عمدۀ افسردگی تلقی می گردد؟

- ۱. نظریه های روانکاوی
- ۲. نظریه های شناختی
- ۳. نظریه های کنش گرایی
- ۴. نظریه های زیستی

-۲۰- کدامیک از روانشناسان زیر اعتقاد دارد که افسردگی با سه گانگان منفی همراه است؟

- ۱. یونگ
- ۲. سلیگمن
- ۳. فروید
- ۴. آرون بک

-۲۱- کدامیک از عوامل زیر می تواند افزایش نشانه های شیدایی در طول زمان را پیش بینی کند؟

- ۱. محرومیت از پاداش
- ۲. هیجان ابراز شده
- ۳. عدم حمایت اجتماعی
- ۴. محرومیت از خواب

-۲۲- در کدام یک از فنون زیر، فرد ترغیب می شود در فعالیت های لذت بخشی شرکت جوید که می توانند افکار مثبتی را درباره خویشتن و زندگی بوجود آورند؟

- ۱. فعال سازی شناختی
- ۲. فعال سازی رفتاری
- ۳. فعال سازی روانی
- ۴. فعال سازی هیجانی

-۲۳- کدامیک از درمان های زیر، به خانواده در زمینه بیماری اختلال دوقطبی آموزش می دهد، پیام رسانی های خانواده را بالا می برد و مهارت های مساله گشایی را ایجاد می کند؟

- ۱. FFT
- ۲. CT
- ۳. IPT
- ۴. ECT

-۲۴- شایع ترین و پژوهش شده درمان زیستی یا غیر زیستی مورد استفاده در اختلالهای افسردگی کدام مورد زیر است؟

- ۱. درمان شناختی - رفتاری
- ۲. درمان بین فردی
- ۳. دارو درمانی
- ۴. درمان روان تحلیلی

-۲۵- کدامیک از داروهای زیر، نخستین ثبت کننده ای خلقي شناخته شده است؟

- ۱. دیپاکوت
- ۲. الانزاپین
- ۳. لیتیوم
- ۴. سرتالین

-۲۶- کدامیک از رویکردهای زیر، نوید بخش ترین درمان برای کاهش گرایشات خود کشی، به شمار می آیند؟

- ۱. تکاملی
- ۲. بینش محور
- ۳. شناختی - رفتاری
- ۴. زیستی

-۲۷- کدامیک از موارد زیر، مقدار لذتی اشاره دارد که در دم یا در لحظه ای حضور چیزی لذت بخش، تجربه می شود؟

- ۱. لذت پایانی
- ۲. لذت کاذب
- ۳. لذت انتظاری
- ۴. لذت ابتدایی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی گوایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گوایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ -، مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۲۸- افت عاطفی به چه چیزی اشاره دارد؟

۲. به فقدان تجلی درونی هیجان

۱. به فقدان تجلی بیرونی هیجان

۴. به فقدان تجلی درونی و معکوس هیجان

۳. به فقدان ماهیت هیجان

۲۹- حوزه‌ای که شامل جلوه‌ی بیرونی هیجانات و آواگری می‌شود چه نام دارد؟

۴. حوزه بیانی

۳. حوزه روانی

۲. حوزه تجربه‌ای

۱. حوزه دریافتی

۳۰- خطر ابتلا به اسکیزوفرنی در جمعیت عمومی چند درصد است؟

۲. ۲ درصد

۱. اندکی بیشتر از ۱ درصد

۴. اندکی کمتر از ۱ درصد

۳. ۸ درصد

۳۱- کدامیک از موارد زیر در رفتارهایی مانند گفتار، تصمیم‌گیری، هیجان و رفتارهای هدفمند نقش دارد؟

۴. قشر گیجگاهی

۳. قشر پیش پیشانی

۲. قشر آهیانه

۱. قشر پس سری

۳۲- یکی از عوامل محیطی که در میان نوجوانان به عنوان عامل خطر برای اسکیزوفرنی مورد بررسی قرار گرفته است کدام مورد زیر می‌باشد؟

۴. ال اس دی

۳. کاناپیس

۲. آمفاتامین

۱. کوکائین

۴. کاتاپلکسی

۳. دیستوتونی

۲. دیسکینزی

۱. آکاتزی

۳۴- در عارضه‌ای به نام نشانگان بدخیم نورولیپتیک، کدامیک از موارد زیر رخ می‌دهد؟

۲. ضربان قلب بالا می‌رود..

۱. ضربان قلب کاهش می‌یابد.

۴. کاهش فشار خون

۳. کاهش وزن

۳۵- داروی کلوزاپین، در کدام طبقه‌ی دارویی برای درمان اسکیزوفرنی جای دارد؟

۴. داروهای نسل چهارم

۳. داروهای نسل دوم

۲. داروهای نسل اول

۱. داروهای نسل اول

۳۶- حالت سرخوشی یا تحریک پذیری شدید مربوط به کدام اختلال است؟

۴. دو قطبی نوع ۲

۳. دوقطبی نوع ۱

۲. شیدایی

۱. افسردگی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ -، مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۷- کدامیک از اختلالات زیر، جزء اختلال‌های اصلی زیاده دوست در DSM-5 می‌باشد؟

- ۱. اختلال یادگار پرستی
- ۲. اختلال نعوظی
- ۳. اختلال دخول تناسلی - لگنی
- ۴. اختلال ارگاسمی

۳۸- افسردگی با سطح پایین با کدام انتقال دهنده ارتباط دارد؟

- ۱. اپی نفرین
- ۲. آدرنالین
- ۳. سروتونین
- ۴. استیل کولین

۳۹- گسترده ترین مداخله برای خوانش پریشی و محاسبه پریشی چه می‌باشد؟

- ۱. مداخلات شناختی
- ۲. مداخلات تربیتی
- ۳. مداخلات روانی
- ۴. مداخلات رفتاری

۴۰- کدامیک از موارد زیر با شروع ناگهانی مشکلات توجه و آگاهی تعریف می‌شود؟

- ۱. ام اس
- ۲. دلیریوم
- ۳. زوال عقل عروقی
- ۴. پارکینسون

1217240 - 96-97-1

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	ب	عادی
۲	ب	عادی
۳	ج	عادی
۴	د	عادی
۵	الف	عادی
۶	ب	عادی
۷	الف	عادی
۸	ب	عادی
۹	الف	عادی
۱۰	ج	عادی
۱۱	ب	عادی
۱۲	ب	عادی
۱۳	الف	عادی
۱۴	ب	عادی
۱۵	د	عادی
۱۶	ج	عادی
۱۷	ب	عادی
۱۸	الف	عادی
۱۹	ب	عادی
۲۰	د	عادی
۲۱	د	عادی
۲۲	ج	عادی
۲۳	الف	عادی
۲۴	ج	عادی
۲۵	ج	عادی
۲۶	ج	عادی
۲۷	الف	عادی
۲۸	الف	عادی
۲۹	د	عادی
۳۰	د	عادی
۳۱	ج	عادی
۳۲	ج	عادی
۳۳	الف	عادی
۳۴	ب	عادی
۳۵	ج	عادی
۳۶	ب	عادی
۳۷	الف	عادی
۳۸	ج	عادی
۳۹	ب	عادی
۴۰	ب	عادی

95-96-3



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰ - ۱۲۱۷۰۶۱ -

۱- نظریه افسردگی نشخوار ذهنی از کیست؟

۴. آبرامسون

۳. سلیگمن

۲. نولمن-هوکسما

۱. آرون بک

۲- آسیب در کارکرد کدام انتقال دهنده می تواند کاستی های لذت، انگیزش و انرژی در اختلال افسردگی را توضیح دهد؟

۴. نوراپی نفرین

۳. استنیل کولین

۲. سروتونین

۱. دوپامین

۳- کدام یک از گزینه های زیر در مورد افسردگی اساسی صحیح می باشد؟

۲. میزان همه گیری در زنان و مردان برابر است.

۱. تداوم پنج نشانه افسردگی حداقل به مدت یک ماه

۴. در بین فقرا سه برابر سایر افراد است.

۳. افکار و گرایشات خودکشی ندارند.

۴- کدام یک از گزینه های زیر، طبقه جدید از اختلال های خلقی در DSM5 می باشد؟

۴. ادوار خویی

۳. بی نظمی خلق ایدزایی

۲. ملال قبل از قاعده

۱. افسردگی پایدار

۵- سطوح بالای و گسترده پرخاشگری، دروغ گویی، سرقت، ویرانگری و خرابکاری و قساوت نسبت به سایرین و حیوانات مربوط به چه اختلالی است؟

۴. اختلال نافرمانی

۳. فزونکاری

۲. بیش فعالی

۱. اختلال سلوک

۱

۶- نوید بخش ترین درمان ویژه اختلال های زیاده دوست کدام است؟

۴. شناختی

۳. شناختی-رفتاری

۲. رفتاری

۱. روان کاوی

۴. فرونشینی

۳. اوچ

۲. تهییج

۱. میل

۷- دومین مرحله در چرخه پاسخ جنسی کاپلان چیست؟

۴. مسترز و جانسون

۳. هال و همکاران

۲. گارلند و دافر

۱. بامیستر و باتلر

۴. آموزش مهارت‌های اجتماعی

۲. آموزش مهارت‌های اجتماعی

۱. خانواده درمانی

۴. ترمیم شناختی

۳. درمان دارویی

۸- درمان جنسی با هدف از بین بردن عادات قدیمی و آموزش مهارت‌های جدید توسط چه کسانی معرفی شد؟

۴. افت عاطفی

۳. گفتار در هم ریخته

۲. توههمها

۱. مردم گریزی

۹- کدام روش درمانی با هدف کاهش هیجان ابرازی، در پیشگیری از بازگشت اختلال اسکیزوفرنی با ارزش است؟

۴. افتابی

۲. تووههمها

۴. افتابی

۳. گفتار در هم ریخته

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱

۱۱- حوزه کار کدام نوع بررسی ها، ژن های ویژه ای است که با اسکیزوفرنی ارتباط دارند؟

- ۱. بررسی دو قلوها
- ۲. بررسی فرزندخوانگی ها
- ۳. بررسی خانواده پرخطر
- ۴. بررسی رابطه نگر

۱۲- این اعتقاد که شخص دیگری- معمولاً یک فرد کاملاً غریبه با جایگاه اجتماعی بالا- دلداده‌ی بیمار است مربوط به کدام هذیان است؟

- ۱. تعقیب و گریز
- ۲. شهوانی
- ۳. انتشار فکر
- ۴. بزرگ منشی

۱۳- بی انگیزگی و بی علاقگی یا ناتوانی ظاهری در تداوم فعالیتهای روزمره عادی نظیر کار یا مدرسه یا فعالیتهای اجتماعی، به کدام یک از نشانه های منفی اسکیزوفرنی مربوط است؟

- ۱. فقدان لذت
- ۲. مردم گریزی
- ۳. بی ارادگی
- ۴. افت تحصیلی

۱۴- آشفتگی در افکار، هیجانات و رفتار، مشخصه کدام اختلال است؟

- ۱. اسکیزوفرنی
- ۲. اختلال دو قطبی
- ۳. وسوس
- ۴. افسردگی عمدہ

۱۵- "این عقیده که بسیاری از عوامل خطر بار برای ابتلا به افسردگی محصول سطوح پایین تقویت است" مربوط به کدام روش درمان است؟

- ۱. درمان رفتار زناشویی
- ۲. شناخت درمانی
- ۳. درمان مبتنی بر فعال سازی رفتاری
- ۴. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

۱۶- طبق نظر فارل و شاو، آموزش آگاهی هیجانی برای درمان کدام اختلال شخصیت مفید است؟

- ۱. شخصیت اسکیزوئید
- ۲. شخصیت اسکیزوتاپیال
- ۳. شخصیت وابسته
- ۴. شخصیت مرزی

۱۷- برای افراد مبتلا به اختلال شخصیت که سنی پایین تر از ۳۰ سال دارند، مهمترین مسئله کدام است؟

- ۱. درگیری های فردی
- ۲. اعتیاد به مواد مخدر
- ۳. احتمال خودکشی
- ۴. استرس

۱۸- بیان اغراق آمیز هیجانات، مشخصه افراد مبتلا به کدام اختلال شخصیت است؟

- ۱. شخصیت نمایشی
- ۲. شخصیت ضد اجتماعی
- ۳. شخصیت اسکیزوئید
- ۴. شخصیت مازوخیستی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

روش تحقیقی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱

۱۹- کدام گزینه در مورد اختلال شخصیت نمایشی و مرزی درست است؟

۱. بیشتر در زنان شایع است.
۲. بیشتر در مردان شایع است.
۳. بین زن و مرد یکسان است.
۴. شخصیت مرزی در زنان و نمایشی در مردان شایع تر است.

۲۰- کدام اختلال با شروع ناگهانی و مشکلات توجه و آگاهی تعریف می شود و تیرگی هشیاری، توهمندی و خطاها ادراکی را به سرعت و ناگهان نشان می دهد؟

۱. دلیریوم
۲. زوال عقل عروقی
۳. زوال عقل با اجسام لوى
۴. زوال عقل گیجگاهی

۲۱- شایع ترین اختلال عصبی شناختی است که زن ها نقش اصلی در سبب شناسی آن دارند؟

۱. پارکینسون
۲. دلیریوم
۳. آלצהيمر
۴. زوال عقل

۲۲- مورد توجه ترین اختلال یادگیری چیست؟

۱. محاسبه پريشي
۲. خوانش پريشي
۳. عمليات رياضي
۴. اختلال زبان

۲۳- الگوی پایداری از سوءظن و عدم اطمینان به دیگران ویژگی اصلی کدام اختلال شخصیت است؟

۱. وابسته
۲. پارانويايی
۳. ضد اجتماعي
۴. اسکیزوئيد

۲۴- کدام گزینه از عواملی است که سبب ایجاد اختلال وابسته می شود؟

۱. ابتلاء به بيماري در دوره كودكى
۲. وجود والدين بسيار بي تفاوت
۳. والدين سخت گير
۴. والدين خشن

۲۵- به طيف بزرگی از تمایلات و رفتارهای جنسی نابهنجاری گفته می شود که برای خود فرد ، شريك جنسی یا برای کل جامعه مضر است؟

۱. اختلال تحریک جنسی
۲. پارافيلیها
۳. اختلالات ارگاسم
۴. اختلالات هویت جنسی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱

- ۲۶- چه درمانی برای اختلال وحشت شبانه و خوابگردی مناسب است؟

- ۱. روان درمانی فردی و خانوادگی
- ۲. دارو درمانی
- ۳. شرطی سازی
- ۴. از بین بُردن رویدادهای استرس زا

- ۲۷- کدام گزینه در مورد افراد مبتلا به اختلال وحشت شبانه صحیح است؟

- ۱. تمام رؤیاهای دیده شده را بخاطر می آورند.
- ۲. اختلال در تنفس دارند.
- ۳. ثلث اول شب در حالت خواب عمیق هستند.
- ۴. با هشیاری به رفتارها پیچیده دست می زنند.

- ۲۸- از بین رفتن ناگهانی قوام عضلانی یا تجربه کاتاپلسکی از علائم کدام اختلال است؟

- ۱. نارکولپسی
- ۲. دیس سومنیا
- ۳. آپنه
- ۴. پاراسومینا

- ۲۹- درمان کدام اختلال از مشکل ترین مسائل در اختلالات خواب است؟

- ۱. کابوس
- ۲. وحشت شبانه
- ۳. حمله خواب
- ۴. بی خوابی اولیه

- ۳۰- طبق تبیین کدام دیدگاه، مشکلات نعوظی از تعارضات اودیپی حل نشده مربوط به ترس از اختگی ناشی می شود؟

- ۱. شناخت-رفتارگرایان
- ۲. رفتارگرایان
- ۳. روان تحلیل گران
- ۴. شناخت گرایان

- ۳۱- کدام یک از اصطلاحات زیر در ارتباط با خودکشی به مراتب رایج تر است؟

- ۱. اقدام به خودکشی
- ۲. خودکشی کامل
- ۳. خودکشی ناموفق
- ۴. اندیشه پردازی

- ۳۲- بیزاری درمانی و تغییر تخیلات جنسی متمرکز بر درمان کدام اختلال جنسی است؟

- ۱. هویت جنسی
- ۲. مبدل پوشی
- ۳. اختلال نعوظی
- ۴. پارافیلیاها

- ۳۳- بیش نظاره گری خویشتن مطرح شده توسط مسترز و جانسون مربوط به کدام نوع تبیین اختلال نعوظی است؟

- ۱. تبیین شناختی
- ۲. تبیین روان تحلیلی
- ۳. تبیین انسان گرایی
- ۴. تبیین رفتاری

- ۳۴- جمله "من در ریاضی توانایی ندارم" مربوط به کدام سبک اسنادی است؟

- ۱. اسناد کلی
- ۲. اسناد ناپایدار
- ۳. اسناد اختصاصی
- ۴. اسناد کلی و پایدار

- ۳۵- در کدام نوع اختلال، شخص باقیستی حداقل یک دوره افسردگی عمدی و دست کم یک دوره شیدایی خفیف داشته باشد؟

- ۱. اختلال ادوارخویی
- ۲. دوقطبی نوع ۱
- ۳. دوقطبی نوع ۲
- ۴. شیدایی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
۱۲۱۷۲۴۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱

۳۶- گسترده ترین مداخله برای خوانش پریشی کدام است؟

۱. آموزشی ۲. تربیتی ۳. دارویی ۴. شناختی

۳۷- مصرف کدام ماده در نوجوانان عامل خطر برای اسکیزوفرنی به حساب می آید؟

۱. تریاک ۲. هروئین ۳. کاناپیس ۴. آمفتامین ها

۳۸- افزایش حساسیت به گیرنده های دوپامین در مغز با کدام نشانه های اسکیزوفرنی رابطه دارد؟

۱. منفی ۲. مثبت ۳. بی ارادگی ۴. افت عاطفی

۳۹- اختلال کابوس جزء کدام دسته از اختلال های خواب می باشد؟

۱. اختلال اولیه خواب ۲. اختلال خواب مربوط به اختلال روانی دیگر

۳. اختلال خواب ناشی از یک بیماری جسمی ۴. اختلال خواب ناشی از مواد

۴۰- در کدامیک از نظریه های زیر مبدل پوشی را مانند تمامی رفتار یاد گرفته شده می دانند؟

۱. نظریه خانوادگی ۲. مدل های رفتاری ۳. روان تحلیلی ۴. روان درمانی

1217240 - 95-96-3

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	ب	عادی
۲	الف	عادی
۳	د	عادی
۴	ج	عادی
۵	الف	عادی
۶	ج	عادی
۷	ب	عادی
۸	د	عادی
۹	الف	عادی
۱۰	ب	عادی
۱۱	الف، ب، ج، د	عادی
۱۲	الف، ب، ج، د	عادی
۱۳	ج	عادی
۱۴	الف	عادی
۱۵	ج	عادی
۱۶	د	عادی
۱۷	ج	عادی
۱۸	الف	عادی
۱۹	الف	عادی
۲۰	الف	عادی
۲۱	ج	عادی
۲۲	ب	عادی
۲۳	ب	عادی
۲۴	الف	عادی
۲۵	ب	عادی
۲۶	الف	عادی
۲۷	ج	عادی
۲۸	الف	عادی
۲۹	د	عادی
۳۰	ج	عادی
۳۱	د	عادی
۳۲	ب	عادی
۳۳	الف	عادی
۳۴	ج	عادی
۳۵	ج	عادی
۳۶	ب	عادی
۳۷	ج	عادی
۳۸	ب	عادی
۳۹	الف	عادی
۴۰	ب	عادی

95-96-2



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰ -

۱- اختلال شخصیت پارانوئید مربوط به کدام یک از دسته های زیر می باشد؟

۴. پر زرق و برق

۳. ترسو یا مضطرب

۲. عجیب و غریب

۱. هیجانی و خودنما

۲- علامت بارز این اختلال تنها ی مفرط و پرهیز از روابط اجتماعی است؟

۴. ضد اجتماعی

۳. اجتنابی

۲. اسکیزووتایپال

۱. اسکیزوئید

۳- این اختلال شخصیت الگوی فراگیری از بی ثباتی در روابط بین فردی در تصویر خویشتن و در عاطفه و تکانش وری بارز تعریف می شود؟

۴. نمایشی

۳. خود شیفتنه

۲. مرزی

۱. ضد اجتماعی

۴- به نظر می رسد موثرترین مداخلات روان شناختی، آنها ی هستند که به چه چیزی معطوف می شوند؟

۴. روان شناسی

۳. جامعه

۲. خانواده

۱. خود فرد

۵- مهمترین درمان نارکولیپسی کدام است؟

۴. شرطی شدن مجدد

۳. شناختی-رفتاری

۲. دارودرمانی

۱. آرمیدگی

۶- افراد مبتلا به کدام اختلال شخصیت نیاز دائم به اடکاء دارند؟

۴. وسواسی

۳. ضد اجتماعی

۲. مرزی

۱. وابسته

۷- مبتلایان به اختلال هویت جنسی در برابر کدام درمان مقاوم هستند؟

۴. روان درمانی

۳. درمان شناختی

۲. بیزاری درمانی

۱. دارودرمانی

۸- صفت کمال گرایی در مبتلایان به کدام اختلال شخصیت دیده می شود؟

۴. پارانوئید

۳. وسواسی-جبری

۲. اسکیزووتایپال

۱. اسکیزوئید

۹- معمولاً خواب با کدام یک از انواع خواب شروع می شود؟

۲. خواب متناقض

۴. خواب REM

۱. خواب با حرکات سریع چشم

۳. خواب NONREM

۴. خواب با امواج کوتاه

۳. REM

۲. NON REM

۱. متعارف

۱۰- منظور از خواب متناقض کدام یک از انواع خواب ها می باشد؟

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

روشه تحقیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱

۱۱- اختلال های خواب به طور کلی بر اساس سبب شناسی آنها به چند بخش عمده طبقه بندی می شوند؟

۲ . ۴ ۴ . ۳ ۳ . ۲ ۵ . ۱

۱۲- نارکولپسی مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. بی خوابی ۲. بد خوابی ۳. حمله خواب ۴. وقفه تنفسی

۱۳- به حالتی گفته می شود که در آن فرد در ثلث اول شب در حالت خواب عمیق به طور ناگهانی از خواب بیدار می شود؟

۱. کابوس ۲. خواب گردی ۳. وحشت شبانه ۴. بی خوابی

۱۴- در کدام یک از اختلالات جنسی بیمار به وسیله استفاده از اشیای بی جان به ارضای تمایلات جنسی خود می پردازد؟

۱. سادیسم ۲. مازوخیسم ۳. یادگار خواهی ۴. سادیسم مازوخیسم

۱۵- GID مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. اختلال هویت جنسی ۲. اختلال وسواس ۳. اختلال اضطراب فراگیر ۴. اختلال شخصیت

۱۶- مهم ترین نظریه پذیرفته شده در مورد اختلال هویت جنسی کدام یک از گزینه ها می باشد؟

۱. نظریه یادگیری ۲. نظریه شناختی ۳. نظریه روان کاوی ۴. نظریه انسان گرایی

۱۷- رایج ترین علت اختلال نعوظی در مردان چیست؟

۱. شناختی ۲. روان شناختی ۳. جسمی ۴. ژنتیکی

۱۸- کدام یک از اختلال های زیر به DSM5 اضافه شده است؟

۱. ادوارخویی ۲. وسواس فکری و عملی ۳. بی نظمی خلق ایدزایی ۴. اضطراب خاص

۱۹- اختلال افسردگی اساسی در DSM5 به مدت حداقل چند هفته می باشد؟

۱. ۲ . ۱ ۲ . ۳ ۳ . ۲ ۵ . ۴

۲۰- اختلال عاطفی فصلی مربوط به کدام هورمون های زیر می باشد؟

۱. رشد ۲. تروکسین ۳. آندروژن ۴. ملاتونین

۲۱- اساساً بسیار شایع است که افسردگی به دنبال کدام بیماری پدیدار می شود؟

۱. فشار خون ۲. آسم ۳. قلبی - عروقی ۴. زخم معده

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

روش تحقیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۴۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۹۸ - روانشناسی ۱۲۱۱۰۹۸

روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱

-۲۲- منظور از هیپومانی کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. شیدایی متوسط ۲. شیدایی خفیف ۳. شیدایی شدید ۴. دو قطبی خفیف

-۲۳- اختلال افسردگی پایدار دست کم باید چه مدت پایدار بماند؟

۱. ۲ هفته ۲. ۲ سال ۳. ۱ سال ۴. ۱ هفته

-۲۴- کدام یک از اختلالهای زیر در زمرة اختلالهایی هستند که بیشترین وراثت پذیری را دارند؟

۱. افسردگی ۲. اضطراب ۳. دو قطبی ۴. فوبی

-۲۵- کدام یک از انتقال دهنده های زیر در اختلالهای خلقی احتمالی شان مورد مطالعه قرار گرفته است؟

۱. سروتونین ۲. اپی نفرین ۳. هیستامین ۴. ملاتونین

-۲۶- کدام یک از انتقال دهنده های زیر نقش مهمی در میزان حساسیت دستگاه پاداش در مغز ایفا می کند؟

۱. هیستامین ۲. نوراپی نفرین ۳. سروتونین ۴. دوپامین

-۲۷- کدام گزینه به شخص کمک می کند تا میزان اهمیت هیجانی یک محرك را بسنجد؟

۱. تalamos ۲. بادمه ۳. هیپوتالاموس ۴. هیپو کامپ

-۲۸- کدام گزینه هورمون اصلی فشار روانی است؟

۱. پرولاکتین ۲. اکسی توسین ۳. تیروکسین ۴. کورتیزول

-۲۹- کدام یک از افراد زیر اعتقاد دارد که افسردگی با ۳ گانگان منفی همراه است؟

۱. آدلر ۲. راجرز ۳. فروید ۴. بک

-۳۰- کدام گزینه درمورد تثبیت کننده خلق صحیح می باشد؟

۱. به داروهایی که نشانه های شیدایی را کاهش می دهند.
۲. به داروهایی که نشانه های شیدایی را افزایش می دهند.
۳. به داروهایی که نشانه های افسردگی را کاهش می دهند.
۴. به داروهایی که نشانه های افسردگی را افزایش می دهند.

-۳۱- پژوهش شده ترین درمان برای اختلال دو قطبی کدام گزینه می باشد؟

۱. دیازپام ۲. لیتیوم ۳. امی پرامین ۴. آمی تریپتیلین

-۳۲- کدام گزینه جزء نشانه های مثبت اسکیزو فرنیا می باشد؟

۱. هذیان ۲. اوتیسم ۳. خلق نامناسب ۴. دو گانگی احساس

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۱۰۹۸

روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱

۳۳- نظریه نشخوار ذهنی از کیست؟

۱. بک ۲. سوزان نولن- هوکسما ۳. سلیگمن ۴. آبرامسون

۳۴- کدامیک از موارد زیر، مقدار لذتی اشاره دارد که در دم یا لحظه‌ی حضور چیزی لذت بخش تجربه می‌شود؟

۱. لذت کاذب ۲. لذت پایانی ۳. لذت انتظاری ۴. لذت ابتدایی

۳۵- بررسی‌های مربوط به معایینات پس از مرگ روی مغز ابتلا به کدام اختلال همواره نشان دهنده بطن‌های بزرگ بوده‌اند؟

۱. اسکیزوفرنیا ۲. PTSD ۳. وسوس ۴. افسردگی

۳۶- منظور از داروهای نوروپیتیک کدام گزینه می‌باشد؟

۱. ضد اضطراب‌ها ۲. ضد افسردگی‌ها ۳. ضد روان‌رنجور ۴. ضد روان‌پریشی

۳۷- کدام یک از داروها از دهه ۱۹۵۰ به طور گسترده‌ای برای درمان اسکیزوفرنی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

۱. ریتالین ۲. فلوکسیتین ۳. فنو‌تیازین ۴. متیل فنیدیت

۳۸- نوید بخش ترین درمان ویژه اختلال‌های زیاده دوست کدام گزینه می‌باشد؟

۱. رفتاری ۲. شناختی - رفتاری ۳. شناختی - رفتاری ۴. روان‌کاوی

۳۹- عبارت است از وجود یک الگوی دائمی از بی توجهی و یا فزون کاری و تکانش گری که نسبت به آنچه در کودکان متعلق به یک دوره سنی مشاهده می‌شود؟

۱. ADHD ۲. SAD

۳. اختلال شخصیت ضد اجتماعی ۴. اختلال سلوک

۴۰- در این اختلال کارکرد هوشی و عقلی بیمار کاهش می‌یابد و حافظه، تفکر انتزاعی و قضاؤت او را به تباہی می‌گذارد؟

۱. آلزایمر ۲. زوال عقل ۳. روان‌آشفتگی ۴. دلیریوم

1217240 - 95-96-2

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	ب.	عادی
۲	الف	عادی
۳	ب.	عادی
۴	ب.	عادی
۵	ب.	عادی
۶	الف	عادی
۷	د	عادی
۸	ج	عادی
۹	ج	عادی
۱۰	ج	عادی
۱۱	ج	عادی
۱۲	ج	عادی
۱۳	ج	عادی
۱۴	ج	عادی
۱۵	الف	عادی
۱۶	الف	عادی
۱۷	ب.	عادی
۱۸	ج	عادی
۱۹	الف	عادی
۲۰	د	عادی
۲۱	ج	عادی
۲۲	ب.	عادی
۲۳	ب.	عادی
۲۴	ج	عادی
۲۵	الف	عادی
۲۶	د	عادی
۲۷	ب.	عادی
۲۸	د	عادی
۲۹	د	عادی
۳۰	ب.	عادی
۳۱	ب.	عادی
۳۲	الف	عادی
۳۳	ب.	عادی
۳۴	ب.	عادی
۳۵	الف	عادی
۳۶	د	عادی
۳۷	ج	عادی
۳۸	ج	عادی
۳۹	الف	عادی
۴۰	ب.	عادی

95-96-1



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

 رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
 روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰ - ۱۲۱۷۰۶۱

۱- دو نوع گستردگی از اختلال های خلق که در DSM-۵ مطرح شده اند کدامند؟

۱. اختلال بی نظمی خلق ایدایی
 ۲. اختلال ملال پیش قاعده‌گی
 ۳. اختلال دوقطبی
 ۴. ادواری خوبی

۲- یک دوره افسردگی اساسی اگر درمان نشود چند ماه طول می کشد؟

۱. ۵
 ۲. ۶
 ۳. ۴
 ۴. ۳

۳- اختلال عاطفی فصلی با تغییر در کدام انتقال دهنده عصبی مغز ارتباط دارد؟

۱. سروتونین
 ۲. ملاتونین
 ۳. دوپامین
 ۴. اپی نفرین

۴- برای تشخیص کدام اختلال، یک دوره افسردگی عمدی و یک دوره شیدایی خفیف باید رخ دهد؟

۱. دو قطبی نوع ۱
 ۲. دو قطبی نوع ۲
 ۳. ادواری خوبی
 ۴. افسردگی اساسی

۵- براساس بررسی های مربوط به فعال سازی کارکردی مغز، فعالیت کدام بخش در افراد مبتلا به افسردگی اساسی (MDD) بالاست؟

۱. کمربند قدامی
 ۲. بادامه
 ۳. قشر پیش پیشانی
 ۴. هیپوکامپ

۶- کدام یک از عوامل بین فردی درون خانواده منجر به عود افسردگی می شود؟

۱. حمایت اجتماعی بالا
 ۲. فقدان حمایت اجتماعی
 ۳. هیجان ابراز شده پائین
 ۴. هیجان ابراز شده بالا

۷- چه کسی اعتقاد دارد که افسردگی با سه گانگان منفی درباره خود، جهان و آینده همراه است؟

۱. متالسکی
 ۲. بک
 ۳. آلوی
 ۴. هاروی

۸- در کدام روش درمان افسردگی، بیمار ترغیب می شود که در فعالیت های لذت بخش شرکت کند؟

۱. فعال سازی رفتاری
 ۲. درمان شناختی (CT)
 ۳. روان درمانی بین فردی
 ۴. جلسات گروهی (IPT)

۹- کدام داروی زیر به عنوان نخستین ثبت کننده خلق شناخته می شود؟

۱. سرتالین
 ۲. فلوگزتین
 ۳. لیتیوم
 ۴. الازپین

۱۰- کدامیک از انتقال دهنده های عصبی در اختلال های خلقی نقش دارند؟

۱. نور اپی نفرین
 ۲. دوپامین
 ۳. سروتونین
 ۴. هر سه مورد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۱۱- احتمال مرگ ناشی از خودکشی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی چند برابر جمعیت عمومی است؟

۹ . ۴

۷ . ۳

۱۲ . ۲

۱۰ . ۱

۱۲- کدام مورد از نشانه های منفی اسکیزوفرنی نیست؟

۴. ناگویی

۳. توهمنات

۲. بی ارادگی

۱. افت عاطفی

۱۳- آمیزه ای از اسکیزوفرنی و اختلال های خلق چه نامیده می شود؟

۲. روان پریشی کوتاه مدت

۱. اسکیزوفرنی شکل

۴. اختلال هذیانی

۳. اسکیزوافکتیو

۱۴- مطابق نظریه دوپامین، گیرنده های دوپامینی افراد اسکیزوفرن چه اندازه است؟

۴. کمتر از حد لازم

۳. متوسط

۲. زیاد

۱. کم

۱۵- کدام مورد، از خصوصیات مادر اسکیزوفرنی زاد نمی باشد؟

۴. تعارض آفرین

۳. اضطرابی

۲. سلطه گر

۱. سرد

۱۶- اولین داروی ضد روان پریشی نسل دوم برای درمان اسکیزوفرنی کدام است؟

۴. کلرپرومازین

۳. اولانزاپین

۱. کلوzapین

۱۷- وقتی که از فرد مبتلا به اسکیزوفرنی خواسته می شود تا صحت باورهای هذیانی خویش را نسبت به افراد غیر مبتلا بیازماید، از کدام رویکرد درمانی استفاده شده است؟

۲. آموزش مهارت های اجتماعی

۱. رفتاردرمانی شناختی

۴. ترمیم شناختی

۳. خانواده درمانی

۱۸- رویکرد رفتاری در خصوص سبب شناسی اختلال های زیاده دوست بر کدام مورد تأکید می کند؟

۴. شرطی سازی کنشگر

۳. رفتار سرمشق

۲. شرطی شدن کلاسیک

۱. شرطی شدن عامل

۱۹- کدام گزینه در شمار اختلال های بروئی شده مربوط به اختلال های دوران کودکی نمی باشد؟

۴. اضطراب

۳. تکانشوری

۲. فزونکاری

۱. پرخاشگری

۲۰- گسترده ترین مداخله برای خوانش پریشی و محاسبه پریشی چیست؟

۲. مداخلات تربیتی

۱. سرمش دهی

۴. درمان شناختی-رفتاری

۳. مداخلات بالینی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

روشه تحقیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱

۲۱- کدام دامنه سنی نسبت به گروه های سنی دیگر در حالت کلی اختلال های روانی کمتری دارند؟

۱. بالای ۶۵ سال ۲. زیر ۵۵ سال ۳. بالای ۷۰ سال ۴. زیر ۲۰ سال

۲۲- در سبب شناسی بیماری آلزایمر کدام عامل نقش اصلی ایفا می کند؟

۱. سابقه افسردگی ۲. استرس ۳. زن ها ۴. سالخوردگی

۲۳- اختلال شخصیت اسکیزوئید و اسکیزوتاپیال در زیر مجموعه کدام دسته اختلالات شخصیتی قرار دارند؟

۱. هیجانی و خودنما ۲. ترس و مضطرب ۳. عجیب و غریب ۴. اسکیزوفرنیا

۲۴- سطح شیوع کدام اختلال شخصیت با افزایش سن پائین می آید؟

۱. پارانوئید ۲. وابسته ۳. وسواسی-جبری ۴. ضداجتماعی

۲۵- جمله‌ی «من برای بقاء نیازمند به دیگران-به ویژه فرد قوی- هستم.» جزو باورهای کدام تیپ شخصیتی می باشد؟

۱. وابسته ۲. ضعیف ۳. اسکیزوئید ۴. خودشیفته

۲۶- ابتلاء به اختلال شخصیت مرزی چند درصد جمعیت عمومی را تشکیل می دهد؟

۱. ۴ ۲. ۳ ۳. ۲ ۴. ۱

۲۷- در کدام نوع درمان، شناخت ها و طرح واره های شناختی زیربنایی که منجر به رفتارهای نامناسب می گردند، تغییر می یابند؟

۱. رفتاری ۲. شناختی-رفتاری ۳. آموزش آگاهی هیجانی ۴. شناختی

۲۸- براساس پژوهش های انجام شده کدام مسئله برای افراد مبتلا به بی اشتها یی روانی یک مشغله ذهنی طولانی مدت است؟

۱. ترس از چاق شدن ۲. کنترل وزن ۳. قطع عادت ماهانه ۴. امتناع از نگهداری وزن

۲۹- کدام گزینه از ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای پراشتها یی روانی نمی باشد؟

۱. دوره های تکراری پرخوری ۲. ادراک های جسمی آشفته در مورد وزن و شکل بدن ۳. تأثیر زیاد وزن بر روی ارزیابی از خویشتن ۴. رفتارهای نامناسب جبرانی بعد از خوردن

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

 رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
 ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
 ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۰- نقش محور HPA (هیپوتالاموس - هیپوفیز - قشر فوق کلیوی) چیست؟

۲. آزاد کردن سروتونین

۱. واکنش در برابر فشار روانی

۴. کنترل هورمونهای اضافی در بدن

۳. تنظیم هیجانی

۳۱- تبیین های روان تحلیل گری تثبیت در کدام مرحله را موجب ابتلاء به بی اشتهاهی روانی می دانند؟

۴. نهفتگی

۳. مقعدی

۲. دهانی

۱. آلتی

۳۲- کدام داروها برای درمان اختلالات تغذیه ای سودمند هستند؟

۴. داروهای ضداستفراغ

۳. داروهای ضداضطراب

۲. لیتیوم

۱. ضد افسردگی ها

۳۳- خواب عمیق کدام مراحل خواب NON-REM را شامل می شود؟

۴. ۴۰۳

۳. ۲۰۱

۴. ۲

۱. ۳۰۱

۳۴- کدام یک از روش های زیر شیوه مؤثری در درمان بی خوابی اولیه است؟

۲. درمان مجدد محدودسازی خواب

۱. دارودرمانی

۴. شرطی شدن مجدد

۳. درمان آرمیدگی

۳۵- بیماران مبتلا به نارکولپسی با کمبود کدام نوروترانسمیتر مواجه هستند؟

۴. استیل کولین

۳. سروتونین

۲. نوراپی نفرین

۱. هیپوکرتین

۳۶- کدام نوع درمان برای اختلال وحشت شبانه و خواب گردی مناسب است؟

۲. روان درمانی فردی و خانوادگی

۱. شرطی سازی

۴. از بین بردن رویدادهای استرس زا

۳. دارو درمانی

۳۷- اولین اختلال در طبقه بندی اختلالات مربوط به میل جنسی کدام است؟

۲. اختلال میل جنسی کم کار

۱. انزال زودرس

۴. اختلال بیزاری جنسی

۳. واژینیسم

۳۸- مبتلایان به انواع اختلالات پارافیلی طی چه مدت می توانند تشخیص داده شوند؟

۴. ۲ سال

۳. عماه

۲. ۱ ماه

۱. ۱ سال

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۹- در سبب شناسی روان تحلیلی یادگارخواهی جنسی همراه با مبدل پوشی، کدام مکانیزم دفاعی قابل مشاهده است؟

۴. برگشت

۳. واپس زنی

۲. فرافکنی

۱. سرکوب

۴۰- اختلال هویت جنسی در کدام سطوح سنی بیشتر شایع است؟

۴. نوجوانان

۳. بزرگسالان

۲. کودکان

۱. جوانان

1217240 - 95-96-1

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	ج	عادی
۲	الف	عادی
۳	ب	عادی
۴	الف	عادی
۵	ب	عادی
۶	الف، ب، ج، د	عادی
۷	ب	عادی
۸	الف	عادی
۹	ج	عادی
۱۰	د	عادی
۱۱	الف، ب، ج، د	عادی
۱۲	ج	عادی
۱۳	ج	عادی
۱۴	ب	عادی
۱۵	ج	عادی
۱۶	الف	عادی
۱۷	الف	عادی
۱۸	ب	عادی
۱۹	د	عادی
۲۰	ب	عادی
۲۱	الف	عادی
۲۲	ج	عادی
۲۳	ج	عادی
۲۴	د	عادی
۲۵	الف	عادی
۲۶	الف	عادی
۲۷	د	عادی
۲۸	ب	عادی
۲۹	ب	عادی
۳۰	الف	عادی
۳۱	ب	عادی
۳۲	الف	عادی
۳۳	د	عادی
۳۴	ج	عادی
۳۵	الف	عادی
۳۶	ب	عادی
۳۷	ب	عادی
۳۸	ج	عادی
۳۹	د	عادی
۴۰	ب	عادی

94-95-2



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰ -

- بر طبق نتایج پژوهش های برونيش و ويچن ۱۹۹۴ چند درصد افرادی که هیچ اختلال روانی نداشتند تفکراتی در مورد خودکشی نشان دادند؟

۱. ۲ درصد ۲. ۸ درصد ۳. ۶۵ درصد ۴. ۶۹ درصد

- کدام دانشمند، احساس گناه، نشانه های هذیانی افسرده وار و ناآرامی درونی و بی قراری را از جمله ویژگی های روانشناسی افرادی می داند که تلاش هایی برای خود کشی دارند؟

۱. ابرامسون ۲. بک ۳. دورکیم ۴. ولفر سدورف

- در اواسط دهه ۱۹۸۰ کدام اختلال بوسیله روزنال و همکارانش مطرح گردید؟

۱. اختلال دو قطبی ۲. اختلال عاطفی فصلی ۳. اختلال ادواری خوبی ۴. اختلال افسرده اساسی

- سطح پایین ملاتونین باعث ایجاد کدام حالت در فرد می شود؟

۱. خلق پایین ۲. هیپومانی ۳. خلق بالا و سرخوشی ۴. غمگینی مفرط

- کدام دسته از اختلالات تاریخچه پژوهشی کوتاهی را به خود اختصاص داده است؟

۱. عاطفی فصلی ۲. افسرده خوبی ۳. دو قطبی نوع I ۴. مانیک دپرسیو

- فرد مبتلا به کدام اختلال ممکن است بوسیله اعمال دیگران ناکامی را تجربه کند؟

۱. مانیک ۲. افسرده اساسی ۳. اسکیزوفرنی ۴. افسرده گی فصلی

- کدامیک از اختلالات زیر اختلال مزمنی است که حداقل ۲ سال ادامه دارد و فرد مبتلا، هیپومانی را به صورت دوره ای تجربه می کند؟

۱. دو قطبی ۲. عاطفی فصلی ۳. ادواری خوبی ۴. افسرده گی

- لیتیوم برای درمان کدام اختلال موثر می باشد؟

۱. استرس ۲. اضطراب ۳. افسرده گی ۴. دو قطبی

- کدام نوع اسکیزوفرنی هم اکنون در کشورهای صنعتی به ندرت دیده می شود؟

۱. آشفته ۲. پارانویید ۳. باقی مانده ۴. کاتاتونیک

- فقر گفتار، بی حالتی عاطفی، فقدان لذت، انزوا از ویژگی کدام دسته از اسکیزوفرنی می باشد؟

۱. پارانوئید ۲. آشفته ۳. مثبت ۴. منفی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱ -

- ۱۱- بر اساس مطالعات لیدل و همکاران کاهش RCBF در کرتکس پره فرونتال میانی و چپ منجر به چه عاملی می شود؟

- ۱. فقر روانی حرکتی
- ۲. افزایش مسائل مربوط به حرکت
- ۳. کاهش سازمان نیافتگی
- ۴. افزایش هیجانات

- ۱۲- بر چه اساسی می توان ناهمانگی دو قلوهای یک تخمکی را درابتلا به اسکیزوفرنی تمیز داد؟

- ۱. بررسی بطن ها و کاهش حجم کرتکس تمپورال
- ۲. بررسی لوب پاریتال تحتانی چپ
- ۳. کاهش فعالیت آلفا در نیمکره چپ
- ۴. افزایش حجم کرتکس تمپورال

- ۱۳- بر طبق پژوهش بارچ و همکاران (۲۰۰۲) کدام ناحیه در بیماران اسکیزوفرنی در دو حافظه کاری و بلند مدت کاهش فعالیت را نشان می دهد؟

- ۱. کرتکس سینگولار قدامی دو طرف
- ۲. لوب تمپورال میانی
- ۳. کرتکس پره فرونتال دورسولا ترال راست
- ۴. کرتکس پره فرونتال میانی و چپ

- ۱۴- ممانعت از جذب کدام دسته از داروها در مکان گیرنده پس سیناپسی از انتقال دوپامین جلوگیری می کند؟

- ۱. ترازادون
- ۲. فنوباربیتال
- ۳. سرترالین
- ۴. فنوتیازین

- ۱۵- بررسی های پس از مرگ بیماران اسکیزوفرنیک کاهش در تراکم نورون های کدام قسمت را نشان می دهند؟

- ۱. هیپوکامپ
- ۲. تalamوس
- ۳. پیشانی
- ۴. هیپوتalamوس

- ۱۶- چه کسی معتقد بود که هذیان ها، اعمال گفتاری خالی هستند که به دنیا و خویشتن معطوف نیستند و آنها نماد چیزی نیستند؟

- ۱. بنتال
- ۲. همزی
- ۳. بریوس
- ۴. آدل دیاموند

- ۱۷- کدام دارو اثر مستقیمی بر روی توهمات و هذیان ها دارد؟

- ۱. کلوزاپین
- ۲. ترازادون
- ۳. فلوروکسامین
- ۴. پروکستین

- ۱۸- یبوست، آشفتگی های بینایی و کاهش یا افزایش وزن از عوارض کدام دارو محسوب می شود؟

- ۱. دسی پرامین
- ۲. پروزاک
- ۳. کلوزاپین
- ۴. کلرپرومازین

- ۱۹- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیتی اسکیزوتاپیال محسوب می شود؟

- ۱. سوء ظن
- ۲. فقد انعطاف پذیری
- ۳. حساسیت
- ۴. از نظر هیجانی سرد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ -، روانشناسی ۱۲۱۷۰۴۱ -

-۲۰- کدام گزینه جز ویژگی های شخصیتی اختلال اسکیزوئید محسوب می شود؟

- ۱. خسته کردن دیگران
- ۲. توانایی در ابراز مستقیم خشم
- ۳. نابهنجاری در تفکر
- ۴. فقدان اعتماد به نفس

-۲۱- شیوع کدام دسته از اختلالات شخصیتی، ۳ درصد جمعیت عمومی را شامل می شود؟

- ۱. دوری گزین
- ۲. مرزی
- ۳. خودشیفت
- ۴. اسکیزوتاپیال

-۲۲- در کدام دسته از اختلالات شخصیتی، تحت تاثیر استرس، واقعیت سنجی فرد به آسانی در هم می شکند؟

- ۱. دوری گزین
- ۲. وابسته
- ۳. نمایشی
- ۴. پارانویید

-۲۳- شیوع اختلال شخصیت نمایشی چند درصد می باشد؟

- ۱. ۳ تا ۴ درصد
- ۲. ۲ تا ۳ درصد
- ۳. ۱ درصد
- ۴. ۲/۵ درصد

-۲۴- رفتارهایی نظیر بریدن بازوها، پاها و سوزاندن، در کدام دسته از اختلالات شخصیتی مشاهده می گردد؟

- ۱. ضد اجتماعی
- ۲. اختلال شخصیت مرزی
- ۳. اسکیزوئید
- ۴. وسواسی جبری

-۲۵- در کدام یک از اختلالات شخصیتی افراد در روابط بین فردی، به درجه بالایی از محبت نیاز دارند؟

- ۱. اسکیزوئید
- ۲. خود شیفت
- ۳. نمایشی
- ۴. اجتنابی

-۲۶- کدامیک از مشکلات روانشناختی در بین مبتلایان به بی اشتهاایی روانی شایع می باشد؟

- ۱. اضطراب
- ۲. افسردگی شدید
- ۳. خود شیفتگی
- ۴. استرس

-۲۷- تحریک کدام ناحیه باعث کاهش احساس گرسنگی می شود؟

- ۱. هیپوتalamوس
- ۲. تalamوس
- ۳. هیپوتalamوس شکمی
- ۴. هیپوتalamوس جانبی

-۲۸- کدام مورد جز اهداف مداخلات درمانی شناختی محسوب می شود؟

- ۱. ایجاد جذابیت جسمانی
- ۲. کنترل فراخود
- ۳. رشد و پرورش خودمختاری
- ۴. ایجاد اتحاد درمانی

-۲۹- در فاصله سنی ۲۵ تا ۴۴ سال مردها بطور متوسط چند کیلو گرم افزایش وزن دارند؟

- ۱. ۷
- ۲. ۵
- ۳. ۴
- ۴. ۲

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ -، روانشناسی ۱۲۱۷۰۲۹ -

-۳۰- در کدام مرحله خواب non-REM مغز یک نوع الگوی فعالیتی متمایزی از امواج آهسته تر به همراه خیزک های سریعی از امواج نشان می دهد؟

۴. چهارم

۳. سوم

۲. دوم

۱. اول

-۳۱- کدام مورد محرك اشتها و هوشیاری محسوب می شود؟

۲. نوروتانسمیتر هیپوکرتین

۱. سروتونین

۴. دوپامین

۳. اپی نفرین

-۳۲- لیومان و همکاران ۱۹۹۱ اشیوع اختلال نعوظی را برای سنین ۴۰ الی ۴۹ سالگی چند درصد برآورد کرده اند؟

۴. ۱۸ درصد

۳. ۱۳ درصد

۲. ۷ درصد

۱. ۱۱ درصد

-۳۳- داروی ویاگرا در درمان کدام اختلال موثر واقع می شود؟

۴. نعوظ

۳. میل جنسی کم کار

۲. بیزاری جنسی

۱. انزال زودرس

-۳۴- کدام گزینه جز عوارض جنبی داروی سیلدنافیل محسوب می شود؟

۴. آشفتگی کلیوی

۳. برافروختگی چشم ها

۲. اختلال در دید رنگ

۱. کاهش ضربان قلب

-۳۵- کدام دانشمندبه این نتیجه دست یافت که مردان مبدل پوش به احتمال بیشتری نسبت به مردان دیگر والدین خود را فاقد ویژگی های مربوط به نوع جنس ارزیابی می کردند؟

۴. جانسون

۳. نیوکامب

۲. مسترزر

۱. بن کرافت

۴. شدید

۳. خفیف

۲. مبهم

۱. متوسط

-۳۶- در کدام نوع دماغی رفتارهای مشکل دار نظیر شگفتی واضح می باشند؟

۴. صرع

۳. ام اس

۲. آلزایمر

۱. پارکینسون

-۳۷- عوامل خطر برای بروز زوال عقل در بیماران پارکینسونی شامل کدام مورد می شود؟

۲. مدت زمان بیماری

۱. جنسیت

۴. ژنتیک

۳. آستانه تحمل درد پایین

-۳۸- بی خوابی از جمله مشکلات روانی مبتلایان به کدام نوع بیماری می باشد؟

۴. آلزایمر

۳. پارکینسون

۲. صرع

۱. ام اس



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

- ۴۰- کدام دارو جز داروهای ضد صرع محسوب می شود؟

۴. پروکستین

۳. کاربامازپین

۲. سرتالین

۱. ترازومن

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
1	ب	عادی
2	د	عادی
3	ب	عادی
4	ج	عادی
5	الف	عادی
6	الف	عادی
7	ج	عادی
8	د	عادی
9	د	عادی
10	د	عادی
11	الف	عادی
12	الف	عادی
13	ج	عادی
14	د	عادی
15	ج	عادی
16	ج	عادی
17	الف	عادی
18	د	عادی
19	الف	عادی
20	الف	عادی
21	د	عادی
22	ج	عادی
23	ب	عادی
24	ب	عادی
25	د	عادی
26	الف	عادی
27	ج	عادی
28	د	عادی
29	ج	عادی
30	ب	عادی
31	ب	عادی
32	الف	عادی
33	د	عادی
34	ب	عادی
35	ج	عادی
36	الف	عادی
37	ب	عادی
38	ب	عادی
39	ج	عادی
40	ج	عادی

94-95-1



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

 رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
 روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی

۱- حالت خفیف تر اختلال دو قطبی چه نام دارد؟

۱. ادواری خویی ۲. افسردگی فصلی
 ۳. افسردگی خویی ۴. هیچکدام

۲- افسردگی درون زاد را می گویند.

۱. افسردگی مضاعف ۲. افسردگی همراه با مالیخولیا
 ۳. افسردگی همراه با مالیخولیا ۴. افسردگی اساسی

۳- سطوح پایین کدام انتقال دهنده موجب افسردگی می شود؟

۱. دوپامین ۲. استیل کولین
 ۳. سروتونین ۴. نور اپی نفرین

۴- از نظر لوینسون تبیین نظریه های رفتاری در مورد علت افسردگی چیست؟

۱. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت ۲. وابستگی به دیگران
 ۳. تشبیت در غم و اندوه ۴. عزت نفس پایین

۵- کدام گزینه مربوط به مثلث شناختی نیست؟

۱. باورهای مربوط به آینده ۲. باورهای مربوط به خود
 ۳. باورهای مربوط به رخدادها یا افراد ۴. باورهای مربوط به گذشته

۶- نتیجه گیری های منفی کلی درباره توانایی یا عملکرد بر حسب یک مورد جزء کدام پنج خطای منطقی فرد افسرده است؟

۱. انتزاع گزینشی ۲. تعییم مفرط
 ۳. استنباط دلخواه ۴. شخصی سازی

۷- کدام یک از داروها عمر انتقال دهنده های عصبی را در افسردگی افزایش می دهد؟

۱. TCA . ۱ ۲. SSRI . ۲ ۳. Orap . ۳ ۴. MAOI . ۴

۸- میزان سروتونین پایین همراه با نور اپی نفرین بالا منجر به بروز کدام اختلال می گردد؟

۱. مانیا ۲. افسردگی
 ۳. اسکیزوفرنی ۴. سایکوز

۹- شدیدترین اختلال روانی کدام است؟

۱. افسردگی ۲. اسکیزوفرنی
 ۳. دوقطبی ۴. مانیا

۱۰- هیفرنیا کدام نوع اسکیزوفرنی است؟

۱. کاتاتونیک ۲. باقی مانده
 ۳. آشفته ۴. پارانویید

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی عمومی ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۴۱ -

۱۱- اسکیزوفرنی مزمن چه نشانه هایی دارد؟

۱. شروع ناگهانی ۲. احتمال بهبودی زیاد ۳. پیش آگهی خوب ۴. پیش آگهی بد

۱۲- مشهورترین نشانه اسکیزوفرنی چیست؟

۱. آشفتگی در فرایندهای تفکر ۲. مکالمات فاقد هماهنگی ۳. هذیان بزرگ منشی ۴. هذیان کنترل

۱۳- مصرف کدام ماده مخدر منجر به بروز بعدی اسکیزوفرنی می شود؟

۱. تریاک ۲. کوکائین ۳. شیشه ۴. هروئین

۱۴- کدام مطالعه تصویر برداری نخستین و قانع کننده ترین داده ها را از این که اسکیزوفرنی یک بیماری مغزی واقعی است به دست داده است؟

۱. CT ۲. rCBF ۳. SPET ۴. FMRI

۱۵- ضایعات در کدام قسمت مغز باعث ایجاد اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهمندی شناوری شدید می شود؟

۱. لوب پیش پیشانی ۲. لوب گیجگاهی ۳. لوب تمپورال ۴. لوب پس سری

۱۶- حجم کوچکتر گیروس استریت در اسکیزوفرنها با کدام یک از ناسازگاری های زیر ارتباط دارد؟

۱. رفتاری ۲. اجتماعی ۳. تحصیلی ۴. جنسی

۱۷- مصرف کدام ماده مخدر باعث بالا رفتن دوپامین می شود؟

۱. شیشه ۲. کراک ۳. تریاک ۴. حشیش

۱۸- کدام یک از داروهای زیر فقط بر روی نشانه های مثبت اسکیزوفرنی اثر می گذارد؟

۱. کلوزاپین- هالوپریدول ۲. کلرپروماین- هالوپریدول
۳. دیازپام- کلر پرماین ۴. کلوزاپین- کلرپرماین

۱۹- روابط شخصی بی ثبات و شدید ویژگی کدام اختلال شخصیت می باشد؟

۱. وسواسی- جبری ۲. خودشیفتہ ۳. مرزی ۴. پارانوئید

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۰- مهمترین پیام رفتارهای جبرانی پراستهایی روانی چیست؟

۱. عدم تعادل الکتروولیت
۲. مشکلات گوارشی
۳. آسیب شکمی
۴. آسیب به پشت دندانها

۳۱- سطح پایین کدام انتقال دهنده عصبی منجر به جستجوی کربوهیدراتها و دوره های پرخوری می شود؟

۱. دوپامین
۲. نور اپی نفرین
۳. استیل کولین
۴. سروتونین

۳۲- از نظر فروید تثبیت در کدام مرحله رشد موجب بی اشتھایی روانی می شود؟

۱. جنسی
۲. تناسلی
۳. دهانی
۴. مقعدی

۳۳- کودکانی که دچار شب ادراری و یا راه رفتن در خواب هستند معمولاً در کدام مرحله از خواب می باشند؟

۱. سوم و دوم
۲. اول و چهارم
۳. سوم و چهارم
۴. اول و دوم

۳۴- کدام اختلال خواب موجب مشکل در کارکردهای اجتماعی، شغلی فرد می شود؟

۱. حمله خواب
۲. پرخوابی اولیه
۳. اختلال خواب دوره شب‌نه روزی
۴. بی خوابی اولیه

۳۵- مهمترین درمان نارکولپسی چیست؟

۱. شوک درمانی
۲. آرمیدگی
۳. تمرکز
۴. دارو درمانی

۳۶- کدام دارو برای درمان کابوس در خواب تجویز می شود؟

۱. سه حلقه ای
۲. زولپیدم
۳. زالپلون
۴. بنزو دیازپین

۳۷- نمایش آلت به فرد غریبه ای که انتظار این کار را از او ندارد جزء کدام نوع پارافیلی ها است؟

۱. یادگارخواهی جنسی
۲. سادیسم جنسی
۳. نمایشگری جنسی
۴. تماشاگری جنسی

۳۸- مهمترین دارو برای درمان اختلال نعوظی چیست؟

۱. فیناستراید
۲. دیازپام
۳. زالپلون
۴. ویاگرا

۳۹- بیزاری درمانی در مبدل پوشی معمولاً چگونه انجام می شود؟

۱. شوک درمانی
۲. دارو درمانی
۳. گفتار درمانی
۴. همه موارد



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۴۰- هویت جنسی زنانه در مردان طبق تبیین رویداد تحلیلی ناشی از چیست؟

- ۱. وابستگی به مادر
- ۲. بیزاری از پدر
- ۳. اضطراب جدایی مفرط اولیه
- ۴. افسردگی

1217240 - 94-95-1

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	الف	عادی
۲	ج	عادی
۳	ج	عادی
۴	الف	عادی
۵	د	عادی
۶	ب	عادی
۷	د	عادی
۸	الف	عادی
۹	ب	عادی
۱۰	ج	عادی
۱۱	د	عادی
۱۲	الف	عادی
۱۳	ب	عادی
۱۴	د	عادی
۱۵	ج	عادی
۱۶	ب	عادی
۱۷	د	عادی
۱۸	ب	عادی
۱۹	ج	عادی
۲۰	الف	عادی
۲۱	ب	عادی
۲۲	د	عادی
۲۳	ب	عادی
۲۴	د	عادی
۲۵	ج	عادی
۲۶	ج	عادی
۲۷	الف	عادی
۲۸	ب	عادی
۲۹	ج	عادی
۳۰	الف	عادی
۳۱	د	عادی
۳۲	ج	عادی
۳۳	ج	عادی
۳۴	ج	عادی
۳۵	د	عادی
۳۶	الف	عادی
۳۷	ج	عادی
۳۸	د	عادی
۳۹	الف	عادی
۴۰	ج	عادی

93-94-3



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۹۸ -

۱۰- کدام یک از موارد زیر، دارو درمانی را بهبود میبخشد؟

۱. مدیریت استرس ۲. تغییر باورها ۳. خانواده درمانی ۴. چالش کلامی

۱۱- اختلالات شخصیت در کدام محور DSM-IV-TR مورد تشخیص واقع میشوند؟

۱. محور اول ۲. محور دوم ۳. محور چهارم ۴. محور پنجم

۱۲- براساس مدل پنج عاملی مکره، کدام یک از گزینه‌های زیر برای اختلال شخصیت ضداجتماعی مطرح شده است؟

۱. روان‌رنجورخوبی بالا ۲. برون‌گرایی پایین ۳. کمال‌گرایی ۴. علاقه به تنها‌یی

۱۳- همه‌گیرشناسی میزان شیوع اختلالات شخصیت پارانویایی چند درصد است؟

۱. ۱ تا ۴ درصد ۲. ۲ تا ۳ درصد ۳. ۳ تا ۴ درصد ۴. ۵ تا ۲/۵ درصد

۱۴- در کدام یک از اختلالات زیر تفکر خودکشی و تلاشی‌هایی برای خودکشی رایج است؟

۱. اختلال پارانویایی ۲. اختلال ضداجتماعی ۳. اختلال شخصیت مرزی ۴. خودشیفتی

۱۵- اصلی‌ترین ویژگی افراد مبتلاء به اختلال شخصیت دوری گزین چیست؟

۱. ترس از طرد شدن و تحقیر شدن ۲. داشتن عزت نفس پایین ۳. علاقه نداشتن به روابط بین فردی

۱۶- اختلال بی‌اشتهاایی و پراشتهاایی روانی معمولاً از چه زمانی بروز می‌کند؟

۱. بعد از قرار گرفتن در موقعیت اضطراب‌آور.
۲. پس از یک دوره رژیم سخت غذایی در افرادی که از چاق شدن می‌ترسند.
۳. از زمانی که رژیم غذایی افراد تغییر می‌کند.
۴. وقتی افراد از لاغری مفرط در عذاب باشند.

۱۷- در بین مبتلایان به بی‌اشتهاایی پرخوری-پاکسازی کدام یک از موارد زیر مشاهده نمی‌شود؟

۱. سوء مصرف مواد ۲. تمارض ۳. اختلال کنترل تکانه ۴. اختلال شخصیت

۱۸- بارزترین و فوری‌ترین پیامد کنترل و کاهش وزن مربوط به بی‌اشتهاایی روانی چیست؟

۱. آمنوریا ۲. زبرشدن پوست ۳. فشار خون پایین ۴. خشکی مو

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱ -

۱۹- نظریه نقطه ثبیت به کدام قسمت مغز مربوط می‌شود؟

۴. هیپوتalamوس شکمی

۳. هیپوتalamوس خلقی

۲. هیپوتalamوس

۱. تalamوس

۲۰- کدام نوع خواب حافظه را تحکیم می‌بخشد؟

۲. مرحله دوم خواب non-REM

۱. REM

۴. مرحله چهارم non-REM

۳. non-REM

۲۱- اختلال‌های اولیه آغاز یا تداوم خواب و یا خواب آلودگی زیاد که با اختلال در مقدار، کیفیت یا زمان خواب مشخص می‌شوند، در کدام طبقه از اختلال‌های خواب قرار دارند؟

۲. دیس سومیناها

۱. نابهنجاری‌های همراه خواب

۴. اختلال خواب مرتبط با تنفس

۳. اختلال خواب دوره شبانه‌روزی

۲۲- بیماران مبتلا به نارکولپسی با کمبود کدام نوروترانسمیتر مواجه هستند؟

۴. نوراپینفرین

۳. استریل کولین

۱. سروتونین

۲۳- چه درمانی برای اختلال وحشت شبانه و خوابگردی مناسب است؟

۲. شرطی‌سازی

۱. دارو درمانی

۴. روان‌درمانی فردی و خانوادگی

۳. از بین بردن رویدادهای استرسزا

۲۴- اولین اختلال در طبقه اختلالات مربوط به میل جنسی کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

۲. واژینیسم

۱. انزواز زودرس

۴. بدکارکردی جنسی ناشی از بیماری جسمانی

۳. اختلال میل جنسی کم کار

۲۵- کدام یک از اختلالات جنسی زیر مختص زنان است؟

۲. انزواز زودرس

۱. اختلال اوج لذت جنسی

۴. واژینیسم

۳. مقابله دردناک

۲۶- در تبیین شناختی اختلال نعروظی، ۲ پیامد بیش نظاره‌گری واحد (توسط مسترز و جانسون) مطرح شده‌اند، کدام‌اند؟

۴. استرس و ترس

۳. خشم و ترس

۲. ترس و اضطراب

۱. اضطراب خشم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰ -

۲۷- «عدم توانایی تشخیص و شناسایی اشیاء، علیرغم سالم بودن کارکردهای حسی» چه نامیده می‌شود؟

- ۱. آمنزی
- ۲. آپراکسی
- ۳. آگوزیا
- ۴. اختلال در کارکردهای اجرایی

۲۸- اختلال عصب شناختی نتیجه آسیب به چه بخش‌هایی از بدن می‌باشد؟

- ۱. دستگاه عصبی خودمختار
- ۲. دستگاه عصبی مرکزی
- ۳. سلول‌های عصبی
- ۴. بخش پیکری

۲۹- مشخصه شایع علائم جسمی بیماری MS کدام یک از موارد زیر می‌باشد؟

- ۱. انقباض عضلانی به ویژه در اندام‌های بالاتنه
- ۲. آسیب‌شناختی
- ۳. از بین رفتن کارکرد پاها
- ۴. فقدان کنترل مثانه

۳۰- در سبب‌شناسی، روان‌شناختی MS آسیب روان‌شناختی بیشتر متوجه کدام بخش می‌باشد؟

- ۱. پردازش اطلاعات
- ۲. بازشناسی اطلاعات جدید
- ۳. بازیابی حافظه کوتاه مدت
- ۴. بازیابی حافظه درازمدت

۳۱- در سبب‌شناسی بیماری پارکینسون، علت بروز بیماری کدام یک از موارد زیر می‌باشد؟

- ۱. شخصیت غیرقابل انعطاف
- ۲. فقدان سلول‌های رنگدانه‌ای در جسم سیاه
- ۳. آشفتگی هیجانی
- ۴. ضربه‌های روانی

۳۲- به کارگیری چه شیوه‌های درمانی برای اختلالات درمانی موثر تر است؟

- ۱. درمان شناختی رفتاری
- ۲. لیتیوم
- ۳. سرتالین
- ۴. درمان همزمان شناختی-رفتاری و لیتیوم

۳۳- در بین داروهای زیر کدام یک از مواد خطر ابتلاء به اسکیزوفرنی را افزایش می‌دهد؟

- ۱. امفتامین
- ۲. حشیش
- ۳. کوکائین
- ۴. LSD

۳۴- کدام یک از اختلال‌های شخصیتی زیر با خصوصیات شخصیتی تیپ A مطابقت می‌کند؟

- ۱. وسواسی جبری
- ۲. واپسته
- ۳. منفعل-پرخاشگر
- ۴. دوری گزین

۳۵- ۸۰ تا ۹۰ درصد مبتلایان به بی‌اشتهاایی روانی را افراد کدام گزینه زیر تشکیل می‌دهند؟

- ۱. مردان
- ۲. جوانان
- ۳. زنان
- ۴. افراد سالخورد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱

-۳۶- در اختلال خواب مرتبط با تنفس در طول یک شب باید چند آپنه وجود داشته باشد تا قابل تشخیص شود؟

۳۰ . ۴

۵ . ۳

۲۰ . ۲

۱۰ . ۱

-۳۷- مرحله خواب REM با چه ویژگی مشخص می شود؟

۱. با امواج ساده

۳. با امواج آهسته و خیزهای کوتاه

۲. حرکات غیر سریع چشم

۴. حرکات سریع چشم

-۳۸- نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به GID چه اشتغال ذهنی در مورد جنسیتاشان دارند؟

۲. معتقدند که با یک جنسیت غلط به دنیا آمده اند

۱. از اندام های جنسی، جنس مقابل متنفرند

۴. به تغییر جنسیت عمل جراحی فکر می کنند

۳. احساس جذابیت نمی کنند

-۳۹- در بهبود کارکردهای اجرایی برانسفورد و استاین در مهارت حل مسئله حرف A مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۲. مواجه با مسئله

۱. تعریف مسئله

۴. عمل بر اساس طرح انتخابی

۳. وارسی اثرمندی طرح انتخابی

-۴۰- در درمان اختلال نعروظی به روش حساسیت زدایی، هدف درمانی چیست؟

۲. دستیابی به لذت جنسی

۱. صمیمیت زوج

۴. استرس را از عمل جنسی دور سازیم

۳. از بین رفتن افکار منفی

1217240 - 93-94-3

شماره سؤال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱	ب	عادی
۲	ج	عادی
۳	ب	عادی
۴	الف	عادی
۵	د	عادی
۶	ج	عادی
۷	ب	عادی
۸	الف	عادی
۹	ب	عادی
۱۰	ج	عادی
۱۱	ب	عادی
۱۲	ب	عادی
۱۳	د	عادی
۱۴	ج	عادی
۱۵	د	عادی
۱۶	ب	عادی
۱۷	ب	عادی
۱۸	الف	عادی
۱۹	ب	عادی
۲۰	الف	عادی
۲۱	ب	عادی
۲۲	ب	عادی
۲۳	د	عادی
۲۴	ج	عادی
۲۵	د	عادی
۲۶	ب	عادی
۲۷	ج	عادی
۲۸	ب	عادی
۲۹	الف	عادی
۳۰	د	عادی
۳۱	ب	عادی
۳۲	د	عادی
۳۳	ب	عادی
۳۴	الف	عادی
۳۵	ج	عادی
۳۶	د	عادی
۳۷	د	عادی
۳۸	ب	عادی
۳۹	ج	عادی
۴۰	د	عادی

93-94-2



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

روشه تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰ - ، روانشناسی عمومی

۱- تمایز اختلال عاطفی فصلی با اختلال افسردگی اساسی در چیست؟

۱. طول مدت اختلال عاطفی فصلی کوتاهتر است.
۲. اختلال عاطفی فصلی، یک حالت فصلی است و در زمستان رخ می دهد.
۳. طول مدت اختلال افسردگی اساسی کوتاهتر است.
۴. تفاوت چندانی ندارد.

۲- در کدام یک از انواع افسردگی نشانه ها شدیدتر و میزان بهبودی کمتر است؟

۱. افسردگی درونزاد
۲. افسردگی برونزاد
۳. افسردگی مضاعف
۴. افسردگی اساسی

۳- بر طبق طبقه بندی DSM-IV-TR در اختلال دو قطبی نوع II کدام دوره ها (مانی یا افسردگی) مسلطند؟

۱. دوره های افسردگی مسلط هستند.
۲. دوره های مانیا شدیدتر است.
۳. افراد دوره های متغیری از افسردگی و مانیا را تجربه می کنند.
۴. نسبت هر دو برابر است.

۴- طبق مدل شناختی، چه عواملی موجب دوره هایی از افسردگی و مانی (اختلال دو قطبی) می شوند؟

۱. عزت نفس و اعتماد به نفس بالا
۲. اضطراب بالا و طرحواره
۳. توهمندی ها و هذیان ها
۴. معیارهای غیر واقع گرایانه در مورد موفقیت

۵- غم ناشی از مرگ عزیزان و پایان یک رابطه محبت آمیز چه نام دارد؟

۱. داغدیدگی
۲. افسردگی
۳. سوگ
۴. موارد الف و ج

۶- جمله «همیشه برای من رخ می دهد» مربوط به کدام نوع اسناد است؟

۱. اسناد درونی
۲. اسناد کلی
۳. اسناد پایدار
۴. اسناد کلی و پایدار

۷- ناتوانی مربوط به بیماری اسکیزوفرنی بیشتر ناشی از فقدان چه نقص هایی است؟

۱. زیستی
۲. شناختی
۳. شناختی-رفتاری
۴. رفتاری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱ -

-۸- به عقیده بلولر اسکیزوفرنیا بیشتر تحت تأثیر چه عواملی به وجود می آید؟

۱. تحت نفوذ پیشرفت های آسیب شناسی بالینی
۲. تحت تأثیر عوامل روانشناختی
۳. بیشتر نشانه های سایکوزی این بیماری مدنظر بود.
۴. به نظر او هذیانها و توهمات، پدیده های اولیه و اصلی بودند.

-۹- ویژگی نوع کاتاتونیک اسکیزوفرنیا در کدام گزینه آمده است؟

۲. آشفتگی های گفتاری
۴. هذیانهای پارانوئیدی

-۱۰- در نیمکره شمالی و جنوبی افزایش بیماری اسکیزوفرنی در بین متولدین چه ماه هایی دیده می شود؟

۲. متولدین آخر زمستان تا اول بهار
۴. متولدین اول تابستان

-۱۱- براساس مطالعات تغییرات ساختاری در بخش فرونتال مغز، حجم کوچکتر گیروسی استریت با کدام یک از موارد زیر ارتباط دارد؟

۱. اختلال در تفکر
۴. رفتار آشفته
۳. توهمات شنوایی
۲. ناسازگاری اجتماعی

-۱۲- میزان بالایی از اسکیزوفرنیا در بین چه گروه هایی دیده می شود؟

۱. گروههای اجتماعی- اقتصاد بالاتر
۲. در خانواده های سرد و مستبد
۴. گروههای اجتماعی- اقتصادی پائین تر
۳. طبقات اجتماعی- اقتصادی متوسط

-۱۳- طبق طبقه بندی DSM-IV-TR، کدام اختلال زیر در دسته سوم (ترسو یا مضطرب) اختلالات شخصیت قرار می گیرد؟

۱. اختلال شخصیت پارانوئید
۲. اختلال شخصیت وابسته
۴. اختلال شخصیت اسکیزوتاپیال
۳. اختلال شخصیت اسکیزوئید

-۱۴- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیتی مرزی محسوب نمی شود؟

۱. احساس خالی بودن
۲. فرار از روابط نزدیک
۴. خود آسیب زنی عمدی
۳. آشفتگی هویت

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱

۱۵- کدام گزینه به نظریه یانگ و لیندمان در مورد طرحواره های مربوط به اختلالات شخصیت مربوط نمی شود؟

۱. حفظ طرحواره ۲. اجتناب از طرحواره ۳. جبران طرحواره ۴. فقدان طرحواره

۱۶- حجم ماده خاکستری پره فرونال افرادی که به اعمال ضداجتماعی اشتغال داشتند چه تغییری نشان می دهد؟

۱. افزایش می یابد. ۲. کاهش می یابد. ۳. تغییری نمی کند. ۴. رشد نمی کند.

۱۷- از نظر راث و همکاران برای افراد مبتلاء به اختلال شخصیت که سن پایین تر از ۳۰ سال دارند، مهمترین مسئله چه احتمالی است؟

۱. افسردگی ۲. خودکشی ۳. خود آسیب زنی ۴. روان پریشی

۱۸- در اختلالات شخصیت مؤثرترین مداخلات روانشناختی کدامند؟

۱. آنهایی که به خانواده معطوف می شوند.
۲. رویکرد مبتنی بر همسالان
۳. مداخلات مبتنی بر همسالان
۴. آموزش مهارت اجتماعی و حل مسئله

۱۹- اختلال بی اشتهايی و پراشتهايی روانی معمولاً از چه زمانی بروز می کند؟

۱. پس از یک دوره رژیم سخت غذایی در افرادی که از چاق شدن می ترسند.
۲. بعد از قرار گرفتن در موقعیت اضطراب آور
۳. وقتی افراد از لاغری مفرط در عذاب باشند.
۴. از زمانی که رژیم غذایی افراد تغییر می کند.

۲۰- بارزترین و فوری ترین پیامد کنترل و کاهش وزن مربوط به بی اشتهايی روانی چیست؟

۱. زبرشدن پوست ۲. آمنوریا ۳. فشار خون پایین ۴. خشکی مو

۲۱- مطالعات نشان داده اند که ۷۴ درصد واریانس رفتارهای بی اشتهايی به چه عواملی مربوط می شوند؟

۱. عوامل زیست شناختی ۲. روانشناختی ۳. ژنتیکی ۴. شناختی

۲۲- براساس طرحواره های خویشتن مربوط به وزن، اشخاص چگونه ارزیابی می شوند؟

۱. براساس صلاحیت فردی
۲. با افکار و احساساتشان
۳. براساس چاقی یا لاغریشان
۴. براساس تجرب فردی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

روش تحقیقاتی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۹۸ -

۲۳- در تبیین روان تحلیلی، بیماران مبتلا به بی اشتہایی روانی فاقد کدام یک از موارد زیر می باشند؟

- ۱. احساس وابستگی به اطرافیان و رابطه به آنها
- ۲. فاقد احساس نشاط و شادی
- ۳. خود انضباطی
- ۴. فاقد احساس خودمختاری و خود بودن

۲۴- بر طبق آمار، نیمی از بیماران که به طور معمول تحت درمان چاقی قرار می گیرند دچار چه عارضه هایی هستند؟

- ۱. مصرف مواد
- ۲. افسردگی و اضطراب خفیف
- ۳. وسوسات- جبری
- ۴. اضطراب بالا

۲۵- کدام نوع خواب حافظه را تحکیم می بخشد؟

- ۱. مرحله دوم خواب non-REM .۲
- ۲. مرحله چهارم non-REM .۴
- ۳. REM .۳

۲۶- کدام یک از روش های زیر، شبوه مؤثری در درمان بی خوابی اولیه است؟

- ۱. درمان آرمیدگی
- ۲. شرطی شدن مجدد
- ۳. درمان مجدد محدودسازی خواب
- ۴. دارو درمانی

۲۷- پرخوابی اولیه چه زمانی به عنوان یک اختلال مطرح می شود؟

- ۱. وقتی که بروز خانوادگی داشته باشد.
- ۲. زمانی که علت دیگری برای پرخوابی فرد نمیتوان یافت.
- ۳. زمانی که فرد شکایت عمدہ ای از خواب آلودگی به مدت ۲ ماه دارد.
- ۴. زمانی که فرد مشکلاتی در زمینه های مختلف زندگی پیدا نمی کند.

۲۸- نارکولپسی حداقل در چه مدتی قابل تشخیص است؟

- ۱. ۱ ماه
- ۲. ۳ ماه
- ۳. ۲ هفته
- ۴. ۶ هفته

۲۹- تفاوت اختلال وحشت شبانه و خواب گردی در کدام گزینه زیر آمده است؟

- ۱. در وحشت شبانه فرد به طور معمولی بیدار می شود، رویای دیده شده را به یاد نمی آورد.
- ۲. در اختلال خوابگردی فرد با هشیاری به یکسری اعمال پیچیده دست میزند.
- ۳. در اختلال خوابگردی، فرد رویای زیادی را تجربه می کند.
- ۴. در وحشت شبانه فرد رویای دیده شده را به خاطر می آورد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱ -

۳۰- برای درمان وحشت شبانه و خوابگردی چه عواملی دارای اهمیت است؟

- ۱. بررسی سوابق خوابگردی
- ۲. بررسی طول مدت ابتلاء به این اختلال ها
- ۳. بررسی وضعیت زندگی و خانوادگی
- ۴. بررسی تاریخچه بیماری

۳۱- اولین اختلال در طبقه اختلالات مربوط به میل جنسی کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

- ۱. اختلال میل جنسی کم کار
- ۲. انزواج زودرس
- ۳. واژینیسم
- ۴. اختلال بیزاری جنسی

۳۲- زمانی که فرد با رفتارهای خشونت آمیز و آسیب رسان نسبت به موضوع جنسی خود، به برانگیختگی جنسی دست می یابد کدام اختلال مطرح است؟

- ۱. نمایشگری جنسی
- ۲. مازوخیسم
- ۳. سادیسم جنسی
- ۴. تمایل جنسی نسبت به کودکان

۳۳- در تبیین شناختی اختلال نعوظی، از نظر بن کرافت چه عاملی عملکرد جنسی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد؟

- ۱. اضطراب
- ۲. ترس
- ۳. تمایلات همجنس گرایانه
- ۴. تمایلات پرخاشگرانه

۳۴- اختلال هویت جنسی معمولاً از چه سنی قابل ردیابی هستند؟

- ۱. قبل از ۶ سالگی
- ۲. ۴ سالگی
- ۳. قبل از ۳ سالگی
- ۴. ۱۲ سالگی

۳۵- نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به GID چه اشتغال ذهنی در مورد جنسیت شان دارند؟

- ۱. از اندامهای جنسی، جنس مقابل متنفرند.
- ۲. معتقدند که با یک جنسیت غلط به دنیا آمده اند.
- ۳. احساس جذابیت نمی کنند.
- ۴. به تغییر جنسیت عمل جراحی فکر می کنند.

۳۶- اختلال عصب شناختی نتیجه آسیب به چه بخشهايی از بدن می باشد؟

- ۱. دستگاه عصبی خودمختار
- ۲. دستگاه عصبی مرکزی
- ۳. سلولهای عصبی
- ۴. بخش پیکری

۳۷- در فرآیندهای عصب شناختی بیماری آلزایمر، در بخش ساختاری، لکه های آمیلوئید، چه عاملی را سبب می شوند؟

- ۱. باعث مرگ نرونی می شوند.
- ۲. باعث ایجاد کانالهایی در غشاء می شوند.
- ۳. باعث آسیب پروتئین آمیلوئید می شوند.
- ۴. موجب خروج کلسیم از نرون می شوند.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

-۳۸- مشخصه شایع علائم جسمی بیماری MS کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. از بین رفتن کارکرد پاها
۲. آسیب شناختی
۳. فقدان کنترل مثانه
۴. انقباض عضلانی به ویژه در اندامهای بالاتنه

-۳۹- در سبب شناسی بیماری پارکینسون، علت بروز بیماری کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. شخصیت غیرقابل انعطاف
۲. آشفتگی هیجانی
۳. ضربه های روانی
۴. فقدان سلولهای رنگدانه های در جسم سیاه

-۴۰- شایعترین اختلال روانشناختی در بیماران صرعی چیست؟

۱. اختلالات خلقی
۲. اختلالات شخصیتی
۳. افسردگی
۴. اضطراب فراگیر

1217240 - 93-94-2

شماره سؤال	باسخ صحيح	وضعیت کلید
1	ب	عادی
2	ج	عادی
3	الف	عادی
4	د	عادی
5	د	عادی
6	ج	عادی
7	ب	عادی
8	ب	عادی
9	ج	عادی
10	الف	عادی
11	ب	عادی
12	د	عادی
13	ب	عادی
14	ب	عادی
15	د	عادی
16	ب	عادی
17	ب	عادی
18	الف	عادی
19	الف	عادی
20	ب	عادی
21	ج	عادی
22	ج	عادی
23	د	عادی
24	ب	عادی
25	ج	عادی
26	ب	عادی
27	ب، د	عادی
28	ب	عادی
29	الف	عادی
30	ج	عادی
31	الف	عادی
32	ج	عادی
33	الف	عادی
34	ج	عادی
35	ب	عادی
36	ب	عادی
37	الف، ج	عادی
38	د	عادی
39	د	عادی
40	ب	عادی

93-94-1



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱ -

۱- رایج ترین اختلال روانی کدام است؟

۱. اسکیزوفرنی ۲. افسردگی ۳. اختلال شخصیت ۴. اختلال جسمانی شکل

۲- افسردگی مضاعف به چه معناست؟

۱. مجموع افسردگی اساسی و افسردگی خویی ۲. مجموع افسردگی اساسی و اختلال دو قطبی
۳. مجموع افسردگی اساسی و اختلال ادواری خویی ۴. مجموع افسردگی اساسی و اختلال عاطفی فصلی

۳- کدامیک از موارد زیر از باورهای مطرح شده در مثلث شناختی بک نیست؟

۱. باور مربوط به خودمان ۲. باور مربوط به گذشته
۳. باور مربوط به آینده ۴. باور مربوط به رخدادها یا افراد دیگر

۴- هورمون ملاتونین در ابتلا به کدام اختلال نقش بیشتری دارد؟

۱. افسردگی اساسی ۲. اختلال دو قطبی ۳. اختلال ادواری خویی ۴. اختلال عاطفی فصلی

۵- گزینه صحیح کدام است؟

۱. در اختلال ادواری خویی فرد نشانه های افسردگی اساسی و مانی را به طور شدید تجربه می کند.
۲. اختلال ادواری خویی اختلال حاد و دوره ای است.
۳. افراد مبتلا به اختلال ادواری خویی شدیداً در معرض خطر ابتلا به اختلال دو قطبی کامل قرار دارند.
۴. اختلال ادواری خویی همان اختلال افسردگی اساسی است.

۶- طبق مدل شناختی، عامل ایجاد کننده افسردگی و مانی چیست؟

۱. اشتغال ذهنی با از دست دادن واقعی و خیالی ۲. تکانه های نامقبول
۳. عزت نفس پایین و معیارهای غیر واقع گرایانه ۴. عدم دریافت تقویت

۷- کدام دارو برای تعدیل نوسانات خلقی اختلال دو قطبی تجویز می شود؟

۱. دسی پرامین ۲. ایمی پرامین ۳. فلوکستین ۴. لیتیوم بی کربنات

۸- صحبت و رفتار آشفته و خلق نامتناسب از مشخصه های اصلی کدام نوع اسکیزوفرنی است؟

۱. کاتاتونیک ۲. پارانوئید ۳. باقیمانده ۴. هبفرنیا

۹- کدامیک از نشانه های زیر جزء نشانه های منفی اسکیزوفرنی محسوب نمی شود؟

۱. هذیان ۲. بی احساسی ۳. فقر گفتار ۴. انزواج اجتماعی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۹۸ - ، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -

روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱

۱۰- در نیمکره شمالی و جنوبی افرایش اسکیزوفرنی در بین متولدین چه ماه هایی دیده می شود؟

- ۱. متولدین ماه های آخر زمستان تا اول بهار
- ۲. متولدین آخر تابستان
- ۳. متولدین ماه های اول تابستان
- ۴. متولدین اول بهار

۱۱- کدام مشخصه بالینی با پیش آگهی بد اسکیزوفرنی ارتباط دارد؟

- ۱. شروع زودرس یا تدریجی
- ۲. جنسیت مونث
- ۳. نشانه های مثبت
- ۴. IQ بالا

۱۲- ضایعه در کدام نواحی مغزی با احتمال بیشتر ایجاد اسکیزوفرنی پارانوئید رابطه دارد؟

- ۱. لوب تمپورال نیمکره چپ
- ۲. لوب تمپورال نیمکره راست
- ۳. لوب پریتال نیمکره چپ
- ۴. لوب پریتال نیمکره راست

۱۳- کدام مدل معتقد است که مبتلایان به اسکیزوفرنی از راهبردهای مقابله ای ضعیفتری در مواجه با استرس های زندگی استفاده می کنند؟

- ۱. مدل ضربه روانی
- ۲. مدل مقابله ای
- ۳. مدل شناختی
- ۴. مدل روانکاوی

۱۴- ویژگی بارز دسته سوم اختلالات شخصیتی چیست؟

- ۱. افسردگی
- ۲. اضطراب
- ۳. هیجان
- ۴. عجیب و غریب بودن

۱۵- کدامیک از اختلالات شخصیت در زنان شایع تر است؟

- ۱. مرزی
- ۲. ضد اجتماعی
- ۳. خودشیفته
- ۴. دوری گزین

۱۶- علامت بارز اختلال شخصیت اسکیزوئید چیست؟

- ۱. سوء ظن
- ۲. تنها یی مفرط
- ۳. نابهنجاری در تفکر
- ۴. نقض مقررات

۱۷- مکانیسم دفاعی اصلی اختلال شخصیت پارانوئید چیست؟

- ۱. واپس زدن
- ۲. فرافکنی
- ۳. جداسازی
- ۴. والايش

۱۸- سن لازم برای تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی چند سال است؟

- ۱. حداقل ۱۵
- ۲. حداقل ۱۸
- ۳. حداقل ۲۰
- ۴. حداقل ۱۳

۱۹- مکانیزم دفاعی جداسازی در کدامیک از اختلال زیر بیشتر استفاده می شود؟

- ۱. خودشیفته
- ۲. نمایشی
- ۳. دوری گزین
- ۴. مرزی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۹۸ -

۲۰- در رابطه با اختلال شخصیت وسواسی- اجباری کدام گزینه نادرست است؟

۱. کمال گرایی در این مبتلایان مشاهده می شود.
۲. ویژگی این بیماران به افراد تیپ A شبیه است.
۳. اشتغال ذهنی با نظم از نشانه های این اختلال است.
۴. این بیماران تمایل شدید به محول کردن کارهای خود به دیگران دارند.

۲۱- فردی بدون دلیل از افراد صاحب قدرت انتقاد کرده و آنها را تحقیر می کند ، عبوس و اهل مجادله است و بین مخالفت خصمانه و پشیمانی در نوسان است ، وی احتمالا به کدام نوع اختلال شخصیت مبتلا است؟

۱. افسردگی
۲. منفعل پرخاشگر
۳. وابسته
۴. ضداجتماعی

۲۲- کدام گزینه نادرست است؟

۱. افراد مبتلا به بی اشتهايی روانی عزت نفس و جرات مندی پایینی دارند.
۲. اختلال بی اشتهايی روانی در زنان بی سواد و طبقات اجتماعی پایین تر شایع تر است.
۳. مشغله ذهنی مبتلایان به بی اشتهايی روانی کنترل وزن است.
۴. بی اشتهايی روانی در سنین ۱۴ تا ۱۸ سالگی شایع تر است.

۲۳- کدامیک از موارد زیر در نوع محدود کننده بی اشتهايی روانی مشاهده می شود؟

۱. مصرف نابجای ملین ها
۲. مصرف مدرها
۳. تنقیه کردن
۴. مصرف مواد کم کالری

۲۴- بارزترین و فوری ترین پیامد کنترل و کاهش وزن مربوط به بی اشتهايی روانی چیست؟

۱. غلطت پایین مواد معدنی
۲. ترک برداشتن پوست
۳. آمنوریا
۴. فشار خون پایین

۲۵- طبق ملاک های تشخیصی ، رفتارهای جبرانی افراد مبتلا به پر اشتهايی روانی به طور متوسط چند بار در هفته و به مدت چند ماه باید اتفاق افتد تا قابل تشخیص گذاری شود؟

۱. حداقل ۲ بار در هفته و به مدت ۶ ماه
۲. حداقل ۱ بار در هفته و به مدت ۶ ماه
۳. حداقل ۲ بار در هفته و به مدت ۳ ماه
۴. حداقل ۱ بار در هفته و به مدت ۳ ماه

۲۶- تحریک کدام بخش مغز منجر به ایجاد احساس گرسنگی می شود؟

۱. هیپوفیز پسین
۲. هیپوفیز پیشین
۳. هیپotalamus جانبی
۴. هیپotalamus شکمی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۹۸ - ، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۴۱ -

۲۷- شب ادراری و راه رفتن در حین خواب در کدامیک از مراحل خواب اتفاق می افتد؟

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ۱. مرحله اول و دوم خواب non-REM | ۳. مرحله دوم و سوم خواب non-REM |
| ۲. مرحله سوم و چهارم خواب REM | |
| ۴. مرحله خواب REM | |

۲۸- اختلال پرخوابی اولیه براساس DSM باید چه مدت تداوم داشته باشد تا تشخیص گذاشته شود؟

- | | |
|-----------|-----------|
| ۱. یک ماه | ۲. سه ماه |
| ۳. شش ماه | ۴. یک سال |

۲۹- منظور از کاتاپلکسی چیست؟

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| ۱. توهمندی از خواب | ۳. حملات غیر قابل مقاومت خواب |
| ۲. توهمندی پس از خواب | |
| ۴. از بین رفتن ناگهانی قوام عضلانی | |

۳۰- فردی از نگاه کردن به افراد برهنه در حال تعویض لباس بدون آنکه آنها باخبر باشند، لذت می برد وی به کدام اختلال مبتلاست؟

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| ۱. نمایشگری جنسی | ۳. یادگار خواهی جنسی |
| ۲. تماشاگری جنسی | |
| ۴. یادگار خواهی همراه با مبدل پوشی | |

۳۱- کدامیک از اختلال های زیر جزء پارافیلیاهای محسوب نمی شود؟

- | | |
|-------------------------|-------------|
| ۱. تمایل جنسی به کودکان | ۳. واژینیسم |
| ۲. مازو خیسم جنسی | |
| ۴. سادیسم جنسی | |

۳۲- دارو شناخته شده برای اختلال نعوظی کدام است؟

- | | |
|--------------------|----------------|
| ۱. بنزو دیازپین ها | ۲. ایمی پرامین |
| ۳. زولپیدم | ۴. سیلدنافیل |

۳۳- مهمترین نظریه پذیرفته شده در مورد اختلال هویت جنسی کدام نظریه است؟

- | | |
|---------------|-------------|
| ۱. روانکاوی | ۲. شرطی شدن |
| ۳. زیست شناسی | ۴. شناختی |

۳۴- درمان اختلال هویت جنسی باید چه مدت قبل از جراحی شروع شود؟

- | | |
|-----------|-----------|
| ۱. ۲۴ ماه | ۲. ۱۲ ماه |
| ۳. ۱ ماه | ۴. ۳ ماه |

۳۵- در بیماران آلزایمری کدام حافظه ابتدا آسیب می بیند؟

- | | |
|---------------|-------------------|
| ۱. حافظه دور | ۲. حافظه معنایی |
| ۳. حافظه اخیر | ۴. حافظه بلند مدت |

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۶- آسیب دیدن توانایی ها برای انجام اعمال (هدفمند) علیرغم سالم بودن کارکردهای حرکتی چه نامیده می شود؟

- ۱. آمنزی
- ۲. آپراکسی
- ۳. آگنوژی
- ۴. اختلال در کارکردهای اجرایی

۳۷- فردی مبتلا به دمанс برای کارهای معمولی خود نیازمند کمک است و ممکن است رفتارهای مشکل داری نظیر پرخاشگری داشته باشد، وی در کدام سطح دمанс جای می گیرد؟

- ۱. دمанс مبهم
- ۲. دمанс خفیف
- ۳. دمанс متوسط
- ۴. دمанс شدید

۳۸- مهمترین انتقال دهنده عصبی مرتبط با آلزایمر چیست؟

- ۱. نورآدرنالین
- ۲. استیل کولین
- ۳. دوپامین
- ۴. سروتونین

۳۹- فقر و کندی حرکات ارادی، لرزش مداوم، قامت خمیده، خشکی و کندی در سرعت راه رفتن، از ویژگی های اصلی کدام اختلال است؟

- ۱. آلزایمر
- ۲. صرع
- ۳. پارکینسون
- ۴. MS

۴۰- شایع ترین اختلال روانشناختی در بیماران صرعی کدام است؟

- ۱. اختلال افسردگی
- ۲. اختلال اضطراب
- ۳. اختلال شخصیت
- ۴. اختلال اسکیزوفرنی

1217240 - 93-94-1

شماره سؤال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ب	عادی
2	الف	عادی
3	ب	عادی
4	د	عادی
5	ج	عادی
6	ج	عادی
7	د	عادی
8	د	عادی
9	الف	عادی
10	الف	عادی
11	الف	عادی
12	الف	عادی
13	ب	عادی
14	ب	عادی
15	الف	عادی
16	ب	عادی
17	ب	عادی
18	ب	عادی
19	د	عادی
20	د	عادی
21	ب	عادی
22	ب	عادی
23	د	عادی
24	ج	عادی
25	ج	عادی
26	ج	عادی
27	ب	عادی
28	الف	عادی
29	د	عادی
30	ب	عادی
31	ج	عادی
32	د	عادی
33	ب	عادی
34	ب	عادی
35	ج	عادی
36	ب	عادی
37	ج	عادی
38	ب	عادی
39	ج	عادی
40	ج	عادی