



WWW.BIDMESHKONLINE.IR

بسمه تعالی

آدنوزین *3 Adenosine	لیدوکائین *5 Lidocaine	آمیودارون *5 Amiodarone Hydrochloride	آتروپین *10 Atropin Sulfate	اپی نفرین *10 Epinephrin	آب مقطر *10
پروپرانولول *2 Propranolol	وراپامیل *3 Verapamil Hydrochloride	هپارین *3 Heporin Sodium	دوبوتامین *3 Dobutamine Hydrochloride	دوپامین *3 Dopamine Hydrochloride	نیتروگلیسرین *5 Nitroglycerin
فنی تونین *10 Phenytoin	دیاژپام *5 Diazepam	میدازولام *3 Midazolam /Versed	نالوکسان *10 Naloxane Hydrochloride /Narcan	فوروزماید *10 Furosemide	دیگوکسین *3 Digoxin
متوکلوپرامید *5 Metocloprami -de	رانیتیدین *5 Ranitidine HCl	هیدروکورتیزول *5 Hydrocortiso -ne	کلسیم *3 Calcium Gluconatte	هالوپریدول *3 Haloperidol	فنوباریتال *5 Phenobarbital

ردیف 1

اپی نفرین «Epinephrin»

- گشاد کننده برونش - وازوپرسور - محرک قلب - داروی کمکی در بی حسی موضعی - داروی ضد گلوکوم

آتروپین «Atropin Sulfate»

- درمان برادی کاردی علامت دار - آریتمی جانکشنا - کاهش ترشحات و بلوک رفلکس های قلبی واگ قبل جراحی - آنتی دوت برای مسمومیت با حشره کش ها ((سموم ارگانوفسفره)) - درمان کوتاه مدت برونکو اسپاسم

آمیودارون «Amiodarone Hydrochloride»

- در آریتمی های فوق بطنی - فیبریلاسیون بطنی - تکیکاردی بطنی ناپایدار - فیبریلاسیون دهلیزی

لیدوکائین «Lidocaine»

- داروی بی حسی موضعی - آنتی آریتمی بطنی

آدنوزین «Adenosine»

- درمان تکیکاردی حمله ای و تبدیل آن به ریتم سینوسی - ولف پارکینسون

نیتروگلیسرین «Nitroglycerin»

عضلات صاف عروقی را در بستر وریدی و شریانی شل کرده و مصرف اکسیژن توسط میوکارد را کاهش می دهد. ضمناً موجب گشاد شدن عروق کرونر و افزایش جریان خون به بافت های اسکیمیک نیز می شود و اثر آنتی آنژیینی اعمال می کند. دارو با گشاد کردن عروق محیطی در کاهش فشار خون نیز موثر است ، ضمناً در درمان ادم ریوی و نارسایی قلبی موثر است ((بدلیل کاهش پیش بار و پس بار)) و اثر وازودیلاتوری دارد.

- پیشگیری از حملات آنژین مزمن ((در بیمارانی که Chest pain دارند تا حداکثر 3 دوز و هر پنج دقیقه مجاز به مصرف می باشند))
- کاهش آنژین صدری حاد یا پیشگیری یا به حداقل رساندن آن
- برای هیپرتانسیون

دوپامین «Dopamine Hydrochloride»

تحریک سیستم عصبی سمپاتیک – وازودیلاتیون عروق کلیوی، مزانتر، کرونر و بستر عروق داخل مغزی می شود.

- درمان کمکی در شوک برای افزایش برون ده قلبی فشار خون و جریان ادرار
- درمان کوتاه مدت نارسایی قلبی مزمن شدید و مقاوم به درمان
- تاکی آریتمی و AF و Af

دوبوتامین «Dobutamine Hydrochloride»

قدرت انقباضی قلب و حجم ضربه ای را افزایش و مقاومت محیطی و نیز پیش بار را کاهش می دهد.

- افزایش برون ده قلبی در درمان کوتاه مدت نارسایی جبرانی قلب ناشی از کاهش قدرت انقباضی

هپارین «Heparin Sodium»

- ضد انعقاد – در ترومبوآمبولی ها - بیماران قلبی MI

وراپامیل «Verapamil Hydrochloride»

کاهش پس بار و همچنین کاهش سرعت ضربان قلب باعث کاهش نیاز میوکارد به اکسیژن می شود و کاهش اسپاسم عروق کرونر و افزایش اکسیژن رسانی به قلب همچنین گشاد شدن عروق محیطی و کاهش هدایت AV از مکانسیم های دارو است.

- درمان هیپرتانسیون
- پیشگیری از تاکیکاردی فوق بنی حمله ای تکرار شونده
- کنترل ریتم بطنی در بیماران دیژیتالیزه مبتلا به فلوتر یا فیبریلاسیون مزمن دهلیزی
- درمان آنژین واریانت

WWW.BIDMESHKONLINE.IR

پروپرانولول «Propranolol»

- کاهش فشار خون - گلوکوم - سر درد میگرنی – درد قلبی
- برای افرادی که یک بار MI داشته اند
- اختلالات روانی – اضطراب – استرس

دیگوکسین «Digoxin»

کاهش سرعت ضربان قلب روی SA - دوره ی عدم پاسخ SA را تضعیف و هدایت به گره AV را طولانی می کند.

- نارسایی قلبی - AF و Af دهلیزی - VT دهلیزی

فوروزماید «Furosemide»

- دیورتیک - مهار بازجذب سدیم و کلر
- اثر ضد هیپرتانسیون - دیلاتاسیون عروق کلیه و عروق محیطی

نالوکسان «Naloxane Hydrochloride»

- آنتاگونیست مخدر
- دپرسیون بعد از عمل جراحی ناشی از مخدر ها
- تست نالوکسان برای تشخیص وابستگی به مخدر ها
- تضعیف تنفسی ناشی از مخدر ها شامل مخدر های طبیعی و صنعتی

میدازولام «Midazolame»

- مکانیسم دقیق آن شناسایی نشده به نظر می رسد اثر تضعیف کنندگی روی CNS بطور کوتاه مدت دارد.
- تسکین بخش - ضد اضطراب قبل از جراحی
- انفوزین پیوسته بعنوان آرام بخش در بیماران انتوبه و تحت ونتیلاسیون مکانیکی طی بیهوشی یا بخش مراقبت های ویژه
- بعنوان آرامبخش - ضد اضطراب
- القا بیهوشی عمومی

دiazepam «Diazepam»

- اثرات تضعیف کننده در کلیه سطوح CNS
- داروی انتخابی صرح مداوم - درمان اختلالات اضطرابی
- جهت تسکین کوتاه مدت نشانه های اضطراب
- تخفیف اضطراب و تشنج پیش از جراحی
- تسکین نشانه های قطع مصرف الکل
- اسپاسم عضلات اسکلتی همراه با فلج

فنی تونین «Phenytoin»

- ضد تشنج - آنتی دیس ریتمی های بطنی که به درمان به لیدوکائین پاسخ نداده اند.
- تشنج ژنرالیزه تونیک - کلونیک - اپیلپسی

WWW.BIDMESHKONLINE.IR

فنوباربیتال سدیم «Phenobarbital»

- اثر ضد تشنج - آرامبخشی - هیپربیلیروبینی - اپیلپسی - بی خوابی کلستانز مزمن
- تمام اپیلپسی ها به جز تشنج آبنس - تب و تشنج در کودکان
- ادم حاد ریه - ادم - هیپرکلسمی - هیپرتانسیون - حملات هیپرتانسیون - نارسایی حاد و مزمن کلیه

هالوپریدول «Haloperidol»

- آرامبخش
- درمان تظاهرات اختلال روانی
- سایکوز حاد و مزمن
- برای درمان کوتاه مدت کودکان بیش فعال و جنگ و تهیج پذیر در حد انفجار
- در شیمی درمانی برای اثرات ضد تهوع و استفراغ

کلسیم «Calcium Guloconatte»

- درمان اوژانسی هیپوکلسمی - هیپرکالمی - هیپرمنیزیمی - در خلا انتقال خون - در احیاء قلبی

هیدروکورتیزون «Hydrocortisone»

- بی کفایتی کلیه - ضد التهاب - کولیت اولسراتیو - نارسایی فوق کلیوی - سرکوب سیستم ایمنی - درمان جایگزین در بی کفایتی کورتکس ادرنال
- کاهش کلسیم سرم در هیپرگلسمی

رانیتیدین «Ranitidine HCl»

- عملکرد هیستامین در گیرنده های H2 سلول های پاریتال معده را مهار و ترشح پایه و شبانه اسید معده را مهار می کند
- اولسرادنودنوم
- اولسراگاستریک
- ریفلکس گاستروازوفازیال

متوکلوپرامید «Metoclopramide»

- اثر ضد استفراغی - موجب افزایش تون اسفنکتر گاسترو ازوفازیال و تحریک دستگاه گوارش فوقانی می شود.
- پیشگیری یا کاهش تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی
- ریفلکس - تهوع و استفراغ بعد جراحی