



پیام نوریها

public channel



✓ کانال پیام نوریها در سال 95 با هدف تهیه جزوات و نمونه سوالات افتتاح و از همان ابتدای تاسیس کوشیده است با تکیه بر تلاش بی وقفه، کارگروهی و فعالیت های بدون چشمداشت کاربران متمایز خود، قدمی کوچک در راه پیشرفت ارائه خدمات به دانشجویان این مرز و بوم بردارد.

@Payamnorria

telegram.me/Payamnorria

رایگان است و همیشه رایگان میماند



اطلاع از اخبار و دانلود جزوات و نمونه سوالات

[برای ورود به کانال تلگرامی پیام نوریها کلیک کنید](#)

" کانال و خانواده تلگرامی پیام نوریها "

با عضویت در کانال و به آرشیو زیر دسترسی پیدا کنید

✓ تمام نمونه سوالات به روز تا آخرین دوره

✓ جزوات درسی

✓ بیش از ۱۰۰ فلش کارت دروس

✓ اخبار به روز پیام نور

✓ فیلم و فایل آموزشی اختصاصی

✓ انجام انتخاب واحد و حذف و اضافه

✓ پاسخگویی به سوالات دانشجویان

✓ معرفی گروه و انجمن های پیام نوری

✓ طنز و توییت دانشجویی

به یکی از بزرگترین کانال های پیام نوری بپیوندید

[برای ورود به کانال تلگرامی پیام نوریها کلیک کنید](#)



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۲۴۰ - ۱۲۱۷۰۶۱

۱- ویژگی اصلی کدام اختلال شخصیت، الگوی پایداری از سوءظن و عدم اعتماد به دیگران است؟

۱. پارانویا ۲. ضد اجتماعی ۳. اسکیزوتیید ۴. دوری گزین

۲- مهمترین ناحیه دخیل در افسردگی می باشد؟

۱. سیستم لیمبیک ۲. تالاموس ۳. هیپو تالاموس ۴. هیپوفیز

۳- کدام گزینه معمولا مشهورترین نشانه اسکیزوفرنی است؟

۱. آشفتگی در فرایندهای فکری ۲. توهم
۳. گفتار آشفته ۴. فقدان عاطفه

۴- فرضیه دوپامین مربوط به کدام اختلال است؟

۱. اسکیزوفرنی ۲. MDD
۳. اختلال بی نظمی خلقی ایدایی ۴. اختلال دو قطبی

۵- برخی از مطالعات استرس مادر را در به وجود آمدن این اختلال دخیل دانسته اند؟

۱. فوبی ۲. افسردگی ۳. وسواس ۴. اسکیزوفرنیا

۶- یکی از ناتوان کننده ترین اختلال های مربوط به بهداشت روانی است؟

۱. افسردگی ۲. شیدایی ۳. اسکیزوفرنی ۴. MDD

۷- DSM-IV-TR ده نوع اختلال شخصیتی را در چند خوشه معرفی می کند؟

۱. 3 ۲. 2 ۳. 4 ۴. 5

۸- معمولا خواب non - REM به چند مرحله کوچکتر تقسیم می شود؟

۱. 2 ۲. 3 ۳. 5 ۴. 4

۹- برای تشخیص این بیماری نقص ها باید به یک آسیب در کارکرد اجتماعی منجر گردد؟

۱. آلزایمر ۲. صرع ۳. پارکینسون ۴. MS

۱۰- دومین اختلال شایع عصب شناختی بعد از سگته است؟

۱. پارکینسون ۲. صرع ۳. الزایمر ۴. زوال عقل

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۲۴۰

۱۱- شایع ترین نوع اسکیزوفرنیا کدام گزینه است؟

۱. نوع پارانوئید ۲. نوع آشفته ۳. نوع کاتانویک ۴. نوع باقی مانده

۱۲- یکی از مباحثه انگیزترین و شدیدترین اختلال های روانی است؟

۱. افسردگی ۲. مانیا ۳. اسکیزوفرنی ۴. وسواس

۱۳- SAD مربوط به کدام اختلال است؟

۱. اختلال اسکیزوفرنی شکل ۲. اختلال اسکیزوافکتیو
۳. اختلال هذیانی ۴. اختلال افسردگی فصلی

۱۴- از نظر چه کسی خودکشی نشان دهنده یک آرزوی سرکوب شده برای کشتن یک موضوع محبوب از دست رفته است؟

۱. بک ۲. سلیگمن ۳. فروید ۴. اریکسون

۱۵- هم اکنون چند دسته داروی ضد افسردگی به کار می رود؟

۱. 2 ۲. 3 ۳. 4 ۴. 5

۱۶- کدام انتقال دهنده ها از نظر زیست شناختی در سبب شناسی افسردگی دخیل دانسته شده اند؟

۱. دوپامین و استیل کولین ۲. دوپامین و گابا
۳. اپی نفرین و نور اپی نفرین ۴. نور اپی نفرین و سروتونین

۱۷- در کدام اختلال شخصیتی افراد، خودنما و پرزرق و برق هستند؟

۱. پارانوئید ۲. وابسته ۳. وسواسی- جبری ۴. مرزی

۱۸- کدام اختلال رایجترین اختلال روانی می باشد؟

۱. اضطراب ۲. فوبی ۳. وسواس ۴. افسردگی

۱۹- معمولاً اختلالات شخصیت از چه سنی قابل تشخیص است؟

۱. هفت سال به بالا ۲. پانزده سال به بالا
۳. هیجده سال به بالا ۴. بیست و پنج سال به بالا

۲۰- ویژگی کدام دسته از اختلالات شخصیت، عجیب و غریب یا نامتعارف بودن است؟

۱. وابسته ۲. نمایشی ۳. دوری گزین ۴. پارانوئید



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۲۴۰

۲۱- در کدام نوع از اختلالات شخصیت، خویشتن از نظر اجتماعی ناکارآمد و بی تفاوت است؟

۱. ضد اجتماعی ۲. وابسته ۳. اسکیزوئید ۴. پارانوئید

۲۲- کدام مورد به عنوان اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه معروف است؟

۱. اسکیزوئید ۲. اسکیزوتایپال ۳. مرزی ۴. دوری گزین

۲۳- قبلاً به کدام اختلال شخصیت، هیستریک گفته می شد؟

۱. ضد اجتماعی ۲. مرزی ۳. خودشیفته ۴. نمایشی

۲۴- مکانیسم دفاعی در کدام اختلال شخصیت، جداسازی است و همه چیز را به کاملاً خوب یا کاملاً بد تقسیم می کند؟

۱. پارانوئید ۲. دوری گزین ۳. مرزی ۴. اسکیزوئید

۲۵- به کدام مورد اختلال شخصیت منفی گرا گفته می شود؟

۱. وسواسی - جبری ۲. پارانوئید ۳. افسرده ۴. منفعل پرخاشگر

۲۶- کدام یک از مراحل خواب non-REM، خواب عمیق نامیده می شود؟

۱. سوم و چهارم ۲. دوم و سوم ۳. اول و دوم ۴. اول و سوم

۲۷- اولین دور از خواب REM معمولاً چه مدت بعد از به خواب رفتن رخ می دهد؟

۱. نیم ساعت تا یک ساعت ۲. یک ساعت تا یک ساعت و نیم
۳. دو ساعت تا دو ساعت و نیم ۴. یک ربع تا یک ساعت

۲۸- کدام مورد به ناپهنجاری های همراه خواب مربوط است؟

۱. بد خوابی ۲. بی خوابی اولیه ۳. حمله خواب ۴. کابوس

۲۹- درمان کدام مورد از مشکل ترین مسائل در اختلالات خواب است؟

۱. بی خوابی اولیه ۲. اختلال خواب مرتبط با تنفس
۳. حمله خواب ۴. وحشت شبانه

۳۰- اصلی ترین ملاک تشخیص در کدام اختلال، حملات غیرقابل مقاومت خواب در طول روز به مدت حداقل 3 ماه است؟

۱. پرخوابی اولیه ۲. نارکولپسی ۳. خواب گردی ۴. کاتاپلکسی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۲۴۰

۳۱- مهمترین داروی درمان وحشت شبانه و خوابگردی چیست؟

۱. ضد افسردگی ۲. زولپیدم ۳. داروهای سه حلقه ای ۴. دیازپام

۳۲- مشکل در پاسخ جنسی را چه می نامند؟

۱. پارافیلیاها ۲. بدکارکردی های جنسی
۳. اختلال هویت جنسی ۴. تحریک جنسی

۳۳- کدام درمان توسط مسترز و جانسون در رابطه با مشکل نعوظی مطرح شد؟

۱. تمرکز بر آمادگی پذیرش حسی ۲. پیش نظاره گری خویشتن
۳. تغییر تخیلات جنسی ۴. وابستگی تخیلی جنسی

۳۴- در کدام اختلال جنسی افراد معتقدند که با جنسیت غلط به دنیا آمده اند؟

۱. مبدل پوشی ۲. هویت جنسی
۳. بدکارکردی های جنسی ۴. یادگارخواهی جنسی

۳۵- در کدام اختلال، فرد با رفتارهای خشونت آمیز و آسیب رسان نسبت به موضوع جنسی خود به برانگیختگی جنسی می رسد؟

۱. نمایشگری جنسی ۲. تماشاگری جنسی ۳. سادیسم جنسی ۴. مازوخیسم جنسی

۳۶- مهمترین نظریه های پذیرفته شده در مورد اختلال هویت جنسی کدامند؟

۱. شرطی شدن در مراحل اولیه زندگی ۲. اضطراب جدایی مفرط اولیه
۳. آشفتگی هورمون های جنسی ۴. جلب رضایت و توجه مفرط فرزندان توسط مادر

۳۷- بر اساس نظر مسترز و جانسون رایج ترین علت مربوط به اختلال نعوظی چیست؟

۱. جسمانی ۲. روان شناختی ۳. یادگیری ۴. هورمونی

۳۸- حدود چند درصد از جمعیت عمومی مبتلا به اختلال شخصیت مرزی هستند؟

۱. یک درصد ۲. دو درصد ۳. سه درصد ۴. پنج درصد

۳۹- کدام اختلال در ICD-10 تحت عنوان اختلال شخصیت مضطرب مطرح شده است؟

۱. مرزی ۲. وابسته ۳. وسواسی - جبری ۴. دوری گزین



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: .

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: .

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۲۴۰

۴۰- کدام دسته از داروها جهت کاهش و کنترل دوره های پرخاشجویی تکانشی مفیدند؟

۲. بازدارنده جذب مجدد سروتونین- ال دو پا

۱. باربیتورات ها - لیتیوم

۴. محرک ها- ال دو پا

۳. لیتیوم - بازدارنده جذب مجدد سروتونین

Payamnorja



98-1

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
1	الف	عادي
2	الف	عادي
3	الف	عادي
4	الف	عادي
5	د	عادي
6	ج	عادي
7	الف	عادي
8	د	عادي
9	الف	عادي
10	ب	عادي
11	الف	عادي
12	ج	عادي
13	د	عادي
14	ج	عادي
15	ب	عادي
16	د	عادي
17	د	عادي
18	د	عادي
19	ج	عادي
20	د	عادي
21	الف	عادي
22	ب	عادي
23	د	عادي
24	ج	عادي
25	د	عادي
26	الف	عادي
27	ب	عادي
28	د	عادي
29	الف	عادي
30	ب	عادي
31	د	عادي
32	ب	عادي
33	الف	عادي
34	ب	عادي
35	ج	عادي
36	الف	عادي
37	ب	عادي
38	ب	عادي
39	د	عادي
40	ج	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۱- اختلال وحشت شبانه چه زمانی از خواب رخ می دهد؟

۱. ثلث اول شب حالت خواب عمیق
۲. ثلث دوم شب حالت خواب عمیق
۳. ثلث سوم حالت REM
۴. ثلث اول خواب non-REM

۲- اختلال شخصیت در چه زمانی تشخیص داده می شود؟

۱. افراد 12 سال به بالا (نوجوان)
۲. افراد 6 سال به بالا
۳. افراد 18 سال به بالا
۴. دوران کودکی

۳- اختلالات اسکیزوتیپ و وسواسی - جبری، به ترتیب جزو کدام یک از اختلالات شخصیت هستند؟

۱. عجیب و غریب، هیجانی
۲. نامتعارف، مضرب
۳. هیجانی، مضرب
۴. مضرب، نامتعارف

۴- نیاز افراطی به تحسین، فقدان همدلی، خیالبافی درباره موفقیت و قدرت، از مشخصه های اصلی کدام اختلال است؟

۱. دوری گزین
۲. وابسته
۳. خود شیفته
۴. نمایشی

۵- مدل پنج عاملی کوستا و مکره از شخصیت ضد اجتماعی در کدام مقوله زیر می گنجد؟

۱. صراحت پایین، روان رنجور خویی پایین، برون گرایی پایین، هم رای پایین، فقدان وظیفه شناسی
۲. وظیفه شناسی پایین، درون گرایی پایین، هم رایی پایین، صراحت پایین، روان رنجور خویی پایین
۳. روان رنجور خویی بالا، صراحت پایین، برون گرایی پایین، هم رایی پایین، فقدان وظیفه شناسی و جدیت
۴. صراحت بالا، روان رنجور خویی بالا، جدیت و وظیفه شناسی پایین، هم رایی بالا، برون گرایی بالا

۶- شیوع اختلال شخصیت نمایشی چند درصد و در کدام جنس بیشتر است؟

۱. 2 تا 3 درصد، مرد
۲. 2 تا 3 درصد، زن
۳. 1 تا 2 درصد، زن
۴. 2 درصد، مرد

۷- در بین مبتلایان به شخصیت ضد اجتماعی، کدام اختلال شایع است؟

۱. اسکیزوتایپال
۲. دوری گزین
۳. نمایشی
۴. افسردگی

۸- شایع ترین اختلال شخصیت که در کلینیک های بهداشت روانی مشاهده می شود، کدام است؟

۱. ضد اجتماعی
۲. پارانوییدی
۳. افسرده
۴. وابسته

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۹- کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های اختلال منفعل پرخاشگر است؟

۱. بدون دلیل از افراد صاحب قدرت انتقاد کرده و آنها را تحقیر می کند

۲. در مورد دیگران منفی باف، منتقد و نکته سنج عمل می کند

۳. به جزئیات و مسائل حاشیه ای توجه زیادی دارد

۴. خلق روزمره بطور بارز با اندوه و دلتنگی همراه است

۱۰- کدام مرحله از خواب حافظه را تحکیم می بخشد؟

۱. مرحله سوم و چهارم non_Rem

۲. مرحله دوم non_Rem

۳. Rem

۱۱- نابهنجاری های درون زا در مکانیزم های ایجاد کننده یا تنظیم کننده زمان خواب و بیداری موجب کدام دسته از اختلالات خواب می شود؟

۱. اختلالات اولیه خواب

۲. اختلال همراه خواب

۳. اختلال خواب ناشی از بیماری جسمانی

۱۲- به بی خوابی اولیه ای که سه شب در هفته و به مدت بیش از یک ماه طول بکشد، چه می گویند؟

۱. دیس سومنیا

۲. نارکولپسی

۳. آپنه

۴. بی خوابی مزمن

۱۳- درمان کدام اختلال خواب از مشکل ترین مسایل در اختلال خواب است؟

۱. خواب گردی

۲. اختلال کابوس

۳. بی خوابی اولیه

۴. دندان سایبی

۱۴- در بی خوابی دور باطل بین چه عواملی شکل می گیرد؟

۱. اضطراب - بی خوابی

۲. ترس - بی خوابی

۳. ترس - رویداد استرس زا

۴. اضطراب - کابوس

۱۵- مهم ترین درمان نارکولپسی کدام است؟

۱. درمان آرمیدگی

۲. دارودرمانی

۳. درمان شناختی-رفتاری

۴. شرطی سازی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۱۶- اختلال واژینیسیم جزء کدام طبقه اختلالات جنسی است؟

۱. اختلالات مربوط به درد جنسی
۲. اختلالات میل جنسی
۳. بدکارکردی ناشی از بیماری جسمی
۴. بدکارکردی جنسی ناشی از مواد

۱۷- به تمایلات یا رفتار جنسی ناپهنجار که برای خود فرد، شریک جنسی و یا کل جامعه مضر است، چه می گویند؟

۱. بیزاری جنسی
۲. یادگارخواهی
۳. نمایشگری جنسی
۴. پارافیلیا

۱۸- اختلال هویت جنسی از چه سنی قابل ردیابی است؟

۱. بعد از سه سالگی
۲. قبل از بلوغ
۳. قبل از سه سالگی
۴. زمان بلوغ و آشکار شدن علائم جنسیتی

۱۹- نظریه نیوکامب درباره علل مبدل پوشی مردان چیست؟

۱. مادر مبتلایان معمولاً صمیمی و حمایتگر و پدرشان سرد و تهدید کننده هستند
۲. هر کودکی هر گاه لباس جنس مخالف را بپوشد، تقویت شده و رفتار را ادامه می دهد
۳. مادران مردان مبدل پوش نگرش خصومت آمیز نسبت به مردان دارند
۴. مردان مبدل پوش نسبت به مردان دیگر، والدین خود را فاقد ویژگیهای مربوط به نوع جنس و بیشتر دارای ویژگیهای جنس مقابل ارزیابی می کنند

۲۰- برای درمان بی خوابی اگر فرد طی چند دقیقه به خواب نرود باید از رختخواب بلند شود؟

۱. 40 دقیقه
۲. ۲۰ دقیقه
۳. ۱۰ دقیقه
۴. ۳۰ دقیقه

۲۱- چند درصد مردم بی خوابی مزمن را گزارش می کنند؟

۱. 5 الی 10 درصد
۲. 30 الی 40 درصد
۳. 20 الی 25 درصد
۴. 10 الی 15 درصد

۲۲- مردان چند برابر زنان در اثراقدام به خودکشی می میرند؟

۱. سه برابر
۲. دو برابر
۳. چهار برابر
۴. مساوی

۲۳- مهم ترین ناحیه دخیل در افسردگی می باشد؟

۱. بادامه و آمیانه
۲. هیپوکامپ و مخچه
۳. سیستم لیمبیک
۴. کمریند قدامی

۲۴- نظریه درماندگی آموخته شده مربوط به چه کسی می باشد؟

۱. بک
۲. فروید
۳. ایس
۴. سلینگمن

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۲۵- در نظریه آرون بک افسردگی با کدام گزینه همراه است؟

۱. طرحواره های منفی در بزرگسالی
۲. دیدگاه مثبت به خود ، دنیا و جهان
۳. دیدگاه منفی درباره خود، جهان و آینده
۴. دیدگاه منفی نسبت به خود و مثبت درباره دیگران

۲۶- کدام یک از انتقال دهنده های عصبی در افسردگی نقش دارند؟

۱. دوپامین - گابا
۲. سروتونین - نوراپی نفرین
۳. گابا- استیل کولین
۴. آندورفین - آدرنالین

۲۷- کدام گزینه مربوط به مانیا می باشد؟

۱. افزایش خواب
۲. عزت نفس کاذب
۳. اعتماد به نفس پایین
۴. کم حرفی

۲۸- کدام هورمون در ابتلا به افسردگی فصلی دخیل دانسته شده است؟

۱. ملاتونین
۲. نوراپی نفرین
۳. پرولاکتین
۴. اکس توسین

۲۹- کدام گزینه سه طبقه اصلی داروهای ضد افسردگی می باشد؟

۱. ضد تشنج ها، دیاکوت ، لیتیوم
۲. بازدارنده های منوآمین اکسیداز، ضد افسردگی سه حلقوی، بازدارنده جذب سروتونین
۳. ضد افسردگی سه حلقه ای، لیتیوم، MAO
۴. ضد افسردگی MAO، پارانات، لیتیوم

۳۰- یکی از مداخلات دارویی جهت مقابله با عوارض بیماری آلزایمر بالا بردن سطوح کدام انتقال دهنده عصبی در مغز بیماران می باشد؟

۱. دوپامین
۲. سروتونین
۳. استیل کولین
۴. اپی نفرین

۳۱- کدام گزینه مربوط به نشانه های منفی اسکیزوفرنی می باشد؟

۱. بی ارادگی و ناگویی ، هذیان
۲. بی ارادگی و ناگویی، افت عاطفی
۳. توهمات ، گفتار آشفته
۴. توهم هذیان

۳۲- اسکیزوفرنیا مربوط به افزایش کدام انتقال دهنده عصبی می باشد؟

۱. اپی نفرین
۲. سروتونین
۳. دوپامین
۴. گابا

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۳- به وسیله مطالعات PET کارکرد آسیبی کدام لوب در بیماران اسکیزوفرنی گزارش شده است؟

۱. پیشانی ۲. آهیانه ای ۳. پس سری ۴. گیجگاهی

۳۴- کدام نوع اسکیزوفرنی با آشفتگی های روانی - حرکتی بازر مشخص می شود؟

۱. پارانوئید ۲. کاتاتونیک ۳. باقی مانده ۴. آشفته

۳۵- کدام یک از گزینه های زیر شدیدترین اختلال روانی می باشد؟

۱. افسردگی ۲. اسکیزوفرنی ۳. فوبی ۴. آلزایمر

۳۶- LH مربوط به کدام گزینه می باشد.

۱. تالاموس ۲. هیپو تالاموس شکمی ۳. هیپو تالاموس جانبی ۴. هیپوفیز

۳۷- اوج سن بی اشتهایی روانی چند سالگی می باشد؟

۱. 14 تا 18 ۲. 18 تا 25 ۳. 30 تا 35 ۴. 12

۳۸- بر اساس DSM- IV-TR اسکیزو فرنی چند نوع می باشد؟

۱. 3 ۲. 5 ۳. 4 ۴. 2

۳۹- برای درمان اسکیزوفرنیا کدام دارو جزء داروهای جدید می باشد؟

۱. فنو تیازین ها ۲. کلرو پرومازین ۳. لورازپام ۴. کلوزاپین

۴۰- کدام گزینه نتیجه تخریب پیش رس سیستم های مغزی است و نرون های هیپو کامپی تخریب می شوند؟

۱. دلیریوم ۲. زوال عقل عروقی ۳. آلزایمر ۴. زوال عقل پیشانی-گیجگاهی



شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	الف	عادي
2	ج	عادي
3	ب	عادي
4	ج	عادي
5	الف	عادي
6	ب	عادي
7	د	عادي
8	د	عادي
9	الف	عادي
10	ج	عادي
11	الف	عادي
12	د	عادي
13	ج	عادي
14	الف	عادي
15	ب	عادي
16	الف	عادي
17	د	عادي
18	ج	عادي
19	د	عادي
20	ب	عادي
21	د	عادي
22	الف	عادي
23	ج	عادي
24	د	عادي
25	ج	عادي
26	ب	عادي
27	ب	عادي
28	الف	عادي
29	ب	عادي
30	ج	عادي
31	ب	عادي
32	ج	عادي
33	الف	عادي
34	ب	عادي
35	ب	عادي
36	ج	عادي
37	الف	عادي
38	ج	عادي
39	د	عادي
40	ج	عادي



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۱- کدام گزینه مربوط به دسته رشد هیجانی ، خود نما می باشد؟

۱. پارانوئید ۲. مرزی ۳. وابسته ۴. اسکیزوئید

۲- در کدام دسته از اختلالات شخصیتی ، تحت تاثیر استرس ، واقعیت سنجی فرد به آسانی درهم می شکنند؟

۱. اختلال شخصیت اجتنابی ۲. اختلال شخصیت نمایشی
۳. اختلال شخصیت وابسته ۴. اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

۳- اختلال شخصیت مرزی ، معمولاً در کدام دوره ی زندگی فرد شروع می شود؟

۱. کودکی ۲. بزرگسالی ۳. نوجوانی ۴. میانسالی

۴- افراد مبتلا به کدام دسته از اختلال شخصیتی ، معمولاً شغل های حاشیه ای انتخاب می کنند ، پیشرفت کمی دارند ولی در حرفه شان راضی بنظر می رسند؟

۱. اختلال شخصیت وسواسی - جبری ۲. اختلال شخصیت ضد اجتماعی
۳. اختلال شخصیت شخصیت وابسته ۴. اختلال شخصیت دوری گزین

۵- مازوخیست های اخلاقی چه زمانی احساس لذت می کنند؟

۱. وقتی مورد تحقیر دیگران قرار گیرند. ۲. وقتی خشونت فیزیکی انجام دهند.
۳. وقتی با دیگران بصورت پرخاشگرانه رفتار کنند. ۴. وقتی دیگران را مورد تحقیر قرار می دهند.

۶- کدامیک از موارد زیر ، جزء ویژگی اصلی اختلال شخصیتی نمایشی محسوب می شود؟

۱. حسود و پرنخوت ۲. تجربه هیجانی سطحی
۳. احساس عدم کفایت ۴. رفتارهای اغواگری جنسی متناسب

۷- اسب آبی مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. هیپوکامپ ۲. بادامه ۳. مخچه ۴. سیستم لیمبیک

۸- در نزدیکی های صبح کل دوره خواب فرد ، در کدامیک از مراحل زیر سپری می شود؟

۱. در مراحل 1 و 2 و 3 ۲. در مراحل 1 و 2 و خواب REM
۳. در مراحل 2 و 3 خواب REM ۴. در مراحل 2 و 3 خواب NREM

۹- از بین رفتن ناگهانی قوام عضلانی چه نامیده می شود؟

۱. تجربه کاتاپلکسی ۲. هیپناگوژیک ۳. هیپنویامیک ۴. آینه



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۱۰- در کدامیک از انواع پارافیلیا، فرد با رفتارهای خشونت آمیز و آسیب رساندن نسبت به موضوع جنسی خود، به برانگیختگی جنسی دست می یابد؟

۱. مازوخسیم جنسی ۲. نمایشگری جنسی ۳. سادیسم جنسی ۴. یادگارخواهی جنسی

۱۱- مهمترین درمان دارویی شناخته شده برای اختلال نعوظی چه می باشد؟

۱. کلوزاپین ۲. سیلدنافیل ۳. دسی پرامین ۴. پروزاک

۱۲- کدامیک از نظریه های زیر، عمدتاً به فرآیند تقویت رفتارهای جنسی مقابل در کودکان از سوی والدین تاکید دارد؟

۱. شناختی ۲. شرطی شدن در مراحل اولیه زندگی ۳. روان تحلیلی ۴. زیست شناختی

۱۳- در کدامیک از اختلالات زیر، باید دست کم در طول زندگی یک دوره ی هیپومانیک و یک دوره ی افسردگی اساسی وجود داشته باشد؟

۱. اختلال دو قطبی II ۲. اختلال دو قطبی I ۳. افسرده خوبی ۴. ادواری خوبی

۱۴- افسردگی با کدامیک از انتقال دهنده های عصبی زیر ارتباط دارد؟

۱. سطوح بالای نور اپی نفرین و دو پامین ۲. سطوح پایین نور اپی نفرین و دو پامین ۳. سطوح بالای ملاتونین و دو پامین ۴. سطوح بالای نور اپی نفرین و سروتونین

۱۵- داروهای ضد افسردگی چند روز زمان نیاز دارند تا افسردگی را کاهش دهند؟

۱. ۱۰ تا ۲۰ روز ۲. ۲۸ روز ۳. ۱۵ روز ۴. ۷ تا ۱۴ روز

۱۶- تریپتوفان، ماده پیشتاز اصلی کدامیک از انتقال دهنده های عصبی زیر است؟

۱. اپی نفرین ۲. استیل کولین ۳. سروتونین ۴. دوپامین

۱۷- کدامیک از موارد زیر به شخص کمک می کند تا میزان اهمیت هیجانی یک محرک را بسنجد؟

۱. هیپوکامپ ۲. بادامه ۳. تالاموس ۴. هیپوتالاموس

۱۸- هورمون اصلی فشار روانی چیست؟

۱. کورتیزول ۲. تیروکسین ۳. آدرنالین ۴. گونادوتروفین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۱۹- در کدام یک از نظریه های زیر ، افکار و باورهای منفی علت عمده ی افسردگی تلقی می گردند؟

۱. نظریه های روانکاوی
۲. نظریه های شناختی
۳. نظریه های کنش گرایی
۴. نظریه های زیستی

۲۰- کدامیک از روانشناسان زیر اعتقاد دارد که افسردگی با سه گانگان منفی همراه است؟

۱. یونگ
۲. سلیگمن
۳. فروید
۴. آرون بک

۲۱- کدامیک از عوامل زیر می تواند افزایش نشانه های شیدایی در طول زمان را پیش بینی کند؟

۱. محرومیت از پاداش
۲. هیجان ابراز شده
۳. عدم حمایت اجتماعی
۴. محرومیت از خواب

۲۲- در کدام یک از فنون زیر ، فرد ترغیب می شود در فعالیت های لذت بخشی شرکت جوید که می توانند افکار مثبتی را درباره ی خویشتن و زندگی بوجود آورند؟

۱. فعال سازی شناختی
۲. فعال سازی روانی
۳. فعال سازی رفتاری
۴. فعال سازی هیجانی

۲۳- کدامیک از درمان های زیر ، به خانواده در زمینه بیماری اختلال دوقطبی آموزش می دهد، پیام رسانی های خانواده را بالا می برد و مهارت های مساله گشایی را ایجاد می کند؟

۱. FFT
۲. CT
۳. IPT
۴. ECT

۲۴- شایع ترین و پژوهش شده ترین درمان زیستی یا غیر زیستی مورد استفاده در اختلالهای افسردگی کدام مورد زیر است؟

۱. درمان شناختی - رفتاری
۲. درمان بین فردی
۳. دارو درمانی
۴. درمان روان تحلیلی

۲۵- کدامیک از داروهای زیر ، نخستین تثبیت کننده ی خلقی شناخته شده است؟

۱. دیپاکوت
۲. الانزاپین
۳. لیتیم
۴. سرتالین

۲۶- کدامیک از رویکردهای زیر ، نوید بخش ترین درمان برای کاهش گرایشات خود کشی ، به شمار می آیند؟

۱. تکاملی
۲. بینش محور
۳. شناختی - رفتاری
۴. زیستی

۲۷- کدامیک از موارد زیر ، مقدار لذتی اشاره دارد که در دم یا در لحظه ی حضور چیزی لذت بخش، تجربه می شود؟

۱. لذت پایانی
۲. لذت کاذب
۳. لذت انتظاری
۴. لذت ابتدایی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۲۸- افت عاطفی به چه چیزی اشاره دارد؟

۱. به فقدان تجلی بیرونی هیجان
۲. به فقدان تجلی درونی هیجان
۳. به فقدان ماهیت هیجان
۴. به فقدان تجلی درونی و معکوس هیجان

۲۹- حوزه ای که شامل جلوه ی بیرونی هیجان و آواگری می شود چه نام دارد؟

۱. حوزه دریافتی
۲. حوزه تجربه ای
۳. حوزه روانی
۴. حوزه بیانی

۳۰- خطر ابتلا به اسکیزوفرنی در جمعیت عمومی چند درصد است؟

۱. اندکی بیشتر از ۱ درصد
۲. ۲ درصد
۳. ۸ درصد
۴. اندکی کمتر از ۱ درصد

۳۱- کدامیک از موارد زیر در رفتارهایی مانند گفتار، تصمیم گیری، هیجان و رفتارهای هدفمند نقش دارد؟

۱. قشر گیجگاهی
۲. قشر آهیانه
۳. قشر پیش پیشانی
۴. قشر پس سری

۳۲- یکی از عوامل محیطی که در میان نوجوانان به عنوان عامل خطر بار برای اسکیزوفرنی مورد بررسی قرار گرفته است کدام مورد زیر می باشد؟

۱. کوکائین
۲. آمفتامین
۳. کانابیس
۴. ال اس دی

۳۳- ناتوانی در آرام و قرار داشتن را چه می نامند؟

۱. آکاتزی
۲. دیسکینزی
۳. دیستونی
۴. کاتاپلکسی

۳۴- در عارضه ای به نام نشانگان بدخیم نورولپتیک ، کدامیک از موارد زیر رخ می دهد؟

۱. ضربان قلب کاهش می یابد.
۲. ضربان قلب بالا می رود.
۳. کاهش وزن
۴. کاهش فشار خون

۳۵- داروی کلوزاپین ، در کدام طبقه ی دارویی برای درمان اسکیزوفرنی جای دارد؟

۱. داروهای نسل اول
۲. داروهای نسل سوم
۳. داروهای نسل دوم
۴. داروهای نسل چهارم

۳۶- حالت سرخوشی یا تحریک پذیری شدید مربوط به کدام اختلال است؟

۱. افسردگی
۲. شیدایی
۳. دوقطبی نوع ۱
۴. دوقطبی نوع ۲



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - مشاوره ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۷- کدامیک از اختلالات زیر ، جزء اختلال های اصلی زیاده دوست در DSM-5 می باشد؟

۱. اختلال یادگار پرستی
۲. اختلال نعوظی
۳. اختلال دخول تناسلی -لگنی
۴. اختلال ارگاسمی

۳۸- افسردگی با سطح پایین با کدام انتقال دهنده ارتباط دارد؟


۱. اپی نفرین
۲. آدرنالین
۳. سروتونین
۴. استیل کولین

۳۹- گسترده ترین مداخله برای خوانش پریشی و محاسبه پریشی چه می باشد؟

۱. مداخلات شناختی
۲. مداخلات تربیتی
۳. مداخلات روانی
۴. مداخلات رفتاری

۴۰- کدامیک از موارد زیر با شروع ناگهانی مشکلات توجه و آگاهی تعریف می شود؟

۱. ام اس
۲. دلیریوم
۳. زوال عقل عروقی
۴. پارکینسون





شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ب	عادی
2	ب	عادی
3	ج	عادی
4	د	عادی
5	الف	عادی
6	ب	عادی
7	الف	عادی
8	ب	عادی
9	الف	عادی
10	ج	عادی
11	ب	عادی
12	ب	عادی
13	الف	عادی
14	ب	عادی
15	د	عادی
16	ج	عادی
17	ب	عادی
18	الف	عادی
19	ب	عادی
20	د	عادی
21	د	عادی
22	ج	عادی
23	الف	عادی
24	ج	عادی
25	ج	عادی
26	ج	عادی
27	الف	عادی
28	الف	عادی
29	د	عادی
30	د	عادی
31	ج	عادی
32	ج	عادی
33	الف	عادی
34	ب	عادی
35	ج	عادی
36	ب	عادی
37	الف	عادی
38	ج	عادی
39	ب	عادی
40	ب	عادی



تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰. زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰. سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰ - ۱۲۱۷۰۶۱

۱- اختلال شخصیت پارانوئید مربوط به کدام یک از دسته های زیر می باشد؟

۱. هیجانی و خودنما ۲. عجیب و غریب ۳. ترسو یا مضطرب ۴. پر زرق و برق

۲- علامت بارز این اختلال تشهایی مفرط و پرهیز از روابط اجتماعی است؟

۱. اسکیزوئید ۲. اسکیزوتایپال ۳. اجتنابی ۴. ضد اجتماعی

۳- این اختلال شخصیت الگوی فراگیری از بی ثباتی در روابط بین فردی در تصویر خویشتن و در عاطفه و تکانش وری بارز تعریف می شود؟

۱. ضد اجتماعی ۲. مرزی ۳. خود شیفته ۴. نمایشی

۴- به نظر می رسد موثرترین مداخلات روان شناختی، آنهایی هستند که به چه چیزی معطوف می شوند؟

۱. خود فرد ۲. خانواده ۳. جامعه ۴. روان شناسی

۵- مهمترین درمان ناکولپسی کدام است؟

۱. آرمیدگی ۲. دارودرمانی ۳. شناختی-رفتاری ۴. شرطی شدن مجدد

۶- افراد مبتلا به کدام اختلال شخصیت نیاز دائم به اتکاء دارند؟

۱. وابسته ۲. مرزی ۳. ضداجتماعی ۴. وسواسی

۷- مبتلایان به اختلال هویت جنسی در برابر کدام درمان مقاوم هستند؟

۱. دارودرمانی ۲. بیزاری درمانی ۳. درمان شناختی ۴. روان درمانی

۸- صفت کمال گرایی در مبتلایان به کدام اختلال شخصیت دیده می شود؟

۱. اسکیزوئید ۲. اسکیزوتایپال ۳. وسواسی-جبری ۴. پارانوئید

۹- معمولا خواب با کدام یک از انواع خواب شروع می شود؟

۱. خواب با حرکات سریع چشم ۲. خواب متناقض ۳. خواب NONREM ۴. خواب REM

۱۰- منظور از خواب متناقض کدام یک از انواع خواب ها می باشد؟

۱. متعارف ۲. NON REM ۳. REM ۴. خواب با امواج کوتاه



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۱۱- اختلال های خواب به طور کلی بر اساس سبب شناسی آنها به چند بخش عمده طبقه بندی می شوند؟

۵ .۱ 3 .۲ 4 .۳ 2 .۴

۱۲- نارکولپسی مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱ . بی خوابی ۲ . بد خوابی ۳ . حمله خواب ۴ . وقفه تنفسی

۱۳- به حالتی گفته می شود که در آن فرد در ثلث اول شب در حالت خواب عمیق به طور ناگهانی از خواب بیدار می شود؟

۱ . کابوس ۲ . خواب گردی ۳ . وحشت شبانه ۴ . بی خوابی

۱۴- در کدام یک از اختلالات جنسی بیمار به وسیله استفاده از اشیای بی جان به ارضای تمایلات جنسی خود می پردازد؟

۱ . سادیسم ۲ . مازوخیسم ۳ . یادگار خواهی ۴ . سادیسم مازوخیسم

۱۵- GID مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱ . اختلال هویت جنسی ۲ . اختلال وسواس

۳ . اختلال شخصیت ۴ . اختلال اضطراب فراگیر

۱۶- مهم ترین نظریه پذیرفته شده در مورد اختلال هویت جنسی کدام یک از گزینه ها می باشد؟

۱ . نظریه یادگیری ۲ . نظریه شناختی ۳ . نظریه روان کاوی ۴ . نظریه انسان گرایی

۱۷- رایج ترین علت اختلال نعوظی در مردان چیست؟

۱ . شناختی ۲ . روان شناختی ۳ . جسمی ۴ . ژنتیکی

۱۸- کدام یک از اختلال های زیر به DSM5 اضافه شده است؟

۱ . ادوارخویی ۲ . وسواس فکری و عملی ۳ . بی نظمی خلق ایذایی ۴ . اضطراب خاص

۱۹- اختلال افسردگی اساسی در DSM5 به مدت حداقل چند هفته می باشد؟

2 .۱ 3 .۲ 4 .۳ 5 .۴

۲۰- اختلال عاطفی فصلی مربوط به کدام هورمون های زیر می باشد؟

۱ . رشد ۲ . تروکسین ۳ . آندروژن ۴ . ملاتونین

۲۱- اساساً بسیار شایع است که افسردگی به دنبال کدام بیماری پدیدار می شود؟


۱ . فشار خون ۲ . آسم ۳ . قلبی - عروقی ۴ . زخم معده



۱۳۹۶/۰۳/۱۶

۱۰:۳۰

کارشناسی



دانشگاه پیام نور
مرکز آزمون و سنجش

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۲۲- منظور از هیپومانیا کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. شیدایی متوسط ۲. شیدایی خفیف ۳. شیدایی شدید ۴. دو قطبی خفیف

۲۳- اختلال افسردگی پایدار دست کم باید چه مدت پایدار بماند؟

۱. ۲ هفته ۲. ۲ سال ۳. ۱ سال ۴. ۱ هفته

۲۴- کدام یک از اختلالهای زیر در زمره اختلالهایی هستند که بیشترین وراثت پذیری را دارند؟

۱. افسردگی ۲. اضطراب ۳. دو قطبی ۴. فوبی

۲۵- کدام یک از انتقال دهنده های زیر در اختلالهای خلقی احتمالی شان مورد مطالعه قرار گرفته است؟

۱. سروتونین ۲. اپی نفرین ۳. هیستامین ۴. ملاتونین

۲۶- کدام یک از انتقال دهنده های زیر نقش مهمی در میزان حساسیت دستگاه پاداش در مغز ایفا می کند؟

۱. هیستامین ۲. نوراپی نفرین ۳. سروتونین ۴. دوپامین

۲۷- کدام گزینه به شخص کمک می کند تا میزان اهمیت هیجانی یک محرک را بسنجد؟

۱. تالاموس ۲. بادامه ۳. هیپوتالاموس ۴. هیپو کامپ

۲۸- کدام گزینه هورمون اصلی فشار روانی است؟

۱. پرولاکتین ۲. آکسی توسین ۳. تیروکسین ۴. کورتیزول

۲۹- کدام یک از افراد زیر اعتقاد دارد که افسردگی با 3 گانگان منفی همراه است؟

۱. آدلر ۲. راجرز ۳. فروید ۴. یک

۳۰- کدام گزینه درمورد تثبیت کننده خلق صحیح می باشد؟

۱. به داروهایی که نشانه های شیدایی را افزایش می دهند. ۲. به داروهایی که نشانه های شیدایی را کاهش می دهند.
۳. به داروهایی که نشانه های افسردگی را کاهش می دهند. ۴. به داروهایی که نشانه های افسردگی را افزایش می دهند.

۳۱- پژوهش شده ترین درمان برای اختلال دو قطبی کدام گزینه می باشد؟

۱. دیازپام ۲. لیتیوم ۳. امی پرامین ۴. آمی تریپتیلین

۳۲- کدام گزینه جزء نشانه های مثبت اسکیزو فرنیا می باشد؟


۱. هذیان ۲. اوتیسم ۳. خلق نامناسب ۴. دو گانگی احساس



۱۳۹۶/۰۳/۱۶

۱۰:۳۰

کارشناسی



دانشگاه پیام نور
مرکز آزمون و سنجش

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۳- نظریه نشخوار ذهنی از کیست؟

۱. بک ۲. سوزان نولن- هوکسما ۳. سلیگمن ۴. آبرامسون

۳۴- کدامیک از موارد زیر، مقدار لذتی اشاره دارد که در دم یا لحظه ی حضور چیزی لذت بخش تجربه می شود؟

۱. لذت کاذب ۲. لذت پایانی ۳. لذت انتظاری ۴. لذت ابتدایی

۳۵- بررسی های مربوط به معاینات پس از مرگ روی مغز ابتلا به کدام اختلال همواره نشان دهنده بطن های بزرگ بوده اند؟

۱. اسکیزوفرنیا ۲. PTSD ۳. وسواس ۴. افسردگی

۳۶- منظور از داروهای نورولپتیک کدام گزینه می باشد؟

۱. ضد اضطراب ها ۲. ضد افسردگی ها ۳. ضد روان رنجور ۴. ضد روان پریشی

۳۷- کدام یک از داروها از دهه 1950 به طور گسترده ای برای درمان اسکیزوفرنی مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. ریتالین ۲. فلوکسیتین ۳. فنو تیازین ۴. متیل فنیدیت

۳۸- نوید بخش ترین درمان ویژه اختلال های زیاده دوست کدام گزینه می باشد؟

۱. رفتاری ۲. شناختی ۳. شناختی - رفتاری ۴. روان کاوی

۳۹- عبارت است از وجود یک الگوی دایمی از بی توجهی و یا فزون کاری و تکانش گری که نسبت به آنچه در کودکان متعلق به یک دوره سنی مشاهده می شود؟

۱. ADHD ۲. SAD ۳. اختلال شخصیت ضد اجتماعی ۴. اختلال سلوک

۴۰- در این اختلال کارکرد هوشی و عقلی بیمار کاهش می یابد و حافظه، تفکر انتزاعی و قضاوت او رو به تنهایی می گذارد؟

۱. آلزایمر ۲. زوال عقل ۳. روان آشفتگی ۴. دلیریوم



آسپ شناسی روانی ۲ نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

۱_۱۲۱۷۲۴۰_۱۲۱۷۰۶۱_۱۲۱۷۰۲۹_۱۲۱۱۰۹۸

وضعیات کلید پاسخ صحیح د ج ب الف شماره سوال

۱	ب	عادی
۲	الف	عادی
۳	ب	عادی
۴	ب	عادی
۵	ب	عادی
۶	الف	عادی
۷	د	عادی
۸	ج	عادی
۹	ج	عادی
۱۰	ج	عادی
۱۱	ج	عادی
۱۲	ج	عادی
۱۳	ج	عادی
۱۴	ج	عادی
۱۵	الف	عادی
۱۶	الف	عادی
۱۷	ب	عادی
۱۸	ج	عادی
۱۹	الف	عادی
۲۰	د	عادی
۲۱	ج	عادی
۲۲	ب	عادی
۲۳	ب	عادی
۲۴	ج	عادی
۲۵	الف	عادی
۲۶	د	عادی
۲۷	ب	عادی
۲۸	د	عادی
۲۹	د	عادی
۳۰	ب	عادی
۳۱	ب	عادی
۳۲	الف	عادی
۳۳	ب	عادی
۳۴	ب	عادی
۳۵	الف	عادی
۳۶	د	عادی
۳۷	ج	عادی
۳۸	ج	عادی
۳۹	الف	عادی
۴۰	ب	عادی

نعداد سوالات: نسی: ۴۰: تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): نسی: ۶۰: تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰ - ۱۳۱۷۰۶۱

۱- دو نوع گسترده از اختلال های خلق که در DSM-۵ مطرح شده اند کدامند؟

۱. اختلال بی نظمی خلق ایذایی
۲. اختلال ملال پیش قاعدگی
۳. اختلال دوقطبی
۴. ادواری خوبی

۲- یک دوره افسردگی اساسی اگر درمان نشود چند ماه طول می کشد؟

۱. ۵
۲. ۶
۳. ۴
۴. ۳

۳- اختلال عاطفی فصلی با تغییر در کدام انتقال دهنده عصبی مغز ارتباط دارد؟

۱. سروتونین
۲. ملاتونین
۳. دوپامین
۴. اپی نفرین

۴- برای تشخیص کدام اختلال، یک دوره افسردگی عمده و یک دوره شیدایی خفیف باید رخ دهد؟

۱. دو قطبی نوع ۲
۲. دو قطبی نوع ۱
۳. ادواری خوبی
۴. افسردگی اساسی

۵- براساس بررسی های مربوط به فعال سازی کارکردی مغز، فعالیت کدام بخش در افراد مبتلا به افسردگی اساسی (MDD) بالاست؟

۱. کمر بند قدامی
۲. بادامه
۳. قشر پیش پیشانی
۴. هیپوکامپ

۶- کدام یک از عوامل بین فردی درون خانواده منجر به عود افسردگی می شود؟

۱. حمایت اجتماعی بالا
۲. فقدان حمایت اجتماعی
۳. هیجان ابراز شده پائین
۴. هیجان ابراز شده بالا

۷- چه کسی اعتقاد دارد که افسردگی با سه گانگان منفی درباره خود، جهان و آینده همراه است؟

۱. متالسکی
۲. بک
۳. آلوی
۴. هاروی

۸- در کدام روش درمان افسردگی، بیمار ترغیب می شود که در فعالیت های لذت بخش شرکت کند؟

۱. فعال سازی رفتاری
۲. درمان شناختی (CT)
۳. روان درمانی بین فردی
۴. جلسات گروهی (IPT)

۹- کدام داروی زیر به عنوان نخستین تثبیت کننده خلق شناخته می شود؟

۱. سرتالین
۲. فلوگزتین
۳. لیتیوم
۴. الانزاپین

۱۰- کدامیک از انتقال دهنده های عصبی در اختلالهای خلقی نقش دارند؟

۱. نور اپی نفرین
۲. دوپامین
۳. سروتونین
۴. هر سه مورد

تعداد سوالات: نسی: ۴۰: تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): نسی: ۶۰: تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۱۱- احتمال مرگ ناشی از خودکشی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی چند برابر جمعیت عمومی است؟

۱. ۱۰ ۲. ۱۲ ۳. ۷ ۴. ۹

۱۲- کدام مورد از نشانه های منفی اسکیزوفرنی نیست؟

۱. افت عاطفی ۲. بی ارادگی ۳. توهمات ۴. ناگویی

۱۳- آمیزه ای از اسکیزوفرنی و اختلال های خلق چه نامیده می شود؟

۱. اسکیزوفرنی شکل ۲. روان پریشی کوتاه مدت
۳. اسکیزواکتیو ۴. اختلال هذیانی

۱۴- مطابق نظریه دوپامین، گیرنده های دوپامینی افراد اسکیزوفرن چه اندازه است؟

۱. کم ۲. زیاد ۳. متوسط ۴. کمتر از حد لازم

۱۵- کدام مورد، از خصوصیات مادر اسکیزوفرنی زاد نمی باشد؟

۱. سرد ۲. سلطه گر ۳. اضطرابی ۴. تعارض آفرین

۱۶- اولین داروی ضد روان پریشی نسل دوم برای درمان اسکیزوفرنی کدام است؟

۱. کلوزاپین ۲. اولانزاپین ۳. ریسپریدون ۴. کلرپرومازین

۱۷- وقتی که از فرد مبتلا به اسکیزوفرنی خواسته می شود تا صحت باورهای هذیانی خویش را نسبت به افراد غیر مبتلا بیازماید، از کدام رویکرد درمانی استفاده شده است؟

۱. رفتاردرمانی شناختی ۲. آموزش مهارت های اجتماعی
۳. خانواده درمانی ۴. ترمیم شناختی

۱۸- رویکرد رفتاری در خصوص سبب شناسی اختلال های زیاده دوست بر کدام مورد تأکید می کند؟

۱. شرطی شدن عامل ۲. شرطی شدن کلاسیک ۳. رفتار سرمشق ۴. شرطی سازی کنشگر

۱۹- کدام گزینه در شمار اختلال های برونی شده مربوط به اختلال های دوران کودکی نمی باشد؟

۱. پرخاشگری ۲. فزونکاری ۳. تکانشوری ۴. اضطراب

۲۰- گسترده ترین مداخله برای خوانش پریشی و محاسبه پریشی چیست؟

۱. سرمش دهی ۲. مداخلات تربیتی
۳. مداخلات بالینی ۴. درمان شناختی-رفتاری



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): نسی: ۶۰ نسی: ۶۰

نعداد سوالات: نسی: ۴۰ نسی: ۴۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۲۱- کدام دامنه سنی نسبت به گروه های سنی دیگر در حالت کلی اختلال های روانی کمتری دارند؟

۱. بالای ۶۵ سال ۲. زیر ۶۵ سال ۳. بالای ۷۰ سال ۴. زیر ۲۰ سال

۲۲- در سبب شناسی بیماری آلزایمر کدام عامل نقش اصلی ایفا می کند؟

۱. سابقه افسردگی ۲. استرس ۳. ژن ها ۴. سالخوردگی

۲۳- اختلال شخصیت اسکیزوئید و اسکیزوتایپال در زیر مجموعه کدام دسته اختلالات شخصیتی قرار دارند؟

۱. هیجانی و خودنما ۲. ترسو و مضطرب ۳. عجیب و غریب ۴. اسکیزوفرنیا

۲۴- سطح شیوع کدام اختلال شخصیت با افزایش سن پائین می آید؟

۱. پارانوئید ۲. وابسته ۳. وسواسی-جبری ۴. ضداجتماعی

۲۵- جمله ی: «من برای بقاء نیازمند به دیگران- به ویژه فرد قوی- هستم.» جزو باورهای کدام تیپ شخصیتی می باشد؟

۱. وابسته ۲. ضعیف ۳. اسکیزوئید ۴. خودشیفته

۲۶- ابتلاء به اختلال شخصیت مرزی چند درصد جمعیت عمومی را تشکیل می دهد؟

۱. ۲ ۲. ۳ ۳. ۴ ۴. ۱

۲۷- در کدام نوع درمان، شناخت ها و طرح واره های شناختی زیربنایی که منجر به رفتارهای نامناسب می گردند، تغییر می یابند؟

۱. رفتاری ۲. شناختی-رفتاری ۳. آموزش آگاهی هیجانی ۴. شناختی

۲۸- براساس پژوهش های انجام شده کدام مسأله برای افراد مبتلا به بی اشتهاهی روانی یک مشغله ذهنی طولانی مدت است؟

۱. ترس از چاق شدن ۲. کنترل وزن ۳. قطع عادت ماهانه ۴. امتناع از نگهداری وزن

۲۹- کدام گزینه از ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای پراشتهایی روانی نمی باشد؟

۱. دوره های تکراری پرخوری ۲. ادراک های جسمی آشفته در مورد وزن و شکل بدن ۳. تأثیر زیاد وزن بر روی ارزیابی از خویشتن ۴. رفتارهای نامناسب جبرانی بعد از خوردن



تعداد سوالات: نسی: ۴۰ تشریحی: ۰
زمان آزمون (دقیقه): نسی: ۶۰ تشریحی: ۰
سری سوال: ۱ یک
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲
رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۰- نقش محور HPA (هیپوتالاموس - هیپوفیز - قشر فوق کلیوی) چیست؟

۱. واکنش در برابر فشار روانی
۲. آزاد کردن سروتونین
۳. تنظیم هیجانی
۴. کنترل هورمونهای اضافی در بدن

۳۱- تبیین های روان تحلیل گری تثبیت در کدام مرحله را موجب ابتلاء به بی اشتها بی روانی می دانند؟

۱. آلتی
۲. دهانی
۳. مقعدی
۴. نهفتگی

۳۲- کدام داروها برای درمان اختلالات تغذیه ای سودمند هستند؟

۱. ضد افسردگی ها
۲. لیتیوم
۳. داروهای ضد اضطراب
۴. داروهای ضد استفراغ

۳۳- خواب عمیق کدام مراحل خواب NON-REM را شامل می شود؟

۱. ۳ و ۱
۲. ۴
۳. ۲ و ۱
۴. ۳ و ۴

۳۴- کدام یک از روش های زیر شیوه مؤثری در درمان بی خوابی اولیه است؟

۱. دارودرمانی
۲. درمان مجدد محدودسازی خواب
۳. درمان آرمیدگی
۴. شرطی شدن مجدد

۳۵- بیماران مبتلا به نارکولپسی با کمبود کدام نوروترانسمیتر مواجه هستند؟

۱. هیپوکرتین
۲. نوراپی نفرین
۳. سروتونین
۴. استیل کولین

۳۶- کدام نوع درمان برای اختلال وحشت شبانه و خواب گردی مناسب است؟

۱. شرطی سازی
۲. روان درمانی فردی و خانوادگی
۳. دارو درمانی
۴. از بین بردن رویدادهای استرسی را

۳۷- اولین اختلال در طبقه بندی اختلالات مربوط به میل جنسی کدام است؟

۱. انزال زودرس
۲. اختلال میل جنسی کم کار
۳. واژینیسم
۴. اختلال بیزاری جنسی

۳۸- مبتلایان به انواع اختلالات پارافیلی طی چه مدت می توانند تشخیص داده شوند؟

۱. ۱سال
۲. ۱ماه
۳. ۶ماه
۴. ۲سال



تعداد سوالات: نسی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): نسی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۹- در سبب شناسی روان تحلیلی یادگارخواهی جنسی همراه با مبدل پوشی، کدام مکانیزم دفاعی قابل مشاهده است؟

۱. سرکوب ۲. فرافکنی ۳. واپس زنی ۴. برگشت

۴۰- اختلال هویت جنسی در کدام سطوح سنی بیشتر شایع است؟

۱. جوانان ۲. کودکان ۳. بزرگسالان ۴. نوجوانان

Payamnorria



شماره	کلید سوال	توضیحات	شماره	کلید سوال	توضیحات
۱	ج		۲۱	الف	
۲	الف		۲۲	ج	
۳	ب		۲۳	ج	
۴	الف		۲۴	د	
۵	ب		۲۵	الف	
۶	د		۲۶	الف	
۷	ب		۲۷	د	
۸	الف		۲۸	ب	
۹	د		۲۹	ب	
۱۰	د		۳۰	الف	
۱۱	ب		۳۱	ب	
۱۲	ج		۳۲	الف	
۱۳	د		۳۳	د	
۱۴	ب		۳۴	د	
۱۵	د		۳۵	الف	
۱۶	الف		۳۶	ب	
۱۷	الف		۳۷	ب	
۱۸	ب		۳۸	د	
۱۹	د		۳۹	د	
۲۰	ب		۴۰	ب	

سامانه جامع دانلود نمونه سوالات و آزمونهای دانشگاه پیام نور:

www.pndl.ir

پیرانه بند (دفتر مرکزی)

www.piranepand.com

۰۷۱۳۲۳۰۴۲۸۸-۰۹۱۷۳۰۳۸۹۵۱

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰ - ۱۲۱۷۰۶۱

۱- بر طبق نتایج پژوهش های برونیش و ویچن ۱۹۹۴ چند درصد افرادی که هیچ اختلال روانی نداشتند تفکراتی در مورد خودکشی نشان دادند؟

- ۰.۱ ۲ درصد ۰.۲ ۸ درصد ۰.۳ ۶۵ درصد ۰.۴ ۶۹ درصد

۲- کدام دانشمندان احساس گناه، نشانه های هذیانی افسرده وار و ناآرامی درونی و بی قراری را از جمله ویژگی های روانشناختی افرادی می داند که تلاش هایی برای خودکشی دارند؟

- ۰.۱ ایرامسون ۰.۲ بک ۰.۳ دورکیم ۰.۴ ولفر سدورف

۳- در اواسط دهه ۱۹۸۰ کدام اختلال بوسیله روزنتال و همکارانش مطرح گردید؟

- ۰.۱ اختلال دو قطبی ۰.۲ اختلال عاطفی فصلی
۰.۳ اختلال افسردگی اساسی ۰.۴ اختلال ادواری خوبی

۴- سطح پایین ملاتونین باعث ایجاد کدام حالت در فرد می شود؟

- ۰.۱ خلق پایین ۰.۲ هیپومانی ۰.۳ خلق بالا و سرخوشی ۰.۴ غمگینی مفرط

۵- کدام دسته از اختلالات تاریخچه پژوهشی کوتاهی را به خود اختصاص داده است؟

- ۰.۱ عاطفی فصلی ۰.۲ افسرده خوبی ۰.۳ دو قطبی نوع I ۰.۴ مانیک دپرسیو

۶- فرد مبتلا به کدام اختلال ممکن است بوسیله اعمال دیگران ناکامی را تجربه کند؟

- ۰.۱ مانیک ۰.۲ افسردگی اساسی ۰.۳ اسکیزوفرنی ۰.۴ افسردگی فصلی

۷- کدامیک از اختلالات زیر اختلال مزمنی است که حداقل ۲ سال ادامه دارد و فرد مبتلا، هیپومانی را به صورت دوره ای تجربه می کند؟

- ۰.۱ دو قطبی ۰.۲ عاطفی فصلی ۰.۳ ادواری خوبی ۰.۴ افسردگی

۸- لیتیوم برای درمان کدام اختلال موثر می باشد؟

- ۰.۱ استرس ۰.۲ اضطراب ۰.۳ افسردگی ۰.۴ دو قطبی

۹- کدام نوع اسکیزوفرنی هم اکنون در کشورهای صنعتی به ندرت دیده می شود؟

- ۰.۱ آشفته ۰.۲ پارانوئید ۰.۳ باقی مانده ۰.۴ کاتاتونیک

۱۰- فقر گفتار، بی حالتی عاطفی، فقدان لذت، انزوا از ویژگی کدام دسته از اسکیزوفرنی می باشد؟

- ۰.۱ پارانوئید ۰.۲ آشفته ۰.۳ مثبت ۰.۴ منفی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۱۱- بر اساس مطالعات لیدل و همکاران کاهش RCBF در کرتکس پره فرونتال میانی و چپ منجر به چه عاملی می شود؟

۱. فقر روانی-حرکتی
۲. افزایش مسائل مربوط به حرکت
۳. کاهش سازمان نیافتگی
۴. افزایش هیجانات

۱۲- بر چه اساسی می توان ناهماهنگی دو قلوبهای یک تخمکی را درابتلا به اسکیزوفرنی تمیز داد؟

۱. بررسی بطن ها و کاهش حجم کرتکس تمپورال
۲. بررسی لوب پاریتال تحتانی چپ
۳. کاهش فعالیت آلفا در نیمکره چپ
۴. افزایش حجم کرتکس تمپورال

۱۳- بر طبق پژوهش بارچ و همکاران (۲۰۰۲) کدام ناحیه در بیماران اسکیزوفرنی در دو حافظه کاری و بلند مدت کاهش فعالیت را نشان می دهد؟

۱. کرتکس سینگولار قدامی دو طرف
۲. لوب تمپورال میانی
۳. کرتکس پره فرونتال دورسولا ترال راست
۴. کرتکس پره فرونتال میانی و چپ

۱۴- ممانعت از جذب کدام دسته از داروها در مکان گیرنده پس سیناپسی از انتقال دوپامین جلوگیری می کند؟

۱. ترازادون
۲. فنوباریتال
۳. سرتالین
۴. فنوتیازین

۱۵- بررسی های پس از مرگ بیماران اسکیزوفرنیک کاهش در تراکم نورون های کدام قسمت را نشان می دهند؟

۱. هیپوکامپ
۲. تالاموس
۳. پیشانی
۴. هیپوتالاموس

۱۶- چه کسی معتقد بود که هذیان ها، اعمال گفتاری خالی هستند که به دنیا و خویشان معطوف نیستند و آنها نماد چیزی نیستند؟

۱. بنتال
۲. همزلی
۳. بریوس
۴. آدل دپاموند

۱۷- کدام دارو اثر مستقیمی بر روی توهمات و هذیان ها دارد؟

۱. کلوزاپین
۲. ترازادون
۳. فلووکسامین
۴. پروکستین

۱۸- بیوست، آشفستگی های بینایی و کاهش یا افزایش وزن از عوارض کدام دارو محسوب می شود؟

۱. دسی پرامین
۲. پروزاک
۳. کلوزاپین
۴. کلرپرومازین

۱۹- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیتی اسکیزوتایپال محسوب می شود؟

۱. سوء ظن
۲. فاقد انعطاف پذیری
۳. حساسیت
۴. از نظر هیجانی سرد

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۲۰- کدام گزینه جز ویژگی های شخصیتی اختلال اسکیزوئید محسوب می شود؟

۱. خسته کردن دیگران
۲. توانایی در ابراز مستقیم خشم
۳. ناپهنجاری در تفکر
۴. فقدان اعتماد به نفس

۲۱- شیوع کدام دسته از اختلالات شخصیتی ۳۰ درصد جمعیت عمومی را شامل می شود؟

۱. دوری گزین
۲. مرزی
۳. خودشیفته
۴. اسکیزوتیپال

۲۲- در کدام دسته از اختلالات شخصیتی، تحت تاثیر استرس، واقعیت سنجی فرد به آسانی درهم می شکنند؟

۱. دوری گزین
۲. وابسته
۳. نمایشی
۴. پارانویید

۲۳- شیوع اختلال شخصیت نمایشی چند درصد می باشد؟

۱. ۳ تا ۴ درصد
۲. ۲ تا ۳ درصد
۳. ۱ درصد
۴. ۲/۵ درصد

۲۴- رفتارهایی نظیر بریدن بازوها، پاها و سوزاندن، در کدام دسته از اختلالات شخصیتی مشاهده می گردد؟

۱. ضد اجتماعی
۲. اختلال شخصیت مرزی
۳. اسکیزوئید
۴. وسواسی-جبری

۲۵- در کدام یک از اختلالات شخصیتی افراد در روابط بین فردی، به درجه بالایی از محبت نیاز دارند؟

۱. اسکیزوئید
۲. خود شیفته
۳. نمایشی
۴. اجتنابی

۲۶- کدامیک از مشکلات روانشناختی در بین مبتلایان به بی اشتهایی روانی شایع می باشد؟

۱. اضطراب
۲. افسردگی شدید
۳. خود شیفتگی
۴. استرس

۲۷- تحریک کدام ناحیه باعث کاهش احساس گرسنگی می شود؟

۱. هیپوتالاموس
۲. تالاموس
۳. هیپوتالاموس شکمی
۴. هیپوتالاموس جانبی

۲۸- کدام مورد جز اهداف مداخلات درمانی شناختی محسوب می شود؟

۱. ایجاد جذابیت جسمانی
۲. کنترل فراخود
۳. ایجاد اتحاد درمانی
۴. رشد و پرورش خودمختاری

۲۹- در فاصله سنی ۲۵ تا ۴۴ سال مردها بطور متوسط چند کیلو گرم افزایش وزن دارند؟

۱. ۷
۲. ۵
۳. ۴
۴. ۲

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۰- در کدام مرحله خواب non-REM مغز یک نوع الگوی فعالیتی متمایزی از امواج آهسته تر به همراه خیزک های سریعی از امواج نشان می دهد؟

۰۱. اول ۰۲. دوم ۰۳. سوم ۰۴. چهارم

۳۱- کدام مورد محرک اشتها و هوشیاری محسوب می شود؟

۰۱. سروتونین ۰۲. نوروترانسمیتر هیپوکرتین
۰۳. اپی نفرین ۰۴. دوپامین

۳۲- لیومان و همکاران ۱۹۹۱ شیوع اختلال نعوظی را برای سنین ۴۰ الی ۴۹ سالگی چند درصد برآورد کرده اند؟

۰۱. ۱۱ درصد ۰۲. ۷ درصد ۰۳. ۱۳ درصد ۰۴. ۱۸ درصد

۳۳- داروی ویاگرا در درمان کدام اختلال موثر واقع می شود؟

۰۱. انزال زودرس ۰۲. بیضاری جنسی ۰۳. میل جنسی کم کار ۰۴. نعوظ

۳۴- کدام گزینه جز عوارض جنبی داروی سیلدنافیل محسوب می شود؟

۰۱. کاهش ضربان قلب ۰۲. اختلال در دید رنگ ۰۳. برافروختگی چشم ها ۰۴. آشفته گی کلیوی

۳۵- کدام دانشمند به این نتیجه دست یافت که مردان مبدل پوش به احتمال بیشتری نسبت به مردان دیگر والدین خود را فاقد ویژگی های مربوط به نوع جنس ارزیابی می کردند؟

۰۱. بن کرافت ۰۲. مسترز ۰۳. نیوکامب ۰۴. جانسون

۳۶- در کدام نوع دمانس رفتارهای مشکل دار نظیر شگفتی واضح می باشند؟

۰۱. متوسط ۰۲. مبهم ۰۳. خفیف ۰۴. شدید

۳۷- ژن های موجود در کروموزوم های ۱۴، ۱۹، ۲۱ در ایجاد کدام بیماری دخالت دارند؟

۰۱. پارکینسون ۰۲. آلزایمر ۰۳. ام اس ۰۴. صرع

۳۸- عوامل خطر برای بروز زوال عقل در بیماران پارکینسونی شامل کدام مورد می شود؟

۰۱. جنسیت ۰۲. مدت زمان بیماری ۰۳. آستانه تحمل درد پایین ۰۴. ژنتیک

۳۹- بی خوابی از جمله مشکلات روانی مبتلایان به کدام نوع بیماری می باشد؟

۰۱. ام اس ۰۲. صرع ۰۳. پارکینسون ۰۴. آلزایمر



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۴۰- کدام دارو جز داروهای ضد صرع محسوب می شود؟

۰۴ پروکستین

۰۳ کاربامازپین

۰۲ سرتالین

۰۱ ترازودن

Payamnorra



شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ب	عادی
2	د	عادی
3	ب	عادی
4	ج	عادی
5	الف	عادی
6	الف	عادی
7	ج	عادی
8	د	عادی
9	د	عادی
10	د	عادی
11	الف	عادی
12	الف	عادی
13	ج	عادی
14	د	عادی
15	ج	عادی
16	ج	عادی
17	الف	عادی
18	د	عادی
19	الف	عادی
20	الف	عادی
21	د	عادی
22	ج	عادی
23	ب	عادی
24	ب	عادی
25	د	عادی
26	الف	عادی
27	ج	عادی
28	د	عادی
29	ج	عادی
30	ب	عادی
31	ب	عادی
32	الف	عادی
33	د	عادی
34	ب	عادی
35	ج	عادی
36	الف	عادی
37	ب	عادی
38	ب	عادی
39	ج	عادی
40	ج	عادی



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰، ۱۲۱۷۰۶۱

۱- حالت خفیف تر اختلال دو قطبی چه نام دارد؟

۱. ادواری خوبی ۲. افسردگی فصلی ۳. افسرده خوبی ۴. هیچکدام

۲- افسردگی درون زاد را می گویند.

۱. افسردگی مضاعف ۲. افسردگی بدون مالخولیا
۳. افسردگی همراه با مالخولیا ۴. افسردگی اساسی

۳- سطوح پایین کدام انتقال دهنده موجب افسردگی می شود؟

۱. دوپامین ۲. استیل کولین ۳. سروتونین ۴. نور اپی نفرین

۴- از نظر لوینسون تبیین نظریه های رفتاری در مورد علت افسردگی چیست؟

۱. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت ۲. وابستگی به دیگران
۳. تثبیت در غم و اندوه ۴. عزت نفس پایین

۵- کدام گزینه مربوط به مثلث شناختی نیست؟

۱. باورهای مربوط به آینده ۲. باورهای مربوط به رخدادها یا افراد
۳. باورهای مربوط به خود ۴. باورهای مربوط به گذشته

۶- نتیجه گیری های منفی کلی درباره توانایی یا عملکرد بر حسب یک مورد جزء کدام پنج خطای منطقی فرد افسرده است؟

۱. انتزاع گزینشی ۲. تعمیم مفرط ۳. استنباط دلخواه ۴. شخصی سازی

۷- کدام یک از داروها عمر انتقال دهنده های عصبی را در افسردگی افزایش می دهد؟

۱. TCA ۲. SSRI ۳. Orap ۴. MAOI

۸- میزان سروتونین پایین همراه با نور اپی نفرین بالا منجر به بروز کدام اختلال می گردد؟

۱. مانیا ۲. افسردگی ۳. اسکیزوفرنی ۴. سایکوز

۹- شدیدترین اختلال روانی کدام است؟

۱. افسردگی ۲. اسکیزوفرنی ۳. دوقطبی ۴. مانیا

۱۰- هبفرنیا کدام نوع اسکیزوفرنی است؟

۱. کاتاتونیک ۲. باقی مانده ۳. آشفته ۴. پارانویید



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۱۱- اسکیزوفرنی مزمن چه نشانه هایی دارد؟

۱. شروع ناگهانی ۲. احتمال بهبودی زیاد ۳. پیش آگهی خوب ۴. پیش آگهی بد

۱۲- مشهورترین نشانه اسکیزوفرنی چیست؟

۱. آشفتگی در فرایندهای تفکر ۲. مکالمات فاقد هماهنگی
۳. هذیان بزرگ منشی ۴. هذیان کنترل

۱۳- مصرف کدام ماده مخدر منجر به بروز بعدی اسکیزوفرنی می شود؟

۱. تریاک ۲. کوکائین ۳. شیشه ۴. هروئین

۱۴- کدام مطالعه تصویر برداری نخستین و قانع کننده ترین داده ها را از این که اسکیزوفرنی یک بیماری مغزی واقعی است به دست داده است؟

۱. FMRI ۲. SPET ۳. rCBF ۴. CT

۱۵- ضایعات در کدام قسمت مغز باعث ایجاد اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهم شنوایی شدید می شود؟

۱. لوب پیش پیشانی
۲. لوب گیجگاهی
۳. لوب تمپورال
۴. لوب پس سری

۱۶- حجم کوچکتر گيروس استریت در اسکیزوفرنیها با کدام یک از ناسازگاری های زیر ارتباط دارد؟

۱. رفتاری ۲. اجتماعی ۳. تحصیلی ۴. جنسی

۱۷- مصرف کدام ماده مخدر باعث بالا رفتن دوپامین می شود؟

۱. شیشه ۲. کراک ۳. تریاک ۴. حشیش

۱۸- کدام یک از داروهای زیر فقط بر روی نشانه های مثبت اسکیزوفرنی اثر می گذارد؟

۱. کلوزاپین- هالوپریدول ۲. کلرپرومازین- هالوپریدول
۳. دیازپام- کلر پرومازین ۴. کلوزاپین- کلرپرومازین

۱۹- روابط شخصی بی ثبات و شدید ویژگی کدام اختلال شخصیت می باشد؟

۱. وسواسی- جبری ۲. خودشیفته ۳. مرزی ۴. پارانوئید



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰:

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰:

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

- ۲۰- عمل در جهت عکس محتوای طرحواره جزء کدام یک از سه فرایند طرحواره است؟
۱. جبران طرحواره ۲. حفظ طرحواره ۳. اجتناب از طرحواره ۴. هیچکدام
- ۲۱- کدام اختلال شخصیت با بالا رفتن سن و از دست دادن مقام دچار افسردگی می شود؟
۱. نمایشی ۲. خودشیفته ۳. مرزی ۴. ضد اجتماعی
- ۲۲- سطح پایین کدام انتقال دهنده عصبی و کاهش حجم ماده کدام قسمت مغز در ایجاد شخصیت ضد اجتماعی نقش دارد؟
۱. دوپامین - پیش پیشانی ۲. سروتونین - پس سری ۳. دوپامین - پس سری ۴. سروتونین - پیش پیشانی
- ۲۳- شروع نوع بدخیم بیماری MS معمولاً در چه سنینی رخ می دهد؟
۱. قبل از ۱۵ سالگی ۲. بعد از ۴۰ سالگی ۳. ۳۵ سالگی ۴. بعد از ۲۰ سالگی
- ۲۴- رایج ترین نشانه های صدمات بسته چیست؟
۱. آسیب های حافظه ای ۲. آسیب به مهارتهای زبانی ۳. آسیب های شناختی ۴. نقص های شناختی و عصب - رفتاری
- ۲۵- ویژگی زیر مربوط به کدام اختلال می باشد؟ (دوری گزین و علاقه مند شدید به ایجاد رابطه با دیگران)
۱. اسکیزوتیپید ۲. اسکیزوتایپال ۳. اجتنابی ۴. پارانوئید
- ۲۶- شایع ترین اختلال شخصیت کدام است؟
۱. مرزی ۲. هیستریک ۳. وابسته ۴. اجتنابی
- ۲۷- فوری ترین پیامد بی اشتهایی روانی چیست؟
۱. قطع دوره های ماهیانه ۲. لاغری شدید ۳. ضعف جسمانی ۴. بدشکلی بدن
- ۲۸- ۸۰ الی ۹۰ درصد افراد مبتلا به پراشتهایی روانی بعد از خوردن غذا جهت کنترل وزنشان چه کاری را انجام می دهند؟
۱. استفاده از ملین ها ۲. استفراغ عمدی ۳. ورزشهای شدید ۴. همه موارد
- ۲۹- تنقیه کردن و روزه داری به ترتیب جزء کدام یک از انواع پراشتهایی هستند؟
۱. غیر تخلیه ای - تخلیه ای ۲. تخلیه ای - تخلیه ای ۳. تخلیه ای - غیر تخلیه ای ۴. غیر تخلیه ای - غیر تخلیه ای



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۳۰- مهمترین پیامد رفتارهای جبرانی پراشتهایی روانی چیست؟

۱. عدم تعادل الکترولیت
۲. مشکلات گوارشی
۳. آسیب شکمی
۴. آسیب به پشت دندانها

۳۱- سطح پایین کدام انتقال دهنده عصبی منجر به جستجوی کربوهیدراتها و دوره های پر خوری می شود؟

۱. دوپامین
۲. نور اپی نفرین
۳. استیل کولین
۴. سروتونین

۳۲- از نظر فروید تثبیت در کدام مرحله رشد موجب بی اشتهایی روانی می شود؟

۱. جنسی
۲. تناسلی
۳. دهانی
۴. مقعدی

۳۳- کودکانی که دچار شب ادراری و یا راه رفتن در خواب هستند معمولا در کدام مرحله از خواب می باشند؟

۱. سوم و دوم
۲. اول و چهارم
۳. سوم و چهارم
۴. اول و دوم

۳۴- کدام اختلال خواب موجب مشکل در کارکردهای اجتماعی، شغلی فرد می شود؟

۱. حمله خواب
۲. بی خوابی اولیه
۳. بی خوابی اولیه
۴. اختلال خواب دوره شبانه روزی

۳۵- مهمترین درمان ناکولپسی چیست؟

۱. شوک درمانی
۲. آرمیدگی
۳. تمرکز
۴. دارو درمانی

۳۶- کدام دارو برای درمان کابوس در خواب تجویز می شود؟

۱. سه حلقه ای
۲. زولپیدم
۳. زالپلون
۴. بنزودیازپین

۳۷- نمایش آلت به فرد غریبه ای که انتظار این کار را از او ندارد جزء کدام نوع پارافیلی ها است؟

۱. یادگارخواهی جنسی
۲. سادیسزم جنسی
۳. نمایشگری جنسی
۴. تماشاگری جنسی

۳۸- مهمترین دارو برای درمان اختلال نعوظی چیست؟

۱. فیناستراید
۲. دیازپام
۳. زالپلون
۴. ویاگرا

۳۹- بیزاری درمانی در مبدل پوشی معمولا چگونه انجام می شود؟

۱. شوک درمانی
۲. دارو درمانی
۳. گفتار درمانی
۴. همه موارد



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۴۰- هویت جنسی زنانه در مردان طبق تبیین رویداد تحلیلی ناشی از چیست؟

۱. وابستگی به مادر

۲. بیزاری از پدر

۳. اضطراب جدایی مفرط اولیه

۴. افسردگی

Payamnorra



شماره سوال	د ج ب الف	پاسخ صحيح	وضعيت کلید
1	X	الف	عادي
2		ج	عادي
3		ج	عادي
4	X	الف	عادي
5		د	عادي
6	X	ب	عادي
7		د	عادي
8		الف	عادي
9	X	ب	عادي
10		ج	عادي
11		د	عادي
12	X	الف	عادي
13		ب	عادي
14		د	عادي
15		ج	عادي
16	X	ب	عادي
17		د	عادي
18	X	ب	عادي
19		ج	عادي
20		الف	عادي
21	X	ب	عادي
22		د	عادي
23	X	ب	عادي
24		د	عادي
25		ج	عادي
26	X	ج	عادي
27	X	الف	عادي
28	X	ب	عادي
29		ج	عادي
30	X	الف	عادي
31		د	عادي
32		ج	عادي
33		ج	عادي
34		ج	عادي
35		د	عادي
36	X	الف	عادي
37		ج	عادي
38		د	عادي
39	X	الف	عادي
40		ج	عادي



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰:

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰:

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰، ۱۲۱۷۰۶۱ -

۱- تمایز اختلال عاطفی فصلی با اختلال افسردگی اساسی در چیست؟

۱. طول مدت اختلال عاطفی فصلی کوتاهتر است.

۲. اختلال عاطفی فصلی، یک حالت فصلی است و در زمستان رخ می دهد.

۳. طول مدت اختلال افسردگی اساسی کوتاهتر است.

۴. تفاوت چندانی ندارد.

۲- در کدام یک از انواع افسردگی نشانه ها شدیدتر و میزان بهبودی کمتر است؟

۱. افسردگی درونزاد ۲. افسردگی بیرونزاد ۳. افسردگی مضاعف ۴. افسردگی اساسی

۳- بر طبق طبقه بندی DSM-IV-TR در اختلال دو قطبی نوع II کدام دوره ها (مانی یا افسردگی) مسلطند؟

۱. دوره های افسردگی مسلط هستند.

۲. دوره های مانیا شدیدتر است.

۳. افراد دوره های متغیری از افسردگی و مانیا را تجربه می کنند.

۴. نسبت هر دو برابر است.

۴- طبق مدل شناختی، چه عواملی موجب دوره هایی از افسردگی و مانیا (اختلال دو قطبی) می شوند؟

۱. عزت نفس و اعتماد به نفس بالا ۲. اضطراب بالا و طرحواره

۳. توهم ها و هذیان ها ۴. معیارهای غیر واقع گرایانه در مورد موفقیت

۵- غم ناشی از مرگ عزیزان و پایان یک رابطه محبت آمیز چه نام دارد؟

۱. داغیدگی ۲. افسردگی ۳. سوگ ۴. موارد الف و ج

۶- جمله «همیشه برای من رخ می دهد» مربوط به کدام نوع اسناد است؟

۱. اسناد درونی ۲. اسناد کلی ۳. اسناد پایدار ۴. اسناد کلی و پایدار

۷- ناتوانی مربوط به بیماری اسکیزوفرنی بیشتر ناشی از فقدان چه نقص هایی است؟

۱. زیستی ۲. شناختی ۳. شناختی- رفتاری ۴. رفتاری



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۸- به عقیده بلولر اسکیزوفرنیا بیشتر تحت تأثیر چه عواملی به وجود می آید؟

۱. تحت نفوذ پیشرفت های آسیب شناسی بالینی

۲. تحت تأثیر عوامل روانشناختی

۳. بیشتر نشانه های سایکوزی این بیماری مدنظر بود.

۴. به نظر او هذیانها و توهمات، پدیدههای اولیه و اصلی بودند.

۹- ویژگی نوع کاتاتونیک اسکیزوفرنیا در کدام گزینه آمده است؟

۱. آشفتگی های خلقی

۲. آشفتگی های گفتاری

۳. آشفتگی روانی - حرکتی بارز

۴. هذیانهای پارانوئیدی

۱۰- در نیمکره شمالی و جنوبی افزایش بیماری اسکیزوفرنی در بین متولدین چه ماه هایی دیده می شود؟

۱. متولدین ماه های آخر زمستان تا اول بهار

۲. متولدین آخر تابستان

۳. متولدین ماه های اول بهار

۴. متولدین اول تابستان

۱۱- براساس مطالعات تغییرات ساختاری در بخش فرونتال مغز، حجم کوچکتر گيروس استریت با کدام یک از موارد زیر ارتباط دارد؟

۱. اختلال در تفکر

۲. ناسازگاری اجتماعی

۳. توهمات شنوایی

۴. رفتار آشفته

۱۲- میزان بالایی از اسکیزوفرنیا در بین چه گروه هایی دیده می شود؟

۱. گروههای اجتماعی-اقتصاد بالاتر

۲. در خانواده های سرد و مستبد

۳. طبقات اجتماعی-اقتصادی متوسط

۴. گروههای اجتماعی-اقتصادی پائین تر

۱۳- طبق طبقه بندی DSM-IV-TR، کدام اختلال زیر در دسته سوم (ترسو یا مضطرب) اختلالات شخصیت قرار می گیرد؟

۱. اختلال شخصیت پارانوئید

۲. اختلال شخصیت وابسته

۳. اختلال شخصیت اسکیزوئید

۴. اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

۱۴- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیتی مرزی محسوب نمی شود؟

۱. احساس خالی بودن

۲. فرار از روابط نزدیک

۳. آشفتگی هویت

۴. خود آسیب زنی عمدی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰:

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰:

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۱۵- کدام گزینه به نظریه یانگ و لیندمان در مورد طرحواره های مربوط به اختلالات شخصیت مربوط نمی شود؟

۱. حفظ طرحواره ۲. اجتناب از طرحواره ۳. جبران طرحواره ۴. فقدان طرحواره

۱۶- حجم ماده خاکستری پره فرونتال افرادی که به اعمال ضداجتماعی اشتغال داشتند چه تغییری نشان می دهد؟

۱. افزایش می یابد. ۲. کاهش می یابد. ۳. تغییری نمی کند. ۴. رشد نمی کند.

۱۷- از نظر راث و همکاران برای افراد مبتلاء به اختلال شخصیت که سن پایین تر از ۳۰ سال دارند، مهمترین مسئله چه احتمالی است؟

۱. افسردگی ۲. خودکشی ۳. خود آسیب زنی ۴. روان پریشی

۱۸- در اختلالات شخصیت مؤثرترین مداخلات روانشناختی کدامند؟

۱. آبهایی که به خانواده معطوف می شوند. ۲. رویکرد مبتنی بر همسالان ۳. مداخلات مبتنی بر همسالان ۴. آموزش مهارت اجتماعی و حل مسئله

۱۹- اختلال بی اشتهایی و پراشتهایی روانی معمولاً از چه زمانی بروز می کند؟

۱. پس از یک دوره رژیم سخت غذایی در افرادی که از چاق شدن می ترسند. ۲. بعد از قرار گرفتن در موقعیت اضطراب آور. ۳. وقتی افراد از لاغری مفرط در عذاب باشند. ۴. از زمانی که رژیم غذایی افراد تغییر می کند.

۲۰- بارزترین و فوری ترین پیامد کنترل و کاهش وزن مربوط به بی اشتهایی روانی چیست؟

۱. زبردن پوست ۲. آموریا ۳. فشار خون پایین ۴. خشکی مو

۲۱- مطالعات نشان داده اند که ۷۴ درصد واریانس رفتارهای بی اشتهایی به چه عواملی مربوط می شوند؟

۱. عوامل زیست شناختی ۲. روانشناختی ۳. ژنتیکی ۴. شناختی

۲۲- براساس طرحواره های خویشتن مربوط به وزن، اشخاص چگونه ارزیابی می شوند؟

۱. براساس صلاحیت فردی ۲. با افکار و احساساتشان ۳. براساس چاقی یا لاغریشان ۴. براساس تجارب فردی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۲۳- در تبیین روان تحلیلی، بیماران مبتلا به بی اشتهایی روانی فاقد کدام یک از موارد زیر می باشند؟

۱. احساس وابستگی به اطرافیان و رابطه به آنها
۲. فاقد احساس نشاط و شادی
۳. خود انضباطی
۴. فاقد احساس خودمختاری و خود بودن

۲۴- بر طبق آمار، نیمی از بیماران که به طور معمول تحت درمان چاقی قرار می گیرند دچار چه عارضه هایی هستند؟

۱. مصرف مواد
۲. افسردگی و اضطراب خفیف
۳. وسواس- جبری
۴. اضطراب بالا

۲۵- کدام نوع خواب حافظه را تحکیم می بخشد؟

۱. مرحله دوم خواب non-REM
۲. non-REM
۳. REM
۴. مرحله چهارم non-REM

۲۶- کدام یک از روش های زیر، شیوه مؤثری در درمان بی خوابی اولیه است؟

۱. درمان آرمیدگی
۲. شرطی شدن مجدد
۳. درمان مجدد محدودسازی خواب
۴. دارو درمانی

۲۷- پر خوابی اولیه چه زمانی به عنوان یک اختلال مطرح می شود؟

۱. وقتی که بروز خانوادگی داشته باشد.
۲. زمانی که علت دیگری برای پر خوابی فرد نمیتوان یافت.
۳. زمانی که فرد شکایت عمدهای از خواب آلودگی به مدت ۲ ماه دارد.
۴. زمانی که فرد مشکلاتی در زمینه های مختلف زندگی پیدا نمی کند.

۲۸- نارکولپسی حداقل در چه مدتی قابل تشخیص است؟

۱. ۱ ماه
۲. ۳ ماه
۳. ۲ هفته
۴. ۶ هفته

۲۹- تفاوت اختلال وحشت شبانه و خواب گردی در کدام گزینه زیر آمده است؟

۱. در وحشت شبانه فرد به طور معمولی بیدار می شود، رویای دیده شده را به یاد نمی آورد.
۲. در اختلال خوابگردی فرد با هشیاری به یکسری اعمال پیچیده دست میزند.
۳. در اختلال خوابگردی، فرد رویای زیادی را تجربه می کند.
۴. در وحشت شبانه فرد رویای دیده شده را به خاطر می آورد.



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰:

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰:

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۰- برای درمان وحشت شبانه و خوابگردی چه عواملی دارای اهمیت است؟

۱. بررسی سوابق خوابگردی
۲. بررسی طول مدت ابتلاء به این اختلال ها
۳. بررسی وضعیت زندگی و خانوادگی
۴. بررسی تاریخچه بیماری

۳۱- اولین اختلال در طبقه اختلالات مربوط به میل جنسی کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. اختلال میل جنسی کم کار
۲. انزوال زودرس
۳. واژینیسم
۴. اختلال بیزاری جنسی

۳۲- زمانی که فرد با رفتارهای خشونت آمیز و آسیب رسان نسبت به موضوع جنسی خود، به برانگیختگی جنسی دست می یابد کدام اختلال مطرح است؟

۱. نمایشگری جنسی
۲. مازوخیسم
۳. سادیسم جنسی
۴. تمایل جنسی نسبت به کودکان

۳۳- در تبیین شناختی اختلال نعوظی، از نظر بن کرافت چه عاملی عملکرد جنسی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد؟

۱. اضطراب
۲. ترس
۳. تمایلات همجنس گرایانه
۴. تمایلات پرخاشگرانه

۳۴- اختلال هویت جنسی معمولاً از چه سنی قابل ردیابی هستند؟

۱. قبل از ۶ سالگی
۲. ۴ - ۲ سالگی
۳. قبل از ۳ سالگی
۴. ۱۲ سالگی

۳۵- نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به GID چه اشتغال ذهنی در مورد جنسیت شان دارند؟

۱. از اندامهای جنسی، جنس مقابل متنفرند.
۲. معتقدند که با یک جنسیت غلط به دنیا آمده اند.
۳. احساس جذابیت نمی کنند.
۴. به تغییر جنسیت عمل جراحی فکر می کنند.

۳۶- اختلال عصب شناختی نتیجه آسیب به چه بخشهایی از بدن می باشد؟

۱. دستگاه عصبی خودمختار
۲. دستگاه عصبی مرکزی
۳. سلولهای عصبی
۴. بخش پیکری

۳۷- در فرآیندهای عصب شناختی بیماری آلزایمر، در بخش ساختاری، لکه های آمیلوئید، چه عاملی را سبب می شوند؟

۱. باعث مرگ نرونی می شوند.
۲. باعث ایجاد کانالهایی در غشاء می شوند.
۳. باعث آسیب پروتئین آمیلوئید می شوند.
۴. موجب خروج کلسیم از نرون می شوند.



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۸- مشخصه شایع علائم جسمی بیماری MS کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. از بین رفتن کارکرد پاها
۲. آسیب شناختی
۳. فقدان کنترل مثانه
۴. انقباض عضلاتی به ویژه در اندامهای بالاتنه

۳۹- در سبب شناسی بیماری پارکینسون، علت بروز بیماری کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. شخصیت غیرقابل انعطاف
۲. آشفته گی هیجانی
۳. ضربه های روانی
۴. فقدان سلولهای رنگدانه های در جسم سیاه

۴۰- شایعترین اختلال روانشناختی در بیماران صرعی چیست؟

۱. اختلالات خلقی
۲. اختلالات شخصیتی
۳. افسردگی
۴. اضطراب فراگیر



93-94-2

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت کليد
1	ب	عادي
2	ج	عادي
3	الف	عادي
4	د	عادي
5	د	عادي
6	ج	عادي
7	ب	عادي
8	ب	عادي
9	ج	عادي
10	الف	عادي
11	ب	عادي
12	د	عادي
13	ب	عادي
14	ب	عادي
15	د	عادي
16	ب	عادي
17	ب	عادي
18	الف	عادي
19	الف	عادي
20	ب	عادي
21	ج	عادي
22	ج	عادي
23	د	عادي
24	ب	عادي
25	ج	عادي
26	ب	عادي
27	ب، د	عادي
28	ب	عادي
29	الف	عادي
30	ج	عادي
31	الف	عادي
32	ج	عادي
33	الف	عادي
34	ج	عادي
35	ب	عادي
36	ب	عادي
37	الف، ج	عادي
38	د	عادي
39	د	عادي
40	ب	عادي

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰، ۱۲۱۷۰۶۱ -

۱- تمایز اختلال عاطفی فصلی با اختلال افسردگی اساسی در چیست؟

۱. طول مدت اختلال عاطفی فصلی کوتاهتر است.

۲. اختلال عاطفی فصلی، یک حالت فصلی است و در زمستان رخ می دهد.

۳. طول مدت اختلال افسردگی اساسی کوتاهتر است.

۴. تفاوت چندانی ندارد.

۲- در کدام یک از انواع افسردگی نشانه ها شدیدتر و میزان بهبودی کمتر است؟

۱. افسردگی درونزاد ۲. افسردگی برونزاد ۳. افسردگی مضاعف ۴. افسردگی اساسی

۳- بر طبق طبقه بندی DSM-IV-TR در اختلال دو قطبی نوع II کدام دوره ها (مانی یا افسردگی) مسلطند؟

۱. دوره های افسردگی مسلط هستند.

۲. دوره های مانیا شدیدتر است.

۳. افراد دوره های متغیری از افسردگی و مانیا را تجربه می کنند.

۴. نسبت هر دو برابر است.

۴- طبق مدل شناختی، چه عواملی موجب دوره هایی از افسردگی و مانیا (اختلال دو قطبی) می شوند؟

۱. عزت نفس و اعتماد به نفس بالا ۲. اضطراب بالا و طرحواره

۳. توهم ها و هذیان ها ۴. معیارهای غیر واقع گرایانه در مورد موفقیت

۵- غم ناشی از مرگ عزیزان و پایان یک رابطه محبت آمیز چه نام دارد؟

۱. داغیدگی ۲. افسردگی ۳. سوگ ۴. موارد الف و ج

۶- جمله «همیشه برای من رخ می دهد» مربوط به کدام نوع اسناد است؟

۱. اسناد درونی ۲. اسناد کلی ۳. اسناد پایدار ۴. اسناد کلی و پایدار

۷- ناتوانی مربوط به بیماری اسکیزوفرنی بیشتر ناشی از فقدان چه نقص هایی است؟

۱. زیستی ۲. شناختی ۳. شناختی- رفتاری ۴. رفتاری



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۸- به عقیده بلولر اسکیزوفرنیا بیشتر تحت تأثیر چه عواملی به وجود می آید؟

۱. تحت نفوذ پیشرفت های آسیب شناسی بالینی

۲. تحت تأثیر عوامل روانشناختی

۳. بیشتر نشانه های سایکوزی این بیماری مدنظر بود.

۴. به نظر او هذیانها و توهمات، پدیدههای اولیه و اصلی بودند.

۹- ویژگی نوع کاتاتونیک اسکیزوفرنیا در کدام گزینه آمده است؟

۱. آشفتگی های خلقی

۲. آشفتگی های گفتاری

۳. آشفتگی روانی - حرکتی بارز

۴. هذیانهای پارانوئیدی

۱۰- در نیمکره شمالی و جنوبی افزایش بیماری اسکیزوفرنی در بین متولدین چه ماه هایی دیده می شود؟

۱. متولدین ماه های آخر زمستان تا اول بهار

۲. متولدین آخر تابستان

۳. متولدین ماه های اول بهار

۴. متولدین اول تابستان

۱۱- براساس مطالعات تغییرات ساختاری در بخش فرونتال مغز، حجم کوچکتر گيروسی استریت با کدام یک از موارد زیر ارتباط دارد؟

۱. اختلال در تفکر

۲. ناسازگاری اجتماعی

۳. توهمات شنوایی

۴. رفتار آشفته

۱۲- میزان بالایی از اسکیزوفرنیا در بین چه گروه هایی دیده می شود؟

۱. گروههای اجتماعی - اقتصاد بالاتر

۲. در خانواده های سرد و مستبد

۳. طبقات اجتماعی - اقتصادی متوسط

۴. گروههای اجتماعی - اقتصادی پائین تر

۱۳- طبق طبقه بندی DSM-IV-TR، کدام اختلال زیر در دسته سوم (ترسو یا مضطرب) اختلالات شخصیت قرار می گیرد؟

۱. اختلال شخصیت پارانوئید

۲. اختلال شخصیت وابسته

۳. اختلال شخصیت اسکیزوئید

۴. اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

۱۴- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیتی مرزی محسوب نمی شود؟

۱. احساس خالی بودن

۲. فرار از روابط نزدیک

۳. آشفتگی هویت

۴. خود آسیب زنی عمدی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۱۵- کدام گزینه به نظریه یانگ و لیندمان در مورد طرحواره های مربوط به اختلالات شخصیت مربوط نمی شود؟

۱. حفظ طرحواره ۲. اجتناب از طرحواره ۳. جبران طرحواره ۴. فقدان طرحواره

۱۶- حجم ماده خاکستری پره فرونتال افرادی که به اعمال ضداجتماعی اشتغال داشتند چه تغییری نشان می دهد؟

۱. افزایش می یابد. ۲. کاهش می یابد. ۳. تغییری نمی کند. ۴. رشد نمی کند.

۱۷- از نظر راث و همکاران برای افراد مبتلاء به اختلال شخصیت که سن پایین تر از ۳۰ سال دارند، مهمترین مسئله چه احتمالی است؟

۱. افسردگی ۲. خودکشی ۳. خود آسیب زنی ۴. روان پریشی

۱۸- در اختلالات شخصیت مؤثرترین مداخلات روانشناختی کدامند؟

۱. آنهایی که به خانواده معطوف می شوند. ۲. رویکرد مبتنی بر همسالان
۳. مداخلات مبتنی بر همسالان ۴. آموزش مهارت اجتماعی و حل مسئله

۱۹- اختلال بی اشتهایی و پراشتهایی روانی معمولاً از چه زمانی بروز می کند؟

۱. پس از یک دوره رژیم سخت غذایی در افرادی که از چاق شدن می ترسند.
۲. بعد از قرار گرفتن در موقعیت اضطراب آور.
۳. وقتی افراد از لاغری مفرط در عذاب باشند.
۴. از زمانی که رژیم غذایی افراد تغییر می کند.

۲۰- بارزترین و فوری ترین پیامد کنترل و کاهش وزن مربوط به بی اشتهایی روانی چیست؟

۱. زبردن پوست ۲. آمنوریا ۳. فشار خون پایین ۴. خشکی مو

۲۱- مطالعات نشان داده اند که ۷۴ درصد واریانس رفتارهای بی اشتهایی به چه عواملی مربوط می شوند؟

۱. عوامل زیست شناختی ۲. روانشناختی ۳. ژنتیکی ۴. شناختی

۲۲- براساس طرحواره های خویشتن مربوط به وزن، اشخاص چگونه ارزیابی می شوند؟

۱. براساس صلاحیت فردی ۲. با افکار و احساساتشان
۳. براساس چاقی یا لاغریشان ۴. براساس تجارب فردی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۲۳- در تبیین روان تحلیلی، بیماران مبتلا به بی اشتهایی روانی فاقد کدام یک از موارد زیر می باشند؟

۱. احساس وابستگی به اطرافیان و رابطه به آنها
۲. فاقد احساس نشاط و شادی
۳. خود انضباطی
۴. فاقد احساس خودمختاری و خود بودن

۲۴- بر طبق آمار، نیمی از بیماران که به طور معمول تحت درمان چاقی قرار می گیرند دچار چه عارضه هایی هستند؟

۱. مصرف مواد
۲. افسردگی و اضطراب خفیف
۳. وسواس - جبری
۴. اضطراب بالا

۲۵- کدام نوع خواب حافظه را تحکیم می بخشد؟

۱. مرحله دوم خواب non-REM
۲. non-REM
۳. REM
۴. مرحله چهارم non-REM

۲۶- کدام یک از روش های زیر، شیوه مؤثری در درمان بی خوابی اولیه است؟

۱. درمان آرمیدگی
۲. شرطی شدن مجدد
۳. درمان مجدد محدودسازی خواب
۴. دارو درمانی

۲۷- پر خوابی اولیه چه زمانی به عنوان یک اختلال مطرح می شود؟

۱. وقتی که بروز خانوادگی داشته باشد.
۲. زمانی که علت دیگری برای پر خوابی فرد نمیتوان یافت.
۳. زمانی که فرد شکایت عمدهای از خواب آلودگی به مدت ۲ ماه دارد.
۴. زمانی که فرد مشکلاتی در زمینه های مختلف زندگی پیدا نمی کند.

۲۸- نارکولپسی حداقل در چه مدتی قابل تشخیص است؟

۱. ۱ ماه
۲. ۳ ماه
۳. ۲ هفته
۴. ۶ هفته

۲۹- تفاوت اختلال وحشت شبانه و خواب گردی در کدام گزینه زیر آمده است؟

۱. در وحشت شبانه فرد به طور معمولی بیدار می شود، رویای دیده شده را به یاد نمی آورد.
۲. در اختلال خوابگردی فرد با هشیاری به یکسری اعمال پیچیده دست میزند.
۳. در اختلال خوابگردی، فرد رویای زیادی را تجربه می کند.
۴. در وحشت شبانه فرد رویای دیده شده را به خاطر می آورد.

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۰- برای درمان وحشت شبانه و خوابگردی چه عواملی دارای اهمیت است؟

۱. بررسی سوابق خوابگردی
۲. بررسی طول مدت ابتلاء به این اختلال ها
۳. بررسی وضعیت زندگی و خانوادگی
۴. بررسی تاریخچه بیماری

۳۱- اولین اختلال در طبقه اختلالات مربوط به میل جنسی کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. اختلال میل جنسی کم کار
۲. انزوال زودرس
۳. واژینیسم
۴. اختلال بیزاری جنسی

۳۲- زمانی که فرد با رفتارهای خشونت آمیز و آسیب رسان نسبت به موضوع جنسی خود، به برانگیختگی جنسی دست می یابد کدام اختلال مطرح است؟

۱. نمایشگری جنسی
۲. مازوخیسم
۳. سادیسم جنسی
۴. تمایل جنسی نسبت به کودکان

۳۳- در تبیین شناختی اختلال نعوظی، از نظر بن کرافت چه عاملی عملکرد جنسی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد؟

۱. اضطراب
۲. ترس
۳. تمایلات همجنس گرایانه
۴. تمایلات پرخاشگرانه

۳۴- اختلال هویت جنسی معمولاً از چه سنی قابل ردیابی هستند؟

۱. قبل از ۶ سالگی
۲. ۴ سالگی
۳. قبل از ۳ سالگی
۴. ۱۲ سالگی

۳۵- نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به GID چه اشتغال ذهنی در مورد جنسیت شان دارند؟

۱. از اندامهای جنسی، جنس مقابل متنفرند.
۲. معتقدند که با یک جنسیت غلط به دنیا آمده اند.
۳. احساس جذابیت نمی کنند.
۴. به تغییر جنسیت عمل جراحی فکر می کنند.

۳۶- اختلال عصب شناختی نتیجه آسیب به چه بخشهایی از بدن می باشد؟

۱. دستگاه عصبی خودمختار
۲. دستگاه عصبی مرکزی
۳. سلولهای عصبی
۴. بخش پیکری

۳۷- در فرآیندهای عصب شناختی بیماری آلزایمر، در بخش ساختاری، لکه های آمیلوئید، چه عاملی را سبب می شوند؟

۱. باعث مرگ نرونی می شوند.
۲. باعث ایجاد کانالهایی در غشاء می شوند.
۳. باعث آسیب پروتئین آمیلوئید می شوند.
۴. موجب خروج کلسیم از نرون می شوند.



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۸- مشخصه شایع علائم جسمی بیماری MS کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. از بین رفتن کارکرد پاها
۲. آسیب شناختی
۳. فقدان کنترل مثانه
۴. انقباض عضلانی به ویژه در اندامهای بالاتنه

۳۹- در سبب شناسی بیماری پارکینسون، علت بروز بیماری کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. شخصیت غیرقابل انعطاف
۲. آشفتنگی هیجانی
۳. ضربه های روانی
۴. فقدان سلولهای رنگدانه های در جسم سیاه

۴۰- شایعترین اختلال روانشناختی در بیماران صرعی چیست؟

۱. اختلالات خلقی
۲. اختلالات شخصیتی
۳. افسردگی
۴. اضطراب فراگیر



93-94-2

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضوئيت کليد
1	ب	عادي
2	ج	عادي
3	الف	عادي
4	د	عادي
5	د	عادي
6	ج	عادي
7	ب	عادي
8	ب	عادي
9	ج	عادي
10	الف	عادي
11	ب	عادي
12	د	عادي
13	ب	عادي
14	ب	عادي
15	د	عادي
16	ب	عادي
17	ب	عادي
18	الف	عادي
19	الف	عادي
20	ب	عادي
21	ج	عادي
22	ج	عادي
23	د	عادي
24	ب	عادي
25	ج	عادي
26	ب	عادي
27	ب، د	عادي
28	ب	عادي
29	الف	عادي
30	ج	عادي
31	الف	عادي
32	ج	عادي
33	الف	عادي
34	ج	عادي
35	ب	عادي
36	ب	عادي
37	الف، ج	عادي
38	د	عادي
39	د	عادي
40	ب	عادي



سه. سه. ۱۱. یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰. شش. ۰۰.

تعداد سوالات: نستی: ۴۰. تشریحی: ۰.

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی

روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰ - ۱۲۱۷۰۶۱

۱- رایج ترین اختلال روانی کدام است؟

۱. اسکیزوفرنی ۲. افسردگی ۳. اختلال شخصیت ۴. اختلال جسمانی شکل

۲- افسردگی مضاعف به چه معناست؟

۱. مجموع افسردگی اساسی و افسرده خوبی ۲. مجموع افسردگی اساسی و اختلال دو قطبی
۳. مجموع افسردگی اساسی و اختلال ادواری خوبی ۴. مجموع افسردگی اساسی و اختلال عاطفی فصلی

۳- کدامیک از موارد زیر از باورهای مطرح شده در مثلث شناختی بک نیست؟

۱. باور مربوط به خودمان ۲. باور مربوط به گذشته
۳. باور مربوط به آینده ۴. باور مربوط به رخدادها یا افراد دیگر

۴- هورمون ملاتونین در ابتلا به کدام اختلال نقش بیشتری دارد؟

۱. افسردگی اساسی ۲. اختلال دو قطبی ۳. اختلال ادواری خوبی ۴. اختلال عاطفی فصلی

۵- گزینه صحیح کدام است؟

۱. در اختلال ادواری خوبی فرد نشانه های افسردگی اساسی و مانی را به طور شدید تجربه می کند.
۲. اختلال ادواری خوبی اختلال حاد و دوره ای است.
۳. افراد مبتلا به اختلال ادواری خوبی شدیداً در معرض خطر ابتلا به اختلال دو قطبی کامل قرار دارند.
۴. اختلال ادواری خوبی همان اختلال افسردگی اساسی است.

۶- طبق مدل شناختی، عامل ایجاد کننده افسردگی و مانی چیست؟

۱. اشتغال ذهنی با از دست دادن واقعی و خیالی ۲. تکانه های نامقبول
۳. عزت نفس پایین و معیارهای غیر واقع گرایانه ۴. عدم دریافت تقویت

۷- کدام دارو برای تعدیل نوسانات خلقی اختلال دو قطبی تجویز می شود؟

۱. دسی پرامین ۲. ایمی پرامین ۳. فلوکستین ۴. لیتیموم بی کربنات

۸- صحبت و رفتار آشفته و خلق نامتناسب از مشخصه های اصلی کدام نوع اسکیزوفرنی است؟

۱. کاتاتونیک ۲. پارانوئید ۳. باقیمانده ۴. هبفرنیا

۹- کدامیک از نشانه های زیر جزء نشانه های منفی اسکیزوفرنی محسوب نمی شود؟

۱. هذیان ۲. بی احساسی ۳. فقر گفتار ۴. انزوای اجتماعی



سه شنبه ۱۰/۱۱/۱۴

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰:۰۰:۰۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانش

۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۱۰- در نیمکره شمالی و جنوبی افزایش اسکیزوفرنی در بین متولدین چه ماه هایی دیده می شود؟

۱. متولدین ماه های آخر زمستان تا اول بهار
۲. متولدین آخر تابستان
۳. متولدین ماه های اول بهار
۴. متولدین اول تابستان

۱۱- کدام مشخصه بالینی با پیش آگهی بد اسکیزوفرنی ارتباط دارد؟

۱. شروع زودرس یا تدریجی
۲. جنسیت مونث
۳. نشانه های مثبت
۴. IQ بالا

۱۲- ضایعه در کدام نواحی مغزی با احتمال بیشتر ایجاد اسکیزوفرنی پارانوئید رابطه دارد؟

۱. لوب تمپورال نیمکره چپ
۲. لوب تمپورال نیمکره راست
۳. لوب پریتال نیمکره چپ
۴. لوب پریتال نیمکره راست

۱۳- کدام مدل معتقد است که مبتلایان به اسکیزوفرنی از راهبردهای مقابله ای ضعیفتری در مواجهه با استرس های زندگی استفاده می کنند؟

۱. مدل ضربه روانی
۲. مدل مقابله ای
۳. مدل شناختی
۴. مدل روانکاوی

۱۴- ویژگی بارز دسته سوم اختلالات شخصیتی چیست؟

۱. افسردگی
۲. اضطراب
۳. هیجان
۴. عجیب و غریب بودن

۱۵- کدامیک از اختلالات شخصیت در زنان شایع تر است؟

۱. مرزی
۲. ضد اجتماعی
۳. خودشیفته
۴. دوری گزین

۱۶- علامت بارز اختلال شخصیت اسکیزوئید چیست؟

۱. سوء ظن
۲. تنهایی مفرط
۳. نابهنجاری در تفکر
۴. نقض مقررات

۱۷- مکانیسم دفاعی اصلی اختلال شخصیت پارانوئید چیست؟

۱. واپس زدن
۲. فرافکنی
۳. جداسازی
۴. والایش

۱۸- سن لازم برای تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی چند سال است؟

۱. حداقل ۱۵
۲. حداقل ۱۸
۳. حداقل ۲۰
۴. حداقل ۱۳

۱۹- مکانیسم دفاعی جداسازی در کدامیک از اختلال زیر بیشتر استفاده می شود؟

۱. خودشیفته
۲. نمایشی
۳. دوری گزین
۴. مرزی



سه شنبه ۱۰/۱۱/۱۴۰۰

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰:۰۰:۰۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانش

۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۲۰- در رابطه با اختلال شخصیت وسواسی- اجباری کدام گزینه نادرست است؟

۱. کمال گرایی در این مبتلایان مشاهده می شود.
۲. ویژگی این بیماران به افراد تیپ A شبیه است.
۳. اشتغال ذهنی با نظم از نشانه های این اختلال است.
۴. این بیماران تمایل شدید به محول کردن کارهای خود به دیگران دارند.

۲۱- فردی بدون دلیل از افراد صاحب قدرت انتقاد کرده و آنها را تحقیر می کند ، عبوس و اهل مجادله است و بین مخالفت خصمانه و پشیمانی در نوسان است ، وی احتمالاً به کدام نوع اختلال شخصیت مبتلا است؟

۱. افسرده
۲. منفعل پرخاشگر
۳. وابسته
۴. ضداجتماعی

۲۲- کدام گزینه نادرست است؟

۱. افراد مبتلا به بی اشتهایی روانی عزت نفس و جرات مندی پایینی دارند.
۲. اختلال بی اشتهایی روانی در زنان بی سواد و طبقات اجتماعی پایین تر شایع تر است.
۳. مشغله ذهنی مبتلایان به بی اشتهایی روانی کنترل وزن است.
۴. بی اشتهایی روانی در سنین ۱۴ تا ۱۸ سالگی شایع تر است.

۲۳- کدامیک از موارد زیر در نوع محدود کننده بی اشتهای روانی مشاهده می شود؟

۱. مصرف نایجای ملین ها
۲. مصرف مدرها
۳. تنقیه کردن
۴. مصرف مواد کم کالری

۲۴- بارزترین و فوری ترین پیامد کنترل و کاهش وزن مربوط به بی اشتهایی روانی چیست؟

۱. غلظت پایین مواد معدنی
۲. ترک برداشتن پوست
۳. آمنوریا
۴. فشار خون پایین

۲۵- طبق ملاک های تشخیصی ، رفتارهای جبرانی افراد مبتلا به بی اشتهایی روانی به طور متوسط چند بار در هفته و به مدت چند ماه باید اتفاق افتد تا قابل تشخیص گذاری شود؟

۱. حداقل ۲ بار در هفته و به مدت ۶ ماه
۲. حداقل ۱ بار در هفته و به مدت ۶ ماه
۳. حداقل ۲ بار در هفته و به مدت ۳ ماه
۴. حداقل ۱ بار در هفته و به مدت ۳ ماه

۲۶- تحریک کدام بخش مغز منجر به ایجاد احساس گرسنگی می شود؟

۱. هیپوفیز پسین
۲. هیپوفیز پیشین
۳. هیپوتالاموس جانبی
۴. هیپوتالاموس شکمی



سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰:۰۰:۰۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانش

۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۲۷- شب ادراری و راه رفتن در حین خواب در کدامیک از مراحل خواب اتفاق می افتد؟

۱. مرحله اول و دوم خواب non-REM
۲. مرحله سوم و چهارم خواب non-REM
۳. مرحله دوم و سوم خواب non-REM
۴. مرحله خواب REM

۲۸- اختلال پر خوابی اولیه براساس DSM-4 باید چه مدت تداوم داشته باشد تا تشخیص گذاشته شود؟

۱. یک ماه
۲. سه ماه
۳. شش ماه
۴. یک سال

۲۹- منظور از کاتاپلکسی چیست؟

۱. توهم پیش از خواب
۲. توهم پس از خواب
۳. حملات غیر قابل مقاومت خواب
۴. از بین رفتن ناگهانی قوام عضلانی

۳۰- فردی از نگاه کردن به افراد برهنه در حال تعویض لباس بدون آنکه آنها باخبر باشند، لذت می برد وی به کدام اختلال مبتلاست؟

۱. نمایشگری جنسی
۲. تماشاگری جنسی
۳. یادگار خواهی جنسی
۴. یادگار خواهی همراه با مبدل پوشی

۳۱- کدامیک از اختلال های زیر جزء پارافیلیاها محسوب نمی شود؟

۱. تمایل جنسی به کودکان
۲. مازوخیسم جنسی
۳. واژینیسم
۴. سادیسم جنسی

۳۲- دارو شناخته شده برای اختلال نعوظی کدام است؟

۱. بنزودیازپین ها
۲. ایمی پرامین
۳. زولپیدم
۴. سیلدنافیل

۳۳- مهمترین نظریه پذیرفته شده در مورد اختلال هویت جنسی کدام نظریه است؟

۱. روانکاوی
۲. شرطی شدن
۳. زیست شناسی
۴. شناختی

۳۴- درمان اختلال هویت جنسی باید چه مدت قبل از جراحی شروع شود؟

۱. ۲۴ ماه
۲. ۱۲ ماه
۳. ۱ ماه
۴. ۳ ماه

۳۵- در بیماران آلزایمری کدام حافظه ابتدا آسیب می بیند؟

۱. حافظه دور
۲. حافظه معنایی
۳. حافظه اخیر
۴. حافظه بلند مدت



سه شنبه ۱۰/۱۱/۱۴۰۱

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰:۰۰:۰۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانش

۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۳۶- آسیب دیدن توانایی ها برای انجام اعمال (هدفمند) علیرغم سالم بودن کارکردهای حرکتی چه نامیده می شود؟

۱. آمنزی
۲. آپراکسی
۳. آگنوزی
۴. اختلال در کارکردهای اجرایی

۳۷- فردی مبتلا به دمانس برای کارهای معمولی خود نیازمند کمک است و ممکن است رفتارهای مشکل داری نظیر پرخاشگری داشته باشد، وی در کدام سطح دمانس جای می گیرد؟

۱. دمانس مبهم
۲. دمانس خفیف
۳. دمانس متوسط
۴. دمانس شدید

۳۸- مهمترین انتقال دهنده عصبی مرتبط با آلزایمر چیست؟

۱. نورآدرنالین
۲. استیل کولین
۳. دوپامین
۴. سروتونین

۳۹- فقر و کندی حرکات ارادی، لرزش مداوم، قامت خمیده، خشکی و کندی در سرعت راه رفتن، از ویژگی های اصلی کدام اختلال است؟

۱. آلزایمر
۲. صرع
۳. پارکینسون
۴. MS

۴۰- شایع ترین اختلال روانشناختی در بیماران صرعی کدام است؟

۱. اختلال افسردگی
۲. اختلال اضطراب
۳. اختلال شخصیت
۴. اختلال اسکیزوفرنی



وضعیت کلید	پاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
عادی					ب	۱
عادی					الف	۲
عادی					ب	۳
عادی					د	۴
عادی					ج	۵
عادی					ج	۶
عادی					د	۷
عادی					د	۸
عادی					الف	۹
عادی					الف	۱۰
عادی					الف	۱۱
عادی					الف	۱۲
عادی					ب	۱۳
عادی					ب	۱۴
عادی					الف	۱۵
عادی					ب	۱۶
عادی					ب	۱۷
عادی					ب	۱۸
عادی					د	۱۹
عادی					د	۲۰
عادی					ب	۲۱
عادی					ب	۲۲
عادی					د	۲۳
عادی					ج	۲۴
عادی					ج	۲۵
عادی					ج	۲۶
عادی					ب	۲۷
عادی					الف	۲۸
عادی					د	۲۹
عادی					ب	۳۰
عادی					ج	۳۱
عادی					د	۳۲
عادی					ب	۳۳
عادی					ب	۳۴
عادی					ج	۳۵
عادی					ب	۳۶
عادی					ج	۳۷
عادی					ب	۳۸
عادی					ج	۳۹
عادی					ج	۴۰