



کد کنترل

۱۲۱

A

پنجشنبه

۱۴۰۲/۰۷/۲۰



آزمون الکترونیکی دهم ریاضی - مرحله ۱

آزمون اختصاصی - دفترچه ۱

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره	زمان پاسخ‌گویی	ملاحظات
۱	ریاضیات	۳۰	۱	۳۰	۵۳ دقیقه	۳۰ سوال ۵۳ دقیقه

حق چاپ و تکثیر سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز «گروه ماز»
مجاز می‌باشد و با مخالفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

به دلیل عدم رضایت قیم ماز، هرگونه استفاده غیرقانونی از دفترچه سوالات و پاسخنامه ماز برای تمامی اشخاص، شرعاً حرام است.

آزمون الکترونیک امتحان دهم اریاضی



$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{W}$ (۴)	$\mathbb{Z} \cap \mathbb{Q}' = \{ \}$ (۳)	$\mathbb{Z} \cup \mathbb{Q} = \mathbb{Q}$ (۲)	$\mathbb{N} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{N}$ (۱)	-۱ کدام گزینه غلط است؟
$\{x \in \mathbb{Z} 2 < x < 3\}$ (۴)	$\{x \in \mathbb{N} -2 \leq x \leq 2\}$ (۳)	$\mathbb{N} \cap \mathbb{Q}'$ (۲)	$\mathbb{W} - \mathbb{Z}$ (۱)	-۲ کدام مجموعه تهی نیست؟
$B = \left\{ x \mid x \in \mathbb{Z}, \sqrt{2}x \in \mathbb{Z} \right\}$ (۲)	$A = \left\{ x \mid x \in \mathbb{N}, x^2 - 1 = 0 \right\}$ (۱)			-۳ کدام مجموعه تهی است؟
$D = \left\{ x \mid \frac{x}{5} \in \mathbb{Z}, x^2 < 0 \right\}$ (۴)	$C = \left\{ x \in \mathbb{Z} \mid x^2 + y^2 = 4, y \in \mathbb{N} \right\}$ (۳)			
$A \cap B = \{a, b\}$ (۲)	$A \cup B = \{a, b\}$ (۲)	$A \cap B = \{a, b\}$ (۲)	$A \cup B = \{a, b, \{a, b\}\}$ (۱)	-۴ اگر A و B مجموعه هایی باشند، کدام گزینه صحیح است؟
$(A_7 \cap A_9) - A_4$ (۴)	$A_n = \left\{ x \in \mathbb{Z} \mid x \geq -n, x < 10 - \frac{n}{3} \right\}$ (۲)	4 (۳)	16 (۲)	(۱) عضو دارد.
A_7 (۴)	10 (۳)	8 (۱)	3 (۳)	(۲) زیرمجموعه دارد.
$a(3b+a)$ (۴)	b^a (۳)	$a+2b$ (۲)	$\frac{a}{b}$ (۱)	-۵ اگر a و b به ترتیب اعدادی گویا و گنگ باشند، کدام عدد حتماً گنگ است؟
$\sqrt{2-\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2+\sqrt{3}}} \in \mathbb{Q}'$ (۴)	$\cdot / \sqrt{71} = \frac{283}{495}$ (۳)	$(\sqrt{3}+1)^2 \in \mathbb{Q}'$ (۲)	$\sqrt{75} \in \mathbb{Q}'$ (۱)	-۶ کدام گزینه غلط است؟
36 (۴)	18 (۳)	12 (۲)	0 (۱)	-۷ اگر a و b به ترتیب اعدادی گویا و گنگ باشند، کدام عدد حتماً گنگ است؟
A' (۴)	\emptyset (۳)	B (۲)	$B - A$ (۱)	-۸ اگر A و B مجموعه هایی باشند، حاصل جمع اعضای مجموعه A کدام است؟
10 (۴)	8 (۳)	9 (۲)	7 (۱)	-۹ مجموعه $(A - B)' \cap (A \cup B) \cap A'$ کدام است؟
7 (۴)	5 (۳)	6 (۲)	4 (۱)	-۱۰ اگر A و B مجموعه هایی باشند، مجموعه $(A \cap B)' \cup (A \cup B)' \cup (B \cap A')$ دارای چند عضو است؟
7 (۴)	5 (۳)	6 (۲)	4 (۱)	-۱۱ ۷ عضو جدید به مجموعه B اضافه می کنیم. اگر تعداد اعضای مجموعه $A \cap B$ ، یک عدد افزایش یابد، تعداد اعضای مجموعه $(A - B) \cup (B \cap A')$ چه تعداد افزایش می یابد؟

محل انجام محاسبات



آزمون الکترونیک امتحانات دهم ریاضی

۱۲- چه تعداد از مجموعه های زیر متناهی اند؟

الف: مجموعه اعداد گویا بازه $(0,1)$

ب: مجموعه اعداد اول سه رقمی

پ: مجموعه سلول های تشکیل دهنده یک انسان

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۰ صفر


۱۱ (۴)

۱۴ (۳)

۱۲ (۲)

۱۳ (۱)

۱۴- با توجه به شکل، قسمت رنگی نشان دهنده کدام مجموعه است؟

 $(B-C) \cap A$ (۱) $B \cup (A-C)$ (۲) $(B \cap C') - A$ (۳) $(B \cap C) - A$ (۴)


∅ (۴)

۱۵- اگر $A \subseteq B-C$ باشد، مجموعه $(A \cap B) \cap (C-A)$ با کدام گزینه برابر است؟

B (۳)

A (۲)

B-C (۱)

۱۶- با توجه به شکل رویه رو، مجموع اعضای مجموعه $(A \cap B) \cup B'$ کدام است؟

۵۲ (۱)

۴۸ (۲)

۳۶ (۳)

۴۵ (۴)

۴ (۴)

۱۷- مجموعه $A = \{a, \{a\}, \{a, a\}, \{a, a, a\}\}$ چند زیرمجموعه ناتهی دارد؟

۳ (۳)

۷ (۲)

۱۵ (۱)

۱۸- اگر A زیرمجموعه ای متناهی و B زیرمجموعه ای نامتناهی از اعداد صحیح باشند، کدام گزینه صحیح است؟

۱) B' متناهی است.۲) اگر $C \subseteq B$ باشد، C نامتناهی است.۳) اگر $A \subseteq C$ باشد، C نامتناهی است.۴) اگر $C \cup D \subseteq A$ ، C متناهی است.

۸ (۴)

۷ (۳)

۹ (۲)

۶ (۱)

۶ (۴)

۹ (۳)

۸ (۲)

۷ (۱)

۲۱- نقطه A روی خط d قرار دارد. چند نقطه در صفحه می توان یافت که به فاصله برابر ۵ واحد از نقطه A و خط d باشند؟

۴ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۰ هیچ

محل انجام محاسبات



آزمون الکترونیک امتحانات هم از اینجا

- ۲۲- دو خط متقاطع d_1 و d_2 در صفحه مفروض اند. چند نقطه در صفحه وجود دارد که از خط d_1 به فاصله ۱ واحد و از خط d_2 به فاصله ۲ واحد باشند؟

- ۴) (۴) ۴ ۳) (۳) ۲ ۲) (۲) ۱ ۱) هیچ

- ۲۳- چند لوزی متمایز می توان رسم کرد که طول هر ضلع آن ۶ و طول یکی از قطرهای آن ۸ باشد؟
۴) بی شمار ۳) (۳) ۲ ۲) (۲) ۱ ۱) هیچ

- ۲۴- در رسم خطی موازی با یک خط مفروض از نقطه‌ای غیرواقع بر آن، کدام یک از موارد زیر استفاده نمی‌شود؟
۱) دو خط موازی با یک خط، با هم موازی‌اند.

- ۲) در یک صفحه، دو خط عمود بر یک خط، با هم موازی‌اند.

۳) در یک نقطه واقع بر یک خط، می‌توان خطی عمود بر آن رسم کرد.

۴) از یک نقطه غیرواقع بر یک خط، می‌توان خطی عمود بر آن رسم کرد.

- ۲۵- مثلثی به طول اضلاع $4x - 4$ ، $5x + 6$ و 6 قابل رسم است. بزرگ‌ترین عدد طبیعی ممکن برای محیط چنین مثلثی کدام است؟
۴) (۴) ۳۲ ۳) (۳) ۲۱ ۲) (۲) ۳۰ ۱) ۲۷

- ۲۶- در مثلث $\triangle ABC$ ، نقاط M و N به ترتیب روی اضلاع AB و AC به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که $AM = AN$ است. اگر نقطه‌ای درون مثلث، نقطه $PN \perp AC$ و $PM \perp AB$ باشد، نقطه P همواره روی کدام یک از خطوط زیر واقع است؟

- ۲) ارتفاع نظیر رأس A
۱) عمودمنصف ضلع BC
۴) نیمساز داخلی زاویه A
۳) میانه نظیر رأس A

- ۲۷- خط d و نقاط A و B در یک صفحه مفروض اند. در کدام حالت زیر نقطه‌ای روی خط d وجود ندارد که از A و B به یک فاصله باشد؟

- ۱) خط d موازی پاره خط AB باشد.
۲) خط d عمودمنصف پاره خط AB باشد.
۳) خط d پاره خط AB را قطع کند و بر آن عمود نباشد.
۴) خط d امتداد پاره خط AB را قطع کند و بر آن عمود باشد.

- ۲۸- در ذوزنقه $ABCD$ ، نیمسازهای دو زاویه A و D یکدیگر را در نقطه O قطع کرده‌اند. اگر طول ارتفاع ذوزنقه برابر ۱۲ باشد، فاصله نقطه O از ساق AD کدام است؟

- ۴) (۴) ۴ ۳) (۳) ۶ ۲) (۲) ۸ ۱) (۱) ۹

- ۲۹- در مثلث $\triangle ABC$ ، $\hat{A} = 40^\circ$ است. اگر عمودمنصف‌های اضلاع AB و AC یکدیگر را در نقطه O قطع کنند، اندازه زاویه \hat{BOC} چند درجه است؟

- ۴) (۴) 40° ۳) (۳) 60° ۲) (۲) 80° ۱) (۱) 120°

- ۳۰- چند مثلث متمایز $\triangle ABC$ می‌توان رسم کرد که در آن $AC = 5$ ، $BC = 6$ ، $AB = 4$ و مساحت مثلث برابر $S = 18$ باشد؟
۱) هیچ ۲) (۲) ۲ ۳) (۳) ۱ ۱) هیچ

محل انجام محاسبات



کد کنترل

۱۲

A

پنجشنبه

۱۴۰۲/۰۷/۲۰



آزمون الکترونیکی دهم ریاضی - مرحله ۱

آزمون اختصاصی - دفترچه ۲

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره	زمان پاسخ‌گویی	ملاحظات
۱	فیزیک	۲۰	۳۱	۵۰	۲۶ دقیقه	۴۰ سوال ۴۶ دقیقه
	شیمی	۲۰	۵۱	۷۰	۲۰ دقیقه	

حق چاپ و تکثیر سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز «گروه ماز»
مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

به دلیل عدم رضایت قیم ماز، هرگونه استفاده غیرقانونی از دفترچه سوالات و پاسخنامه ماز برای تمامی اشخاص، شرعاً حرام است.

۳۱- در میان مدل‌های اتمی، مدل «ابر الکترونی» مربوط به کدام دانشمند است؟

- (۱) تامسون (۲) بور (۳) شرویدینگر (۴) رادرفورد

۳۲- کدام یک از گزاره‌های زیر درست است؟

الف: ویژگی آزمون پذیری و اصلاح نظریات فیزیکی نقطه قوت دانش فیزیک است.

ب: دانشمندان برای توصیف و توضیح پدیده‌های مورد بررسی از آزمایش نمودن آنها استفاده می‌کنند.

پ: در طول تاریخ، قوانین و نظریات فیزیک گاهی دست خوش تغییر و گاه نقض و نظریه جدیدی جایگزین آن شده است.

- (۱) «الف» و «ب» (۲) «ب» و «پ» (۳) «ب» و «پ» (۴) هر سه مورد

۳۳- اگر فاصله زمین تا خورشید را که معادل $1/5 \times 10^{11}$ متر است، یکای نجومی در نظر بگیریم و هر سال نوری معادل $9/45 \times 10^{12}$

کیلومتر فرض شود، فاصله ستاره‌ای که تا زمین چهار سال نوری است، معادل چند یکای نجومی است؟

- (۱) $3/81 \times 10^3$ (۲) $2/52 \times 10^3$ (۳) $2/52 \times 10^5$ (۴) $9/45 \times 10^3$

۳۴- در کدام گزینه، همه کمیت‌ها اصلی و نرده‌ای هستند؟

(۱) مسافت - نیرو - زمان (۲) تندری - جرم - جریان الکتریکی

(۳) جریان الکتریکی - جرم - زمان (۴) زمان - دما - جابه‌جایی

۳۵- یکاهایی که برای انجام اندازه‌گیری درست و قابل اطمینان نیاز داریم باید دارای چند مورد از ویژگی‌های زیر باشند؟

الف: اصلی باشند.

ب: تغییر نکنند.

پ: جزو مجموعه یکاهای SI باشند.

ت: دارای قابلیت باز تولید در مکان‌های مختلف باشند.

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۳۶- آخرین توافق انجام شده برای یکاهای در کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست بیان شده است؟

(۱) طول: مسافت طی شده توسط نور در یک زمان معین

(۲) زمان: $\frac{1}{86400}$ میانگین روز خورشیدی

(۳) جرم: جرم استوانه‌ای فلزی از جنس آلیاژ پلاتین - ایریدیوم

(۴) جرم: یکای جرم در SI معادل kg است.

۳۷- اتومبیلی از شهر A به شهر B بدون توقف در حال حرکت است. در مدل‌سازی حرکت این اتومبیل، کدام مورد نادرست است؟

(۱) اتومبیل را به صورت ذره فرض می‌کنیم.

(۲) از جرم اتومبیل و سرنوشتیان آن صرف نظر می‌کنیم.

(۳) از مساحت سطح لاستیک اتومبیل صرف نظر می‌کنیم.

(۴) از حرکت دورانی چرخ‌ها صرف نظر کرده و فقط انتقالی درنظر می‌گیریم.

۳۸- اگر شعاع یک استوانه فلزی $2 \times 10^5 \mu\text{m}$ و حجم آن $48 \times 10^{-30} \text{ m}^3$ ۴۸۰ گیگامتر مکعب باشد، ارتفاع آن چند دکامتر است؟ ($\pi = 3$)

- (۱) ۰/۰۰۰۴ (۲) ۰/۰۰۴ (۳) ۰/۰۴ (۴) ۰/۴

۳۹- حاصل کسر $\frac{0/5 \times 10^{-4} \text{ Mm} + 0/4 \times 10^{15} \text{ pm}}{0/2 \text{ min} + 1/8 \times 10^7 \mu\text{s}}$ در SI کدام است؟

- (۱) ۱/۵ (۲) ۳/۲ (۳) ۳/۰ (۴) ۱۵

محل انجام محاسبات

- ۴۰- کدام یک از گزینه‌های زیر از بقیه بزرگتر است؟ ($1\text{Ly} = 9 \times 10^{18}\text{m}$ ، $1\text{in} = 2/5\text{cm}$ ، $1\text{ft} = 12\text{in}$ = ۱ ذرع، $2 \times 10^{-1}\text{hin}$ (۲) $0/4 \times 10^5\text{ft}$ (۱) $2 \times 10^{-10}\mu\text{Ly}$ (۳) $0/03 \times 10^3$ ذرع (۳)

- ۴۱- شتاب یک خودرو معادل $7/2 \times 10^{-8} \frac{\text{Tm}}{\text{min}^2}$ است مقدار این شتاب در SI و به صورت نمادگذاری علمی در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

(۱) $2/0 \times 10^1$ (۴) $2/0 \times 10^2$ (۳) $1/2 \times 10^2$ (۲) $1/2 \times 10^3$ (۱)

- ۴۲- فرض کنید قد یک شخص از ابتدای ۳ سالگی تا ابتدای ۱۸ سالگی از ۱۷۵cm به ۱۲۱cm برسد. آهنگ متوسط افزایش قد این شخص چند واحد نجومی بر ماه است؟ (هر واحد نجومی معادل $1/5 \times 10^{11}\text{m}$ و هر ماه ۳۰ روز فرض شود).

(۱) 2×10^{-14} (۴) 2×10^{-13} (۳) $2/4 \times 10^{-13}$ (۲) $2/4 \times 10^{-12}$ (۱)

- ۴۳- در ظرفی مکعب شکل به حجم 500mL حداکثر چند مکعب فلزی کوچک به ابعاد $2\text{mm} \times 5\text{mm} \times 0.004\text{dam}$ می‌توان جا داد؟

(۱) ۱ (۴) 1250 (۳) 12 (۲) 125 (۱)

- ۴۴- اگر A، B و C سه کمیت فیزیکی باشند، کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

(۱) مجموع دو عبارت AC و B الزاماً غیر ممکن است.
(۲) تفریق دو عبارت A و C الزاماً غیر ممکن است.

(۳) عبارت $\frac{AC}{B}$ الزاماً دارای یکا است.

(۴) اگر دو عبارت BC و A جمع پذیر باشند، عبارت $\frac{BC}{A}$ الزاماً بدون یکا است.

- ۴۵- یکای آهنگ تغییرات نیروی وارد بر یک جسم در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟

$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^3}$ (۴) $\frac{\text{kgm}^2}{\text{s}^3}$ (۳) $\frac{\text{kgm}}{\text{s}^2}$ (۲) $\frac{\text{kgm}^2}{\text{s}^2}$ (۱)

- ۴۶- یک رابطه فیزیکی به صورت $v = \sqrt{\alpha U + \beta^2}$ نوشته می‌شود که در آن v بیانگر تندی و U بیانگر انرژی است. یکای β و α در SI به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

$\frac{\text{m}}{\text{kg}} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (۲)	$\frac{\text{m}}{\text{kg}} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ (۱)
$\frac{1}{\text{kg}} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ (۴)	$\frac{1}{\text{kg}} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (۳)

- ۴۷- اگر F بیانگر نیرو و P بیانگر توان باشد، عبارت $\frac{F}{P}$ از جنس کدام کمیت زیر است؟

(۱) زمان (۲) معکوس زمان (۳) تندی (۴) معکوس تندی

محل انجام محاسبات

$$48 - \text{در تساوی } \frac{\text{Mg} \cdot \mu\text{m}^2}{\square \text{s}^2} = 1000 \cdot 10^4 \mu\text{J} \text{ در جای خالی کدام پیشوند باید قرار گیرد؟}$$

m (۴) M (۳) h (۲) c (۱)

49 - اگر رابطه‌ای به صورت $Q = mc\Delta\theta$ داشته باشیم که Q بیانگر انرژی گرمایی، $\Delta\theta$ بیانگر تغییرات دما (بر حسب درجه فارنهایت) و m بیانگر جرم باشد، یکای c در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ (۱) معادل پوند و یکای جرم است، (۲) معادل فوت و یکای طول است، (۳) معادل درجه فارنهایت و یکای دما است.

$$\frac{\text{ft}^2}{\text{s}^2 \cdot {}^\circ\text{F}} (۲) \quad \frac{\text{ft}}{\text{s} \cdot {}^\circ\text{F}} (۱)$$

$$\frac{\text{ft}^2}{\text{s} \cdot {}^\circ\text{F}} (۴) \quad \frac{\text{ft}}{\text{s}^2 \cdot {}^\circ\text{F}} (۳)$$

50 - در مدل سازی فیزیکی کدام یک از پدیده‌های زیر، می‌توان از مقاومت هوا صرف نظر کرد؟

- (۱) سقوط یک چتر باز
- (۲) افتادن برگی از درخت
- (۳) پرتاب یک توپ بسکتبال
- (۴) حرکت بادبادک

محل انجام محاسبات

۵۱- کدام یک از مطالب زیر، نادرست است؟

- (۱) پس از مهبانگ و تشکیل ذرات زیراتمی، ابتدا عناصر هیدروژن و هلیم و سپس گازهای آنها تولید شد.
- (۲) دانشمندان با توجه به توزیع ناهمگون عناصرها در جهان، موفق به توضیح چگونگی پیدایش عناصرها شدند.
- (۳) دو فضاییمای وویجر ماموریت داشتند با عبور از کنار سیاره‌های سنگی، نوع عناصر سازندهی آنها را شناسایی کنند.
- (۴) پاسخ به پرسش چگونگی به وجود آمدن هستی، برخلاف شکل‌گیری جهان کنونی، در قلمرو علم تجربی نمی‌گنجد.

۵۲- کدام یک از مطالب زیر، نادرست است؟

- (۱) دومین عنصر فراوان سیاره‌ی زمین، در میان ۸ عنصر فراوان سیاره‌ی مشتری وجود دارد.
- (۲) ششمین عنصر فراوان سیاره‌های زمین و مشتری یکسان است و فراوانی برابر نیز دارد.
- (۳) سبک‌ترین عنصر جدول دوره‌ای، بیش از نیمی از عناصر سیاره‌ی مشتری را تشکیل می‌دهد.
- (۴) درصد فراوانی هیدروژن در سیاره‌ی مشتری، از مجموع فراوانی دو عنصر فراوان سیاره‌ی زمین، بیشتر است.

۵۳- مجموع شمار نوترون‌ها و الکترون‌ها در فراوان ترین ایزوتوپ لیتیم، چند برابر شمار نوترون‌ها در رادیوایزوتوپ طبیعی هیدروژن است؟

۱)	۲)	۳)	۷)
$\frac{7}{3}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{4}{2}$

۵۴- کدام موارد از مطالب زیر، درست هستند؟

- آ: عناصر سبک مانند لیتیم، بور و برلیم، عناصر سنگین‌تر مانند آهن، طلا و کربن را به وجود می‌آورند.
- ب: درون ستاره‌ها در دماهای بسیار بالا، واکنش‌های شیمیایی رخ می‌دهد و عناصر گوناگون تشکیل می‌شود.
- پ: جرم همه‌ی اتم‌های منزیم در یک نمونه از آن یکسان نیست، بلکه مخلوطی از سه ایزوتوپ(هم‌مکان) است.
- ت: تفاوت مقدار عدد جرمی و شمار نوترون‌های عنصر لیتیم، در همه‌ی ایزوتوپ‌های آن یکسان است.

۱) آ و پ	۲) ب و پ	۳) آ و ت	۴) پ و ت
----------	----------	----------	----------

۵۵- چند مورد از موارد زیر، درست است؟

- آ: نسبت شمار نوترون‌ها به بروتون‌ها در فراوان ترین ایزوتوپ Mg با این نسبت در سنگین‌ترین ایزوتوپ پایدار H ، برابر است.
- ب: شمار ایزوتوپ‌های ساختگی هیدروژن، با شمار نوترون‌های فراوان ترین ایزوتوپ لیتیم برابر است.
- پ: اگر e نماد الکترون باشد، با توجه به نماد همگانی اتم‌ها، مقدار $Z - A$ برابر با e است.
- ت: ۲۶ عنصر ساختگی جدول دوره‌ای در دوره‌های ششم و هفتم قرار گرفته‌اند.

۱)	۲)	۳)	۴)
----	----	----	----

۵۶- اگر نیم عمر ایزوتوپ H^3 در حدود ۱۲ سال باشد، جرم مخلوطی از ۳۰۰ گرم H^3 و ۲۰۰ گرم H^1 ، بعد از گذشت ۳۶ سال، به تقریب چند درصد کاهش می‌یابد؟

۱)	۴۴	۵۵	۳۷/۵
----	----	----	------

۵۷- کدام یک از مطالب زیر، در مورد نخستین عنصر ساخته شده در راکتور هسته‌ای درست است؟

- (۱) عنصری رادیوایزوتوپ است؛ زیرا نسبت شمار نوترون به بروتون آن، بیشتر از $1/5$ است.
- (۲) شمار نوترون‌های آن، با عدد اتمی ششمین عنصر گروه دوم جدول دوره‌ای یکسان است.
- (۳) یون یدید با یون این عنصر، اندازه‌ی مشابهی دارد و غده‌ی تیروئید هر دو یون را جذب می‌کند.
- (۴) از آنجا که نیم عمر آن کم است، نمی‌توان مقادیر زیادی از این عنصر را تهیه و برای مدت طولانی نگهداری کرد.

محل انجام محاسبات

-۵۸- اگر تفاوت و مجموع نوترون‌ها در دو عنصر A_{a+b}^{2a+1} و B_{b+c}^{2b+1} به ترتیب برابر با ۳۴ و ۷۴ باشد، عدد اتمی عنصر B کدام است؟ (شمار نوترون‌های عنصر B بیشتر از عنصر A است).

(۴) ۴۶

(۳) ۱۹

(۲) ۳۸

(۱) ۴۲

-۵۹- اختلاف عدد اتمی هر عنصر در دوره‌ی با عنصر زیرین خود، واحد است.

۱۸ - چهارم

۲ - اول

۱۸ - دوم

۸ - سوم

-۶۰- کدام یک از مطالب زیر، نادرست است؟

(۱) عنصر Cr_{24} همانند عنصر Ga_{31} در دوره‌ی چهارم و همانند عنصر Mo_{42} گروه ششم قرار دارد.

(۲) از رادیوایزوتوپ‌ها در پزشکی، کشاورزی و به عنوان سوخت در نیروگاه‌های اتمی استفاده می‌شود.

(۳) اگر عنصر کلر دارای دو ایزوتوپ طبیعی باشد، حداقل ۴ نوع مولکول Cl_6 در طبیعت وجود دارد.

(۴) از ایزوتوپ U_{92} که فراوانی آن کمتر از $1/70$ درصد در مخلوط طبیعی اورانیوم است، در راکتورهای اتمی استفاده می‌کنند.

-۶۱- خواص شیمیایی کدام دو عنصر، مشابه یکدیگر است؟

(۴) Rb_{37} (۳) I_{53} (۲) Zn_{49} (۱) As_{33} و K_{19}

-۶۲- اگر شمار نوترون‌ها در یون Br_{35}^{-} ۱۲/۵ درصد بیشتر از شمار نوترون‌ها در اتم Ge_{72} باشد، اختلاف شمار الکترون‌ها و نوترون‌ها در یون برمید کدام است؟

(۴) ۱۲

(۳) ۱۱

(۲) ۱۰

(۱) ۹

-۶۳- کدام یک از مطالب زیر در مورد دوره و گروه‌های جدول دوره‌ای، درست است؟

(۱) تنها دو گروه، دارای ۷ عنصر هستند.

(۲) شش گروه سمت راست، دارای ۶ عنصر هستند.

(۳) سه دوره با ۸ عنصر وجود دارد.

-۶۴- کدام یک از مطالب زیر، نادرست است؟

(۱) در جدول دوره‌ای، ۱۱۸ عنصر بر اساس افزایش عدد اتمی سازمان‌دهی شده‌اند.

(۲) در هر خانه از جدول دوره‌ای، نماد شیمیایی هر عنصر، نام و شمار پروتون‌های آن نوشته شده‌است.

(۳) با استفاده از داده‌های عددی نوشته شده در هر خانه از جدول دوره‌ای، شمار ذرات زیراتومی را می‌توان به دست آورد.

(۴) در هر خانه از جدول دوره‌ای، مقدار دقیق عدد جرمی نوشته شده و با کم کردن عدد اتمی از آن، می‌توان شمار نوترون‌ها را به دست آورد.

-۶۵- مجموع ارقام عدد اتمی عنصری که با عنصر هم دوره و با عنصر هم گروه است، با مجموع ارقام عدد اتمی عنصری که در زیر آن قرار دارد، برابر است.

(۴) Sr_{38} - Cl_{17} (۳) Se_{34} - Ne_{1} (۲) Pt_{78} - Ga_{31} (۱) Hg_{80} - K_{19}

-۶۶- کدام یک از مطالب زیر، نادرست است؟

(۱) دومین عنصر همه‌ی دوره‌ها، خواص شیمیایی مشابهی دارند.

(۲) عناصر گروه ۱۷، در واکنش با فلزها، یونی به صورت X^- تشکیل می‌دهند.

(۳) اگر Ar_{18} تمایلی به انجام واکنش نداشته باشد، Kr_{36} نیز رفتاری مشابه دارد.

(۴) اگر Al_{13} در واکنش با نافلزها یونی سه بار مثبت تشکیل دهد، Ga_{31} نیز رفتاری مشابه خواهد داشت.

-۶۷- نسبت شمار نوترون به پروتون در کدام اتم بزرگتر است؟

(۴) E_{a+3} (۳) Z_{a+2} (۲) Y_{a+3} (۱) X_{a+2}

محل انجام محاسبات

- ۶۸- بین دومین و پنجمین عنصر گروه دوم، چند عنصر وجود دارد؟
- ۴۳ (۴) ۳۳ (۳) ۳۴ (۲) ۴۴ (۱)
- ۶۹- چند مورد از مطالب زیر، درست است؟
- آ: گلوکز نشان دار، پس از تزریق، همراه با گلوکز معمولی در محل توده‌ی سرطانی تجمع می‌یابد.
- ب: برای تشخیص توده‌ی سرطانی از گلوکز نشان دار که حداقل یک اتم آن پرتوزا است، استفاده می‌شود.
- پ: گلوکز نشان دار، همانند گلوگز طبیعی به همراه جریان خون، در سرتاسر بدن از جمله مغز و اندامها توزیع می‌شود.
- ت: آشکارساز پرتو، تجمع گلوکز نشان دار و نه گلوکز معمولی را، که در محل بافت با رشد غیرمعمولی بیشتر است، نشان می‌دهد.
- ۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)
- ۷۰- در نمونه‌ای طبیعی از عنصر لیتیم، که حاوی ۵۰ اتم است، فراوانی ایزوتوپ ناپایدارتر، ۶٪ است. در این نمونه، چند نوترон وجود دارد؟
- ۱۸۷ (۴) ۱۵۰ (۳) ۱۵۳ (۲) ۱۹۷ (۱)

محل انجام محاسبات

www.Sakoye10hom.blog.ir

برترین دبیران کنکور ایران در کتاب های تست آنلاین مُنیاز



علی مقدم نیا



امید مصلایی



محمد نوکنده



فرزانه رجایی



ارسلان رحمانی



محمد چلاجور

ویژگی های کتاب های تست آنلاین مُنیاز



منتخب تست های آزمون های آزمایشی
در کتاب های تست آنلاین مُنیاز

تحلیل
ویدیویی
تمامی
تست ها



آپدیت
مستمر

هزینه هی
بسیار پائین



کتاب تست آنلاین **ریاضی تجربی مُنیاز** منبع اصلی من در سال دوازدهم بود. چون ایده های جالب **تست های مُنیاز** باعث پیشرفت و سرعت تست زدن من شده بود.



فاطمه هدایتی
راتبه ۷ کنکور



کد کنترل

۱۲۱

A

پنجشنبه

۱۴۰۲/۰۷/۲۰



گروه آزمون‌های ماز


پاسخنامه آزمون الکترونیکی دهم ریاضی - مرحله ۱

درس	مسئول درس	طراحان	ویراستاران
ریاضیات	حسین شفیع‌زاده	محمد‌امین نباخته - سوگند روشی	رضا قانع - شمیم پهلوان شریف سجاد احمدی
فیزیک	عباس غربی	عباس غربی - میثم دشتیان	سعید نصیری - محمد جواد سورچی علیرضا ملک حسینی
شیمی	مهرسا بایمانی نژاد	فرشاد هادیان فرد - مهسا بایمانی نژاد	سجاد سیف‌اللهی - عالیه میرزا

مدیر آزمون: رسول خنجری

حق چاپ و تکثیر سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز «گروه ماز»
مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

به دلیل عدم رضایت تیم ماز، هرگونه استفاده غیرقانونی از دفترچه سوالات و پاسخنامه ماز برای تمامی اشخاص، شرعاً حرام است.



<https://b2n.ir/j06347>

- ۱ کدام گزینه غلط است؟

$$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{W} \quad (4)$$

$$\mathbb{Z} \cap \mathbb{Q}' = \{ \} \quad (3)$$

$$\mathbb{Z} \cup \mathbb{Q} = \mathbb{Q} \quad (2)$$


$$\mathbb{N} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{N} \quad (1)$$

(متوسط - مفهومی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۴



برای این که راحت‌تر رابطه بین مجموعه اعداد رو متوجه بشیم می‌تونیم اونارو طبق شکل زیر نشون بدیم.



$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{W} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

دقت شود: برای اعداد گنگ، مجموعه‌های داخلی اعضای آن نمی‌باشند. برای سایر مجموعه‌ها، مجموعه‌های داخلی نیز اعضای آن می‌باشند.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

$$\mathbb{W} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

اعداد گویا اعدادی (کسرهایی) هستن که از تقسیم دو عدد صحیح مانند m و n به وجود میان که البته (خرج) باید مخالف صفر باشد.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$$

$$\text{مجموعه اعداد گنگ } \mathbb{Q}' = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$$

در واقع مجموعه اعداد حقیقی از اجتماع اعداد گویا و اعداد گنگ به وجود آمده است.

حالا به راحتی می‌تونیم طبق شکل درستی یا نادرستی گزینه‌ها را مورد بررسی قرار بدیم.



۱ طبق شکل \mathbb{N} زیرمجموعه \mathbb{Q} هست پس اشتراکشون برابر با \mathbb{N} میشے. چرا؟ چون هر وقت $B \subseteq A$ باشد اون وقت $A \cap B = B$ میشے. پس وقتی $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$ میشے. پس این گزینه درسته.

۲ طبق شکل هم می‌بینیم که \mathbb{Z} زیرمجموعه \mathbb{Q} هست پس اجتماعشون برابر با \mathbb{Q} میشے. چرا؟ چون هر وقت $B \subseteq A$ باشه اون وقت $A \cup B = B$ میشے. پس وقتی $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ هست پس $\mathbb{Z} \cup \mathbb{Q} = \mathbb{Q}$ میشے. پس این گزینه درسته.

۳ طبق شکل مشخصه که اعداد حسابی و گنگ $(\mathbb{Q}', \mathbb{Z})$ هیچ اشتراکی باهم ندارن پس اشتراکشون تهیه. یعنی $\{ \}$ پس این گزینه هم درسته.

۴ موند گزینه ۴ که فقط می‌تونه غلط باشه و واضحه چون که اعداد حسابی زیرمجموعه اعداد صحیح هستن نه این که اعداد صحیح زیرمجموعه اعداد حسابی باشن. پس این گزینه غلطه.

گروه آموزشی ماز

- ۲ کدام مجموعه تهی نیست؟

$$\{x \in \mathbb{Z} \mid 2 < x < 3\} \quad (4)$$

$$\{x \in \mathbb{N} \mid -2 \leq x \leq 2\} \quad (3)$$

$$\mathbb{N} \cap \mathbb{Q}' \quad (2)$$

$$\mathbb{W} - \mathbb{Z} \quad (1)$$

(متوسط - مفهومی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۳



برای پاسخ به این سؤال هم می‌توانیم از شکل رسم شده و نکات گفته شده در سؤال (۱) استفاده کنیم. خواسته سؤال اینه که ببینیم کدام گزینه تهی نیست.

بررسی تجزیه ها:

۱ از اونجا که اعداد حسابی (\mathbb{W}) زیرمجموعه اعداد صحیح (\mathbb{Z}) هست پس $\mathbb{W} - \mathbb{Z}$ تهی میشه.

۲ اعداد طبیعی (\mathbb{N}) زیرمجموعه از اعداد گویا (\mathbb{Q}) هستن و اعداد گویا زیرمجموعه هاش هیچ اشتراکی با اعداد گنگ (' \mathbb{Q}') ندارن پس اشتراک \mathbb{N} و ' \mathbb{Q}' تهی هستن. $\mathbb{N} \cap \mathbb{Q}' = \{\}$

۳ گزینه ۳، اعدادی از اعداد طبیعی رو می خواهد به شرطی که از $-2 \leq x \leq 2$ قرار بگیرن (یعنی $x \in \mathbb{Z}$). آیا عدد طبیعی در این بازه قرار داره؟ جواب بله هست اعداد ۱ و ۲ پس این گزینه تهی نیست. پس گزینه موردنظر سوال همین گزینه هست.

۴ توی این گزینه اعداد صحیحی رو می خواهد که در بین اعداد ۲ تا ۳ قرار بگیرن (یعنی $2 < x < 3$). آیا چنین عددی وجود داره؟ نه. خود ۲ و ۳ صحیح هستن ولی بین اونا هیچ عدد صحیحی قرار ندارد پس این گزینه هم تهی هست.

گروه آموزشی ماز

۳ - کدام مجموعه تهی است؟

$$B = \left\{ x \mid x \in \mathbb{Z}, \sqrt{2}x \in \mathbb{Z} \right\} \quad (۲)$$

$$D = \left\{ x \mid \frac{x}{5} \in \mathbb{Z}, x^2 < 0 \right\} \quad (۴)$$

$$A = \left\{ x \mid x \in \mathbb{N}, x^2 - 1 = 0 \right\} \quad (۱)$$

$$C = \left\{ x \in \mathbb{Z} \mid x^2 + y^2 = 4, y \in \mathbb{N} \right\} \quad (۳)$$

(متوسط - مفهومی / محاسباتی - ۱۰۵)

پاسخ: گزینه ۴



توی این سوال گزینه ای رو می خواهد که تهی باشه. پس تک به تک گزینه ها رو بررسی می کنیم.

بررسی سایر تجزیه ها:

۱ تو این گزینه x هایی رو می خواهد که عضو اعداد طبیعی باشن و $x^2 - 1 = 0$ باشه. خب اول $x^2 = 1$ رو بررسی می کنیم:

$$x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^2 = 1$$

خب همونطوری که از ریاضی نهم یادمونه اگر b یک عدد حقیقی مثبت باشه \sqrt{b} و $-\sqrt{b}$ را ریشه های دوم b می نامیم با بیان دیگه ریشه های دوم b برابر $+b$ و $-b$ می باشند.

پس وقتی $x^2 = 1$ هست $x = \pm 1$ میشه. حال ما x ای رو می خوایم که عضو اعداد طبیعی باشه که $x = 1$ یک عدد طبیعی هست پس $A = \{1\}$ یک مجموعه غیر تهی هست.

$$A = \{1\} \neq \emptyset$$

۲ تو این گزینه x هایی رو می خواهد که عضو اعداد صحیح باشن و حاصل ضرب $\sqrt{2}$ در x هم عدد صحیحی باشد. حاصل ضرب $\sqrt{2}$ در هر عدد صحیحی (x) گنگ هست مثلاً $\sqrt{2} \times 1 = \sqrt{2}$ یا $\sqrt{2} \times 10 = 10\sqrt{2}$ یا ...

و تنها حاصل ضرب $\sqrt{2}$ در صفر (که عدد صحیح هم هست) برابر صفر و عددی صحیح میشه.

$$\sqrt{2} \times 0 = 0 \in \mathbb{Z} \quad \checkmark$$

پس مجموعه B برابر است با: $B = \{0\}$ که این مجموعه تهی نیست و یک عضو دارد.

۳ تو این گزینه مجموعه C برابر هست با x هایی که عضو اعداد صحیح باشن به شرطی که $x^2 + y^2 = 4$ باشه و y های ما هم عضو اعداد طبیعی باشن. از اونجا که گفته y عدد طبیعی باشد؛ پس $y = 1$ و $y = 2$ رو در نظر می گیریم و در رابطه $x^2 + y^2 = 4$ جایگذاری می کنیم تا مقدار x به دست بیاد.

$$y = 1: x^2 + 1^2 = 4 \Rightarrow x^2 = 3 \Rightarrow x = \pm \sqrt{3}$$

آیا $x = \pm \sqrt{3}$ و $y = 1$ صحیح هست؟ نه. در صورتی که می خواستیم x عدد صحیحی باشد.

حالا بريم سراغ $y = 2$

$$y = 2: x^2 + 2^2 = 4 \Rightarrow x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$$

آیا $x = 0$ عدد صحیح هست؟ بله.

پس مجموعه C برابر $C = \{0\}$ میشه که تهی نیست.

۴ دا خل این گزینه x هایی رو می خود که مقدار $\frac{x}{5}$ عضو اعداد صحیح باشد و $x < 0$ (مجدور x کوچکتر از صفر) باشد در صورتی که ما می دونیم x^2

مجدور هر عبارتی) همیشه یا مثبت هست یا صفر. به ازای x مساوی صفر x^2 صفر میشه و به ازای سایر مقادیر x^2 مثبت میشه پس امکان نداره x^2 یک مقدار منفی بشه پس مجموعه $D = \emptyset$ یک مجموعه تهی هست.

گروه آموزشی ماز

- ۴ اگر $\{a, b\} \in A$ و $A = \{\{a, b\}, c, d\}$ کدام گزینه صحیح است؟
 - (۱) مجموعه A , ۴ عضو دارد.
 - (۲) $A \cap B = \{a, b\}$
 - (۳) مجموعه $A - A$, ۶ عضو دارد.
 - (۴) مجموعه $B - A$, ۴ زیرمجموعه دارد.

(متوسط - مفهومی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۴

اینو می دونیم که در یک مجموعه n عضوی تعداد زیرمجموعه ها برابر با 2^n هست. اینو گفتیم چون تو این سؤال لازمش داریم.



۱ مجموعه A , ۳ تا عضو داره $a, b, \{a, b\}$ پس تعداد عضوهای آن ۳ است پس گزینه ۱ نادرست است.

۲ اعضای مجموعه A برابر هست با $\{a, b\}$ و اعضای مجموعه B برابر هست با $\{a, b\}, c, d$. که عضو $\{a, b\}$ توی هر دوی اونا مشترکه پس مجموعه $A \cap B$ به صورت زیر نشون داده میشه پس این گزینه نادرست است.

$$A \cap B = \{\{a, b\}\}$$

۳ گفتیم اعضای مجموعه A برابر با $\{a, b, \{a, b\}, c, d, \{a, b\}, a, b, c, d\}$ و اعضای مجموعه B برابر هست با $\{a, b\}, c, d$ که اجتماع اونا میشه $\{a, b, c, d, \{a, b\}\}$ که تعداد اعضای اونا ۵ عضو. پس این گزینه غلط است.

۴ میشه هر چیزی که داخل B هست ولی داخل A نیست که میشه $B - A = \{c, d\}$ که دو عضو داره پس تعداد زیرمجموعه های اون میشه 2^2 که میشه ۴. پس مجموعه $B - A$, ۴ زیرمجموعه داره پس گزینه درست همینه.

گروه آموزشی ماز

- ۵ اگر $A_n = \left\{ x \in \mathbb{Z} \mid x \geq -n, x < 10 - \frac{n}{3} \right\}$ کند زیرمجموعه دارد؟
 - (۱) ۸
 - (۲) ۱۶
 - (۳) ۴
 - (۴) ۳۲

(متوسط - محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۱



توی این سؤال مجموعه A_n رو می خود به شرطی که اعضای این مجموعه عضو اعداد صحیح باشن و این که رابطه بین n (شماره جمله) و x به صورت

$$x \geq -n \quad x < 10 - \frac{n}{3}$$

به عنوان مثال اگه قرار باشه A_7 رو به دست بیاریم میشه:

$$A_7 = \left\{ x \in \mathbb{Z} \mid x \geq -7, x < 10 - \frac{7}{3} \right\} = \left\{ -7, -6, \dots, 6, 7 \right\}$$

و اگه بخوایم A_9 رو به دست بیاریم:

$$A_9 = \left\{ x \in \mathbb{Z} \mid x \geq -9, x < 10 - \frac{9}{3} \right\} = \left\{ -9, -8, \dots, 6 \right\}$$

که اشتراک A_7 و A_9 میشه:

$$A_7 \cap A_9 = \{-7, -6, \dots, 6\}$$

و حالا آگه بخوايم A_4 رو محاسبه کنیم میشه:


$$A_4 = \left\{ x \in \mathbb{Z} \mid x \geq -4, x < 10 - \frac{4}{3} \right\} = \left\{ -4, -3, \dots, 8 \right\}$$

$\frac{-3-4=26}{3}=8/\dots$

و حالا آگه بخوايم حاصل $(A_7 \cap A_9) - A_4$ رو به دست بیاریم میشه هرچی که داخل $A_7 \cap A_9$ هست ولی داخل A_4 نیست. یعنی اونایی که داخل $A_7 \cap A_9$ به جز اونایی که در A_4 هستن.

$$(A_7 \cap A_9) - A_4 = \{-7, -6, \dots, 4\} - \{-4, -3, \dots, 8\} = \{-7, -6, -5\}$$

که حتی آگه بخوايم روی شکل نشون بدیم که بهتر متوجه شید میشه:



که قسمت هاشور خورده میشه $(A_7 \cap A_9) - A_4$ که اعضای $-7, -6, -5$ داخل اون هستن که ۳ عضو هست.

پس تعداد زیرمجموعه ها میشه 3^3 که برابر ۲۷ میشه.

گروه آموزشی ماز

۶- کدام گزینه غلط است؟

$$\sqrt{2-\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2+\sqrt{3}}} \in \mathbb{Q}' \quad (4)$$

$$\cdot / 571 = \frac{283}{495} \quad (3)$$

$$(\sqrt{3}+1)^2 \in \mathbb{Q}' \quad (2)$$

$$\sqrt{75} \in \mathbb{Q}' \quad (1)$$

پاسخ: گزینه ۴



خب تو این سؤال باید گزینه نادرست رو انتخاب کنیم.



۱- می خوايم ببینیم آیا $\sqrt{75}$ عضو اعداد گنگه؟ بله. فقط جذر اعدادی که مربع كامل هستن گویاست مثل $2 = \sqrt{4} = \sqrt{121} = 11$ یا ... ولی جذر اعداد غیرمربع كامل گویا نیست، گنگه پس این گزینه صحیح هست.

۲- می دانیم طبق اتحاد مربع كامل $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$ هست، پس:

$$(\sqrt{3}+1)^2 = (\sqrt{3})^2 + 1^2 + 2(\sqrt{3})(1) = 3 + 1 + 2\sqrt{3} = 4 + 2\sqrt{3}$$

هست. $\sqrt{3}$ عددی گنگ هست پس $2\sqrt{3}$ هم عددی گنگ هست. که وقتی با عدد ۴ که عددی گویاست هم جمع میشه باز عددی گنگ باقی می مونه. (چون که مجموع و تفاضل یک عدد گویا و گنگ عددی گنگ هست).

اعداد متناوب:

اعداد متناوب به دو دسته تقسیم می شون اعداد متناوب ساده و اعداد متناوب مرکب.

متناوب ساده:

در این اعداد در تقسیم صورت بر مخرج یک یا چند رقم بعد از ممیز تکرار می شن و باقی مانده صفر نمیشه.

$$\frac{2}{3} = 0.6666$$

متناوب مرکب:

در این اعداد در تقسیم صورت بر مخرج عددی اعشاری به دست میاد که بعد از ممیز بعد از چند رقم غیرتکراری به رقم تکراری مرسیم.

۳

اگه بخوایم این عدد متناوب مرکب رو به صورت کسر بنویسیم به صورت زیر عمل می‌کنیم:

اگر به عنوان مثال عددی به صورت \overline{abc} در نظر بگیریم که به \overline{abc} ارقام گردشی می‌گوییم، برای تبدیل این مدل اعداد اعشاری به کسر متعارفی باید ارقام گردشی رو از کل ارقام گردشی و غیرگردشی کم کنیم و در صورت کسر قرار بدیم و در مخرج کسر با توجه به تعداد ارقام غیرگردشی صفر و بعد از آن به تعداد ارقام گردشی ۹ قرار می‌دهیم.

$$\therefore \overline{abc} = \frac{\overline{abc} - a}{990} = \frac{\text{اعدادی که دوره تناوب ندارند} - \text{کل ارقام}}{\text{به ازای اعداد دوره گردش دار (۹) و به ازای اعداد بدون گردش (۰) می‌گذاریم.}}$$

در این سؤال $\overline{571-5}$ رو می‌تونیم به صورت $\frac{571-5}{99}$ بنویسیم. پس:

$$\therefore \overline{571} = \frac{571-5}{990} = \frac{566}{990} = \frac{283}{495}$$

پس این گزینه درست است.

توی این گزینه می‌خوایم حاصل $\frac{1}{\sqrt{2+\sqrt{3}} - \sqrt{2-\sqrt{3}}}$ رو به دست بیاریم اول از همه کسر دوم رو گویا می‌کنیم. به این صورت که صورت و مخرج کسر رو در مزدوج مخرج ضرب می‌کنیم.

$$\frac{1}{\sqrt{2+\sqrt{3}}} \times \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{\sqrt{2-\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{\sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2}} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{\sqrt{4-3}} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{1} = \sqrt{2-\sqrt{3}}$$

و حالا حاصل کل عبارت رو می‌تونیم به دست بیاریم.

$$\sqrt{2-\sqrt{3}} - \sqrt{2-\sqrt{3}} = .$$

که عدد صفر عضو اعداد گویاست و گنگ نمی‌باشد پس این گزینه غلطه.

گروه آموزشی ماز

۷- اگر a و b به ترتیب اعدادی گویا و گنگ باشند، کدام عدد حتماً گنگ است؟

$$a(3b+a) \quad (4)$$

$$b^a \quad (3)$$

$$a+2b \quad (2)$$

$$\frac{a}{b} \quad (1)$$

۲

(متوسط - مفهومی - ۱۰۰۱)



صورت سؤال داره می‌گه a گویا و b گنگ هست و می‌خواهد بینه کدام عدد حتماً گنگه. یه یادآوری کوچولو داشته باشیم.

عمل جبری روی اعداد گویا و گنگ:

مجموع و تفاضل دو عدد گویا عددی گویا هست.

مجموع و تفاضل دو عدد گنگ ممکن است گنگ یا گویا باشد.

مجموع و تفاضل یک عدد گویا و گنگ عددی گنگ است.

ضرب و تقسیم دو عدد گویا عددی گویا هست البته به شرطی که مخرج صفر نباشد.

ضرب و تقسیم دو عدد گنگ ممکن است گنگ یا گویا باشد.

ضرب و تقسیم یک عدد گویا غیرصفر و گنگ عدد گنگ است.



۱

طبق موارد گفته شده حاصل تقسیم عدد گویا بر گنگ عدد گنگ است مگر این که عدد گویا برابر صفر باشد.

$$\frac{a = 0}{b = 0} = \frac{\text{گنگ}}{\text{گنگ}} = .$$

پس لزوماً این گزینه گنگ نمی‌باشد.

حاصل ضرب عدد گنگ در گویای غیرصفر عدد گنگ است پس وقتی b گنگ است $2b$ هم گنگ است.

و مجموع $2b$ (گنگ) با a (که گویا هست) طبق موارد گفته شده حتماً گنگ است پس این گزینه صحیح است.

اگر b عدد گنگ باشد مثل $\sqrt{2}$ یا $\sqrt{3}$ یا ... و a عدد زوجی مثل $2, 4, \dots$ باشه a^b عددی گویا هست. مثل $(\sqrt{2})^2$ یا $(\sqrt{3})^2$ که به ترتیب حاصل میشه

۲ یا ۹. پس این گزینه مثالی نقض دارد.

۴ b عددی گنگ است پس $3b$ نیز عددی گنگ است و مجموع $3b$ که عددی گنگ است با a که عددی گنگ است مجموع $3b+a$ گنگ است. پس $(3b+a)$ گنگ بوده و حاصل ضرب a در $3b+a$ مگر این که $=0$ باشد. پس $(3b+a)$ لزوماً گنگ نمی‌باشد.

گروه آموزشی ماز

-۸ اگر $\{x \in \mathbb{Z} | \frac{x}{3} \in \mathbb{Z}, x^2 < 40\}$ و $A = \{|2x| | x \in B\}$ کدام است؟

۳۶ (۴)

۱۸ (۳)

۱۲ (۲)

۱) صفر

(متوسط - محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۳



در این سؤال به دنبال حاصل جمع اعضای مجموعه A هستیم. مجموعه A برابر هست با قدر مطلق $|2x|$ (به شرطی که x عضو مجموعه B باشد). پس نیاز هست اول مجموعه B رو پیدا کنیم. حال مجموعه B چی هست؟ مجموعه B , x های عضو اعداد صحیح هستن به طوری که $\frac{x}{3} \in \mathbb{Z}$ (یعنی تقسیم x بر سه هم عضو اعداد صحیح باشه) و $x^2 < 40$ هم باشه.

به طور کلی می‌دانیم وقتی $x^2 < a$ هست پس $-\sqrt{a} < x < \sqrt{a}$ می‌شود. پس وقتی $x^2 < 40$ هست بازه x به صورت زیر تعیین می‌شود.

$$x^2 < 40 \Rightarrow x^2 < (\sqrt{40})^2 \Rightarrow -\sqrt{40} < x < \sqrt{40}.$$

حالا در این بازه x هایی رو می‌خوایم که اگر بر ۳ هم تقسیم کنیم عضو اعداد صحیح باشن (یعنی پس در واقع مضرب ۳ باشند) چه اعدادی هستن؟ تا اینجا $\sqrt{40} < x < \sqrt{40}$ - که از اون جایی که $\sqrt{40}$ حدوداً ... $/6$... $/4$... $/2$... $/1$... هست. که مضارب ۳ موجود در این بازه عبارتند از:

-۶, -۳, ۰, ۳, ۶

پس مجموعه B می‌شود $B = \{-6, -3, 0, 3, 6\}$ حالا به دنبال $|2x|$ هایی هستیم که x عضو مجموعه B باشه.

$$x = -6 \Rightarrow |2x| = |2 \times (-6)| = |-12| = 12$$

$$x = -3 \Rightarrow |2x| = |2 \times (-3)| = |-6| = 6$$

$$x = 0 \Rightarrow |2x| = |2 \times 0| = 0$$

$$x = 3 \Rightarrow |2x| = |2 \times 3| = 6$$

$$x = 6 \Rightarrow |2x| = |2 \times 6| = 12$$

$$+6 +12 = 18$$

پس مجموعه A برابر هست با: $A = \{0, 6, 12\}$ که مجموع این اعضا می‌شود:

-۹ مجموعه $(A-B)' \cap (A \cup B) \cap A'$ کدام است؟

A' (۴)

Ø (۳)

B (۲)


B-A (۱)

(متوسط - مفهومی/محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۱




استفاده از نمودار ون همون روشی است که تو حل خیلی از سوالات کمکمی کنند. توی این سؤال حاصل $(A-B)'$ را رو می‌خوایم که به صورت زیر می‌شود، اول حاصل $(A-B)'$ رو به دست می‌اریم.




هر چیزی که داخل A هست ولی داخل B نیست.

متام مجموعه $(A-B)'$




هر چیزی که داخل A و
داخل B هست

حال حاصل $(A \cup B)'$ رو روی نمودار نشون می‌دیم.



هر چیزی که داخل A نیست.

و A' هم طبق نمودار می‌شود:



حالا بین اشکال (I) و (II) و (III) اشتراک می‌گیریم.
که طبق شکل قسمت هاشورخورده به دست اومده $B - A$ هست.

- ۱۰- اگر مجموعه A، مجموعه B و اشتراک آن‌ها به ترتیب دارای ۵، ۶ و ۲ عضو باشند، مجموعه $(A \cap B)'$ دارای چند عضو است؟
- ۱۰ (۴) ۸ (۳) ۹ (۲) ۷ (۱)

(سخت - مفهومی/محاسباتی - ۱۰۵)

پاسخ: گزینه ۱



داره میگه اگه مجموعه A، ۵ عضو داشته باشه و مجموعه B، ۶ عضو داشته باشه و اشتراک اونا ۲ عضو داشته باشد مجموعه $(A \cap B)'$ چند عضو داره. این سؤال رو از دو روش حل می‌کنیم: هم روش جبر مجموعه‌ها و هم روش استفاده از نمودار و شکل.

راه حل:

برای حل این سؤال چند مورد نکته را باهم یادآوری می‌کنیم.

قوانين و اعمال بین مجموعه‌ها:
(۱) قانون دمورگان:

$$(A \cup B)' = A' \cap B' , (A \cap B)' = A' \cup B'$$

(۲) تفاضل دو مجموعه:

$$A - B = A \cap B' = A - (A \cap B)$$


پس در این سؤال:

$$\begin{aligned} (A \cap B)' \cup (A \cup B)' &\xrightarrow[\text{برای پرانتز دوم}]{\text{طبق قانون دمورگان}} (A \cap B') \cup (A' \cap B) \xrightarrow[A-B \Leftrightarrow A \cap B']{A-B=A-(A \cap B)} \\ (A - B) \cup (B - A) &\xrightarrow[B-A=B-(A \cap B)]{A-B=A-(A \cap B)} (A - (A \cap B)) \cup (B - (B \cap A)) \end{aligned}$$

$$\frac{n(A)=5, n(B)=6}{n(A \cap B)=2} \rightarrow (5-2)+(6-2)=3+4=7$$

پاسخ:

ابتدا مثل روش اول به این نتیجه می‌رسیم که $(A \cap B)' \cup (A \cup B)' = (A - B) \cup (B - A)$ هست.



قسمت هاشورخورده $(B - A) \cup (A - B)$ می‌باشد که تعداد اعضای آن برابر با $3+4=7$ هست.

۱۱- ۷ عضو جدید به مجموعه B اضافه می‌کنیم. اگر تعداد اعضای مجموعه $A \cap B$ ، یک عدد افزایش یابد، تعداد اعضای مجموعه $(A-B) \cup (B-A)$ چه تعداد افزایش می‌یابد؟

۷ (۴)

۵ (۳)

۶ (۲)



۴ (۱)

(متوسط - مفهومی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۲



توی این سؤال میگه با اضافه کردن ۷ عضو به مجموعه B ، تعداد اعضای مجموعه $A \cap B$ یک عدد زیاد میشه همان طوری که طبق شکل مشخص است B از $A \cap B$ و $B-A$ تشکیل شده است پس وقتی ۷ عضو جدید به B اضافه میشه و $A \cap B$ یک عدد زیاد میشه با توجه به این که $n(B) = n(B-A) + n(A \cap B)$ هست پس به $B-A$ شش عضو جدید اضافه میشه.



حالا می خواهد ببینه $(A-B) \cup (B-A)$ تعداد اعضایش چقدر زیاد میشه. اول از همه طبق این نکته که $B \cap A' = B-A$ هست پس به جای پرانتر دوم $B-A$ رو قرار می دیم و خواسته سؤال به فرم $(A-B) \cup (B-A)$ درمیاد. یعنی همان قسمت هاشور خورده. تغییری در تعداد اعضای قسمت $B-A$ ایجاد نشده ولی اعضای $B-A$ رو دیدیم که ۶ واحد زیاد شده پس در کل تعداد اعضای این قسمتها **۶ واحد** زیاد می شود.

گروه آموزشی ماز

۱۲- چه تعداد از مجموعه های زیر متناهی اند؟

الف: مجموعه اعداد گویای بازه $(1, 0)$

ب: مجموعه اعداد اول سه رقمی

پ: مجموعه سلول های تشکیل دهنده یک انسان

۱ صفر

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

پاسخ: گزینه ۳



در مجموعه الف در بازه $(0, 1)$ بیشمار عدد گویا وجود داره پس مجموعه ای نامتناهی هست. ولی اعداد اول سه رقمی تعدادشان مشخص و متناهی هستن و همین طور سلول های تشکیل دهنده انسان نیز متناهی هستند پس ۲ مورد متناهی و فقط یک مورد نامتناهی است.

گروه آموزشی ماز

۱۳- اگر $A_n = [-n^2, 10-n]$ باشد، مجموعه $A_2 - A_4 = (A_1 \cup A_4) - (A_2 \cup A_4)$ شامل چند عدد صحیح است؟

۱۱ (۴)

۱۴ (۳)

۱۲ (۲)

۱۳ (۱)

(متوسط - محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۱



در این سؤال مجموعه $A_n = [-n^2, 10-n]$ است که $-n^2$ -ابتدای بازه و $10-n$ -انتهای بازه هست و از ما حاصل $A_2 - A_4 = (A_1 \cup A_4) - (A_2 \cup A_4)$ رو می خواهد. سه مجموعه A_1 و A_2 و A_4 را می سازیم و سپس حاصل را به دست می آوریم.


$$A_1 = [-(1)^2, 10-1] = [-1, 9]$$

$$A_2 = [-(2)^2, 10-2] = [-4, 8]$$

$$A_4 = [-(4)^2, 10-4] = [-16, 6]$$

ابتدا اجتماع A_1 و A_4 رو حساب می کنیم و سپس A_2 رو از اون کم می کنیم. که اینجا برای درک بهتر شما از محور اعداد جهت نشان دادن مجموعه ها استفاده می کنیم.

$$\Rightarrow A_1 \cup A_4 = [-16, 9]$$



حال از این بازه مجموعه A_2 رو کم می‌کنیم.


$$(A_1 \cup A_4) - A_2 = [-16, -4] \cup [8, 9]$$



که اعداد صحیح این بازه‌ها عبارتند از $-5, -16, -15, \dots, -14$ و 9 که تعداد آن‌ها 13 عدد است.

گروه آموزشی ماز

۱۴- با توجه به شکل، قسمت رنگی نشان‌دهنده کدام مجموعه است؟



$$(B-C) \cap A \quad (1)$$

$$B \cup (A-C) \quad (2)$$

$$(B \cap C') - A \quad (3)$$

$$(B \cap C) - A \quad (4)$$

(متوسط - مفهومی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۳



قسمت نشون داده شده مجموعه B به جز هر چیزی که داخل A و C هست. یعنی $(B-C) - A$ را می‌توانیم به صورت $B \cap C' - A$ بنویسیم. پس شکل داده شده $A \cap C' - B$ نشون میده.

گروه آموزشی ماز

۱۵- اگر $A \subseteq B - C$ باشد، مجموعه $(A \cap B) \cap (C - A)$ با کدام گزینه برابر است؟

$$\emptyset \quad (4)$$


$$B \quad (3)$$

$$A \quad (2)$$

$$B - C \quad (1)$$

(متوسط - مفهومی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۴



تو این سؤال داره می‌گه اگر A زیرمجموعه $B - C$ باشه مجموعه $(A \cap B) \cap (C - A)$ کدام است؟

تو این سؤال بهتره که برای راحتی و این‌که سریع‌تر به جواب برسیم از نمودار ون استفاده کنیم.
ابتدا $C - B$ را مشخص می‌کنیم.


میشه همه عضوهای مجموعه اولی (B) به جز اونایی که با مجموعه دومی (یعنی C) مشترک هستن. حالا می‌خوایم که A زیرمجموعه این قسمت هاشور خود را باشه که در شکل مجموعه A رسم شده است.
خب حالا باید سراغ خواسته مسأله یعنی $(A \cap B) \cap (C - A)$ را از همه $A \cap B$ و به دست میاریم که طبق شکل مشخصه از اون جایی که A زیرمجموعه $B - C$ هست پس $A \cap B = A$ میشه. حالا باید سراغ $C - A$ و هیچ اشتراکی با هم ندارن پس $C - A = C$ برابر خود مجموعه C میشه. پس:

$$(A \cap B) \cap (C - A) = A \cap C = \emptyset$$

که چون A و C هیچ اشتراکی ندارن پس اشتراکشون تهی میشه.

گروه آموزشی ماز

۱۶- با توجه به شکل رو به رو، مجموع اعضای مجموعه $'B \cup (A \cap B)$ کدام است؟



$$52 \quad (1)$$

$$48 \quad (2)$$

$$36 \quad (3)$$

$$45 \quad (4)$$

(متوسط - مفهومی/محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۴



تو این سؤال حاصل $'B \cup (A \cap B)$ را می‌خواهد. اول از همه اشتراک A و B چی میشه؟ میشه هر چیزی که هم در A هست و هم در B پس طبق شکل میشه اعداد ۵ و ۹. حال مجموعه $'B$ چیه؟ میشه هر چیزی که داخل B نیست که طبق شکل میشه اعداد ۱، ۲، ۳، ۷، ۸، ۱۰. حال اجتنام این اعداد را می‌نویسیم که میشه:

$$\{1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10\}$$

که جمع اونا میشه:

$$1+2+3+5+7+8+9+10 = 45$$

۴۹۵

تبوی این روش یکی از خاصیت مجموعه ها قرار هست به ما کمک کنه که اونارو باهم مرور می کنیم:

خاصیت توزیع پذیری:



$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

پس در این سؤال:

$$(A \cap B) \cup B' = (B' \cup A) \cap (B' \cup B) \xrightarrow{B' \cup B = U}$$

$$(B' \cup A) \cap U = B' \cup A$$

که میشه اجتماع اعضای A و متمم B (یعنی هر چیزی که داخل B نیست).

$$A = \{5, 8, 9, 10\}$$

$$B' = \{1, 2, 3, 7, 8, 10\}$$

$$A \cup B' = \{1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10\}$$

که مجموع اونا میشه ۴۵.

گروه آموزشی ماز

۱۷ - مجموعه $\{A, \{a\}, \{a, a\}, \{a, a, a\}\}$ چند زیرمجموعه ناتهی دارد؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۱۵ (۱)

(متوسط - مفهومی - ۱۰۰۱)

۳



پاسخ: گزینه ۳

پاسخ شرحی:

خب اول از همه یه نکته رو مرور کنیم در مورد مجموعه ها:

وقتی می خوایم یک مجموعه رو نمایش بدیم از تکرار عضوهای یک مجموعه، مجموعه جدیدی ساخته نمیشه و با جایه جایی اعضای یک مجموعه هم مجموعه جدیدی ساخته نمیشه و ترتیب نوشتن عضوهای مجموعه هم مهم نیست.

پس از اون جایی که تکرار اضا اثری در ساختن یک مجموعه جدید نداره پس $\{a, a, a\}$ و $\{a, a\}$ با هم برابرین بنابراین مجموعه A فقط دو عضو داره یکی $\{a\}$ و دیگری a یعنی مجموعه A به صورت رو به رو هست:از طرفی اینو می دونیم تعداد زیرمجموعه های یک مجموعه n عضوی برابر 2^n هست پس تعداد زیرمجموعه های مجموعه A که دو عضو داره برابر هست با 2^2 که میشه ۴ که یکی از این زیرمجموعه ها تهی هست پس تعداد زیرمجموعه های غیر تهی میشه.

۱-۴ : تعداد زیرمجموعه های غیر تهی



گروه آموزشی ماز

۱۸ - اگر A زیرمجموعه ای متناهی و B زیرمجموعه ای نامتناهی از اعداد صحیح باشد، کدام گزینه صحیح است؟

(۱) B' متناهی است.(۲) اگر $C \subseteq B$ باشد، C نامتناهی است.(۳) اگر $A \subseteq C$ باشد، C نامتناهی است.(۴) اگر $C \cup D \subseteq A$ باشد، C متناهی است.

(متوسط - مفهومی - ۱۰۰۱)

۴



پاسخ: گزینه ۴

پادآوری:

 $A \subseteq B$

اگر داشته باشیم

(الف) اگر A نامتناهی باشه B هم نامتناهی هست.

(ب) اگر B متناهی باشه A هم متناهیه.

بررسی تزیینات:

۱

این گزینه لزوماً صحیح نیست.

وقتی B مجموعه‌ای متناهی است ممکن است C که زیرمجموعه آن است متناهی باشد و لزومی به نامتناهی بودن آن نیست پس این گزینه نادرست است.

۲) زیرمجموعه‌ای متناهی هست که زیرمجموعه C هست. مجموعه C هم می‌تواند متناهی باشد و هم نامتناهی پس این گزینه نادرست است.

طبق یادآوری بالا وقتی مجموعه‌ای متناهی داشته باشیم هر زیرمجموعه از آن نیز متناهی است پس وقتی A متناهی است زیرمجموعه آن یعنی $C \cap D$ هم متناهی و چون اجتماع C و D زیرمجموعه A هست، خود C و D نیز زیرمجموعه A هست و باید طبق موارد گفته شده متناهی هم باشند. پس این گزینه درست است و C متناهی است.

گروه آموزشی ماز

$$-19) \text{ اگر } \{C \in U \mid a^3 + b^3 = c^3, a, b \in U\} \text{ باشد، مجموعه } U \cap C' \text{ چند عضو دارد؟}$$

۸ (۴)

۷ (۳)

۹ (۲)

۶ (۱)

(متوسط - محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۴



مجموعه C اعدادی است که عضو مجموعه U که به صورت $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$ هستن به شرطی که برای اعداد a, b که خودشان هم عضو مجموعه U هستن $a^3 + b^3 = c^3$ باشند. که رابطه $c^3 = a^3 + b^3$ در واقع میشه بگیم شکلی از همون رابطه فیثاغورس هست.

مشهورترین اعدادی که می‌شناختیم در رابطه فیثاغورس صدق کنن چیا بودن؟ ۳، ۴، ۵ یعنی اینکه

$$3^3 + 4^3 = 5^3 \Rightarrow 9 + 16 = 25 \quad \checkmark \quad \text{پس در } a^3 + b^3 = c^3 \text{ صدق می‌کنند} \Rightarrow$$

این رابطه برای تمام مضارب اعداد ۳ و ۴ و ۵ نیز برقرار است. مضارب ۲ این اعداد چیا هستن؟

$$\begin{array}{c} 2 \times 3 \\ \hline 6 \end{array} \quad \begin{array}{c} 2 \times 4 \\ \hline 8 \end{array} \quad \begin{array}{c} 2 \times 5 \\ \hline 10 \end{array}$$

اول از همه باید چک کنیم اعداد ۶ و ۸ و ۱۰ در مجموعه U باشن که هستن. حالا باز جهت اطمینان چک می‌کنیم که داخل عبارت $a^3 + b^3 = c^3$ صدق کنن که $10^3 = 10^3 + 8^3 = 10^3 + 6^3 + 4^3 = 1000 + 512 + 64 = 1576$ میشه چرا که ۱۰۰۰ میشه پس a و b و c این اعداد ۶ و ۸ و ۱۰ میتونن باشن. حالا باید بینیم وضعیت مضارب ۳ اعداد ۳، ۴، ۵ چی هست؟

$$\begin{array}{c} 3 \times 3 \\ \hline 9 \end{array} \quad \begin{array}{c} 3 \times 4 \\ \hline 12 \end{array} \quad \begin{array}{c} 3 \times 5 \\ \hline 15 \end{array}$$

که اعداد ۱۲ و ۱۵ در مجموعه U نیستن در صورتی که می‌خواستیم هر سه عدد یعنی a و b و c که اینجا ۹ و ۱۲ و ۱۵ هستن در مجموعه U باشن اما اعداد ۱۲ و ۱۵ اون در مجموعه U نیستن.

پس فقط اعداد $3^3 + 4^3 = 5^3$ و $3^3 + 5^3 = 6^3$ و $4^3 + 5^3 = 7^3$ رو می‌تونیم به دست بیاریم. پس مجموعه $C = U \cap C'$ به صورت $\{5, 10\}$ هست. حالا ما دنبال مجموعه $U \cap C'$ هستیم.

$$U - C = \{1, 2, 3, \dots, 10\} - \{5, 10\} = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$$

پس $U - C$ عضو داره.

گروه آموزشی ماز

$$-20) \text{ مجموعه } A = \{19, 20, 21, \dots, 26\} \text{ چند زیرمجموعه ۷ عضوی دارد؟}$$

۶ (۴)

۹ (۳)

۸ (۲)

۷ (۱)

(متوسط - مفهومی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۲



مجموعه A دارای اعضای $19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26$ هست یعنی ۸ عضو داره. حالا می‌خوایم این مجموعه ۸ عضوی تعداد زیرمجموعه‌های ۷ عضوی رو به دست بیاریم.

اگر در هر یک از این ۸ عضو یک عضو را کنار بگذاریم می‌تونیم یک زیرمجموعه ۷ عضوی بسازیم. پس هر کدام از این ۸ عدد رو برای ساختن زیرمجموعه ۷ عضوی می‌تونیم حذف کنیم. پس ۸ زیرمجموعه ۷ عضوی می‌تونان ساخت.

گروه آموزشی ماز

-21) نقطه A روی خط d قرار دارد. چند نقطه در صفحه می‌توان یافت که به فاصله برابر ۵ واحد از نقطه A و خط d باشند؟

۴ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

(هیچ

(متوسط - محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۳




تسیم‌های هندسی:

- ۱) مجموعه نقاطی از صفحه که از نقطه A در آن صفحه به فاصله ثابت k قرار داشته باشند، دایره‌ای است به مرکز A و شعاع k .
- ۲) مجموعه نقاطی از صفحه که از خط d در آن صفحه به فاصله ثابت k قرار داشته باشند، دو خط موازی با d در طرفین آن و به فاصله k از آن است.

پاسخ شریحی:

نقاطی از صفحه که از نقطه A به فاصله ۵ واحد باشند، روی دایره‌ای مانند C به مرکز A و شعاع ۵ واحد قرار دارند. از طرفی، نقاطی از صفحه که از خط d به فاصله ۵ واحد باشند، روی دو خط موازی با d ، مانند d_1 و d_2 در طرفین آن و به فاصله ۵ واحد از d قرار دارند. مطابق شکل خطوط d_1 و d_2 به ترتیب در نقاط M و N بر دایرة C مماس‌اند و این دو نقطه همان نقاط موردنظر هستند.



گروه آموزشی ماز


- ۲۲- دو خط متقاطع d_1 و d_2 در صفحه مفروض‌اند. چند نقطه در صفحه وجود دارد که از خط d_1 به فاصله ۱ واحد و از خط d_2 به فاصله ۲ واحد باشند؟
- ۴) ۴ ۳) ۳ ۲) ۲ ۱) هیچ

(آسان - محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۴

پاسخ شریحی:

مطابق شکل، مجموعه نقاطی از صفحه که از خط d_1 به فاصله ۱ واحد باشند، خطوط L_1 و L'_1 موازی با خط d_1 و در طرفین آن به فاصله ۱ک واحد از d_1 هستند و به طور مشابه مجموعه نقاطی از صفحه که از خط d_2 به فاصله ۲ واحد باشند، خطوط L_2 و L'_2 موازی با خط d_2 و در طرفین آن به فاصله ۲ واحد از d_2 هستند. این دو دسته خط در ۴ نقطه M، N، P و Q یکدیگر را قطع می‌کنند، پس ۴ نقطه با ویژگی مورد نظر وجود دارد.



گروه آموزشی ماز

- ۲۳- چند لوزی متمایز می‌توان رسم کرد که طول هر ضلع آن ۶ و طول یکی از قطرهای آن ۸ باشد؟
- ۴) بی‌شمار ۳) ۳ ۲) ۲ ۱) هیچ


(متوسط - محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۲

پاسخ شریحی:

مطابق شکل، لوزی ABCD را در نظر بگیرید که طول اضلاع آن، برابر ۶ و طول قطر AC در آن برابر ۸ باشد. در مثلث قائم‌الزاویه $\triangle OAB$ طبق قضیه فیثاغورس داریم:

$$OB^2 = AB^2 - OA^2 = 36 - 16 = 20 \Rightarrow OB = 2\sqrt{5}$$


طول قطر BD دو برابر طول OB یعنی برابر $4\sqrt{5}$ است.حال با داشتن طول قطرهای لوزی که برابر $4\sqrt{5}$ و ۸ هستند، لوزی به طور منحصر به فرد قابل رسم است.

گروه آموزشی ماز

- ۲۴- در رسم خطی موازی با یک خط مفروض از نقطه‌ای غیرواقع بر آن، کدام‌یک از موارد زیر استفاده نمی‌شود؟
- ۱) دو خط موازی با یک خط، با هم موازی‌اند.
 ۲) در یک صفحه، دو خط عمود بر یک خط، با هم موازی‌اند.
 ۳) در یک نقطه واقع بر یک خط، می‌توان خطی غیرواقع عمود بر آن رسم کرد. ۴) از یک نقطه غیرواقع بر یک خط، می‌توان خطی عمود بر آن رسم کرد.

(متوسط - محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۱

مطابق شکل، خط d و نقطه A غیرواقع بر آن را در یک صفحه در نظر می‌گیریم:ابتدا از نقطه A ، خطی مانند d_1 عمود بر d رسم می‌کنیم و نقطه تقاطع را H می‌نامیم. (گزینه ۴)سپس در نقطه A ، خطی مانند d_2 را عمود بر d_1 رسم می‌کنیم. (گزینه ۳)دو خط d و d_2 هر دو بر خط d_1 عمود هستند، پس موازی یکدیگرند. (گزینه ۲)

گروه آموزشی ماز

- ۲۵ - مثلثی به طول اضلاع $4x - 4$ ، $4x + 5$ و 6 قابل رسم است. بزرگ‌ترین عدد طبیعی ممکن برای محیط چنین مثلثی کدام است؟

۳۲ (۴)


۳۱ (۳)

۳۰ (۲)

۲۷ (۱)

(متوسط - محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۳



$$\begin{cases} a < b + c \\ b < a + c \\ c < a + b \end{cases}$$

در یک مثلث، طول هر ضلع از مجموع طول دو ضلع دیگر کوچکتر است.



مجموع طول هر دو ضلع در این مثلث از طول ضلع سوم بزرگ‌تر است. پس داریم:

$$\begin{cases} (4x - 4) + (x + 5) > 6 \Rightarrow 5x > 5 \Rightarrow x > 1 \\ (4x - 4) + 6 > x + 5 \Rightarrow 3x > 3 \Rightarrow x > 1 \\ (x + 5) + 6 > 4x - 4 \Rightarrow 3x < 15 \Rightarrow x < 5 \end{cases}$$

از طرفی، طول هر ضلع عددی مثبت است. پس داریم:

$$4x - 4 > 0 \Rightarrow x > 1$$

$$x + 5 > 0 \Rightarrow x > -5$$

بنابراین $5 < x < 1$ است.

$$4x - 4 = (4x - 4) + (x + 5) + 6 = 5x + 7 \quad \text{محیط مثلث}$$

$$1 < x < 5 \Rightarrow 5 < 5x < 25 \Rightarrow 12 < 5x + 7 < 32$$


بنابراین، حداقل مقدار طبیعی ممکن برای محیط چنین مثلثی برابر ۳۱ است.

گروه آموزشی ماز

- ۲۶ - در مثلث $\triangle ABC$ ، نقاط M و N به ترتیب روی اضلاع AB و AC به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که $AM = AN$ است. اگر P نقطه‌ای درون مثلث، $PN \perp AC$ و $PM \perp AB$ باشد، نقطه P همواره روی کدام یک از خطوط زیر واقع است؟۱) ارتفاع نظیر رأس A ۲) نیمساز داخلی زاویه A ۳) عمودمنصف ضلع BC ۴) میانه نظیر رأس A

(آسان - محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۴

مطابق شکل برای دو مثلث $\triangle NP$ و $\triangle AMP$ داریم:

$$\left. \begin{array}{l} AM = AN \\ \hat{M} = \hat{N} = 90^\circ \\ AP = AP \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{(وترا و یک ضلع)}} \triangle AMP \cong \triangle NP \Rightarrow \hat{A}_1 = \hat{A}_2$$

بنابراین، نقطه P همواره روی نیمساز داخلی زاویه A قرار دارد.

۲۷- خط d و نقاط A و B در یک صفحه مفروض‌اند. در کدام حالت زیر نقطه‌ای روی خط d وجود ندارد که از A و B به یک فاصله باشد؟

- (۱) خط d موازی پاره‌خط AB باشد.
- (۲) خط d عمودمنصف پاره‌خط AB باشد.
- (۳) خط d پاره‌خط AB را قطع کند و بر آن عمود نباشد.
- (۴) خط d امتداد پاره‌خط AB را قطع کند و بر آن عمود باشد.

(متوسط - مفهومی - ۱۰۰)


پاسخ: گزینه ۴



عمودمنصف:

مجموعه نقاطی از صفحه که از دو نقطه A و B به یک فاصله باشند، عمودمنصف پاره‌خط AB است.

با توجه به اینکه نقاطی از صفحه که از دو نقطه A و B به یک فاصله باشند، روی عمودمنصف پاره‌خط AB قرار دارند، با بررسی گزینه‌ها مشخص می‌کنیم در کدام حالت، خط d و عمودمنصف پاره‌خط AB نقطه مشترکی ندارند.

گزینه ۱) نقطه M روی d از A و B به یک فاصله است.گزینه ۲) تمام نقاط روی d از A و B به یک فاصله است.گزینه ۳) نقطه M روی d از A و B به یک فاصله است.گزینه ۴) خط d عمودمنصف AB را قطع نمی‌کند.

۲۸- در ذوزنقه $ABCD$ ، نیمسازهای دو زاویه A و D یکدیگر را در نقطه O قطع کرده‌اند. اگر طول ارتفاع ذوزنقه برابر ۱۲ باشد، فاصله نقطه O از ساق AD کدام است؟

۴

۶

۸

۹

(متوسط - مفهومی/محاسباتی - ۱۰۰)


پاسخ: گزینه ۳



ویگ نیمساز:



هر نقطه واقع بر نیمساز یک زاویه، از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است.

 $OK = OH \quad (1)$ مطابق شکل، نقطه O روی نیمساز زاویه A قرار دارد، یعنی نقطه O از دو ضلع AB و AD به یک فاصله است، پس داریم: $OK = OH' \quad (2)$ همچنین نقطه O روی نیمساز زاویه D واقع است، یعنی نقطه O از دو ضلع AD و DC به یک فاصله است، پس داریم: $(1), (2) \Rightarrow 2OK = OH + OH' = HH'$ (ارتفاع ذوزنقه) $\Rightarrow 2OK = 12 \Rightarrow OK = 6$

گروه آموزشی ماز

۲۹- در مثلث $\triangle ABC$ ، $\hat{A} = 40^\circ$ است. اگر عمودمنصفهای اضلاع AB و AC یکدیگر را در نقطه O قطع کنند، اندازه زاویه $B\hat{O}C$ چند درجه است؟

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

(متوجه - مفهومی/محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۲



ویژگی عمودمنصف:

هر نقطهٔ واقع بر عمودمنصف یک پارهخط، از دو سر آن پارهخط به یک فاصله است.


مطابق شکل، فرض کنید عمودمنصفهای دو ضلع AB و AC ، یکدیگر را در نقطه O قطع کنند، در این صورت:

$$\triangle OAB : OA = OB \Rightarrow \hat{A}_1 = \hat{B}_1 \quad (۱)$$

$$\triangle OAC : OA = OC \Rightarrow \hat{A}_2 = \hat{C}_1 \quad (۲)$$

$$\triangle OAB : \hat{O}_1 = \hat{A}_1 + \hat{B}_1 \xrightarrow{(۱)} \hat{O}_1 = 2\hat{A}_1 \quad \text{زاویه خارجی است:} \quad \left. \begin{array}{l} \hat{O}_1 + \hat{O}_2 = 2(\hat{A}_1 + \hat{A}_2) \\ \Rightarrow \hat{O}_1 + \hat{O}_2 = 2\hat{A} = 2 \times 40^\circ = 80^\circ \end{array} \right\}$$

$$\triangle OAC : \hat{O}_2 = \hat{A}_2 + \hat{C}_1 \xrightarrow{(۲)} \hat{O}_2 = 2\hat{A}_2 \quad \text{زاویه خارجی است:}$$



گروه آموزشی ماز

۳۰- چند مثلث متمایز $\triangle ABC$ می‌توان رسم کرد که در آن $AC = 5$ ، $BC = 6$ و مساحت مثلث برابر $S = 18$ باشد؟

(۴)


(۳)

(۲)

(۱) هیچ

(متوجه - مفهومی/محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۱



$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AH \times BC$$

(۱) اگر AH ارتفاع نظیر رأس A در مثلث $\triangle ABC$ باشد، آن‌گاه داریم:(۲) فرض کنید نقطه A خارج از d باشد، در این صورت، کمترین فاصله نقاط واقع بر خط d از نقطه A ، برابر طول عمودی است که از A بر d رسم می‌شود. بنابراین در مثلث $\triangle ABC$ ، اگر AH ارتفاع نظیر رأس A باشد، آن‌گاه $AH \leq AB$ و $AH \leq AC$ است.فرض کنید AH ارتفاع رسم شده از رأس A باشد، در این صورت داریم:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AH \times BC \Rightarrow 18 = \frac{1}{2} AH \times 6 \Rightarrow AH = 6$$

مقدار به دست آمده برای ارتفاع از طول ضلع AC بیشتر است، پس چنین مثلثی وجود ندارد و قابل رسم نیست.

گروه آموزشی ماز

۳۱ - در میان مدل‌های اتمی، مدل «ابر الکترونی» مربوط به کدام دانشمند است؟

(۳) شروینگر


(۲) بور

(۱) تامسون

پاسخ: گزینه ۳ (آسان - حفظی - ۱۰۵)



سیر تکامل مدل‌های اتمی



سیر تکامل و اصلاح مدل‌های اتمی در طول زمان توسط دانشمندان مختلف در شکل رو به رو نشان داده شده است.

توصیه می‌کنیم ترتیب و توالی آنها و نیز نام مدل اتمی مربوط به هر دانشمند را حفظ کنید.



گزینه ۳ درست است. مدل اتمی ابرالکترونی مربوط به شروعینگر است.

گروه آموزشی ماز

۳۲ - کدام یک از گزاره‌های زیر درست است؟

الف: ویزگی آزمون پذیری و اصلاح نظریات فیزیکی نقطه قوت دانش فیزیک است.

ب: دانشمندان برای توصیف و توضیح پدیده‌های مورد بررسی از آزمایش نمودن آنها استفاده می‌کنند.

پ: در طول تاریخ، قوانین و نظریات فیزیک گاهی دست‌خوش تغییر و گاه نقض و نظریه جدیدی جایگزین آن شده است.

(۴) هر سه مورد

(۳) «ب» و «پ»

(۲) «الف» و «ب»

(۱) «الف» و «ب»

پاسخ: گزینه ۲ (آسان - حفظی - ۱۰۵)



پدیده‌های فیزیک

در فیزیک دانشمندان برای توصیف و توضیح پدیده‌های مورد بررسی اغلب از قانون، مدل و نظریه استفاده می‌کنند. قوانین و نظریه‌های فیزیک در طول زمان ثابت نیستند و ممکن است دچار اصلاح گرددن و یا به طور کامل نقض شود و نظریه دیگری جایگزین شود.

این ویزگی آزمون پذیری و اصلاح نظریات فیزیکی از نقاط قوت دانش فیزیک است.



باتوجه به موارد ذکر شده در درسنامه، موارد «الف» و «پ» درست هستند.

گروه آموزشی ماز

۳۳ - اگر فاصله زمین تا خورشید را که معادل 1.5×10^{11} متر است، یکای نجومی در نظر بگیریم و هر سال نوری معادل 1.45×10^{12} کیلومتر فرض شود، فاصله ستاره‌ای که تا زمین چهار سال نوری است، معادل چند یکای نجومی است؟

(۴) 1.0×10^5

(۳) 1.0×10^5

(۲) 1.0×10^5

(۱) 1.0×10^5

پاسخ: گزینه ۳ (آسان - محاسباتی - ۱۰۵)



سال نوری و یکای نجومی

یکای نجومی (AU): میانگین فاصله زمین تا خورشید است، که تقریباً ۱۵۰ میلیون کیلومتر است.

$$1AU = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$$

ثُندی نور در خلاء تقریباً $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ است.

سال نوری: مسافتی است که نور در مدت یک سال در خلاء می‌پیماید و آن را با Ly (light year) نشان می‌دهند.



به کمک روش زنجیره‌ای فاصله را برحسب یکای نجومی به دست می‌آوریم:

$$d = f_{Ly} \times \frac{9/45 \times 10^{12} \text{ km}}{1 \text{ Ly}} \times \frac{1.0^3 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \frac{1 \text{ Au}}{1/5 \times 10^{11} \text{ m}} = 2/52 \times 10^5 \text{ Au}$$

یکای نجومی: Au و سال نوری: Ly

۳۴ - در کدام گزینه، همه کمیت‌ها اصلی و نرده‌ای هستند؟

- (۲) تندی - جرم - جریان الکتریکی
(۴) زمان - دما - جابه‌جایی

- (۱) مسافت - نیرو - زمان
(۳) جریان الکتریکی - جرم - زمان

پاسخ: گزینه ۳ (متوسط - مفهومی و حفظی - ۱۰۰)



کمیت‌ها

کمیت‌ها
۱. کمیت‌های نرده‌ای: برای بیان این کمیت‌ها ذکر عدد و یکا کافی است.
۲. کمیت‌های برداری: برای بیان این کمیت‌ها علاوه بر عدد و یکا، جهت آن هم نیاز است.

کمیت‌ها
۱. اصلی: هفت کمیت که اساس دستگاه بین‌المللی را تشکیل می‌دهند و مستقل از یکدیگرند.
۲. فرعی: کمیت‌هایی که یکای آن‌ها بر حسب یکاهای دیگر و روابط ریاضی نوشته می‌شود و مستقل از یکدیگر نیستند.

یکای فرعی	کمیت فرعی	یکا	کمیت اصلی
m/s	تندی	متر (m)	طول
m/s^2	شتاب	کیلوگرم (kg)	جرم
		ثانیه (s)	زمان
		کلوین (K)	دما
		مول (mol)	مقدار ماده
		آمپر (A)	جریان الکتریکی
		شماع (cd)	شدت روشنایی

بررسی سایر نزدیکی‌ها:

در هر گزینه مواردی که متناقض با خواسته سؤال هستند را بررسی می‌کنیم:

۱ نیرو: فرعی - برداری

۲ تندی: فرعی - نرده‌ای

۳ جابه‌جایی: اصلی - برداری

مابقی کمیت‌های ذکر شده در گزینه‌ها، همگی اصلی و نرده‌ای هستند.

● گروه آموزشی ماز ●

۳۵ - یکاهایی که برای انجام اندازه‌گیری درست و قابل اطمینان نیاز داریم باید دارای چند مورد از ویژگی‌های زیر باشند؟

الف: اصلی باشند.

ب: تغییر نکنند.

پ: جزو مجموعه یکاهای SI باشند.

ت: دارای قابلیت باز تولید در مکان‌های مختلف باشند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

پاسخ: گزینه ۲ (آسان - مفهومی - ۱۰۰)



یکا

برای انجام یک اندازه‌گیری درست و قابل اطمینان، به یکاهایی نیاز داریم که تغییر نکنند و دارای قابلیت باز تولید در مکان‌های مختلف باشند.

پاسخ شریعه:

طبق نکته ذکر شده در درسنامه فقط موارد «ب» و «ت» (یعنی ۲ مورد) درست است.

● گروه آموزشی ماز ●

-۳۶- آخرین توافق انجام شده برای یکاهای در کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست بیان شده است؟

(۱) طول: مسافت طی شده توسط نور در یک زمان معین

(۲) زمان: $\frac{1}{86400}$ میانگین روز خورشیدی

(۳) جرم: جرم استوانه‌ای فلزی از جنس آلیاژ پلاتین - ایریدیوم

(۴) جرم: یکای جرم در SI معادل kg است.

پاسخ: گزینه ۲ (آسان - حفظی - ۱۰۰۱)



یکای سه‌کمیت طول، زمان و جرم از لحاظ تاریخی به شرح زیر است:

طول: تعریف اسبق: یکای طول به صورت یک ده میلیون فاصله استوا تا قطب شمال تعریف شده است. تعریف سابق: فاصله میان دو خط حکاکی شده در نزدیکی دو میله‌ای از جنس پلاتین - ایریدیوم وقتی میله در دمای 0°C است، برابر یک متر است. تعریف اخیر: یک متر برابر است با مسافتی که نور در مدت زمان معینی در خلاً طی می‌کند. (این تعریف طبق آخرین توافق جهانی است.)

زمان: تعریف اولیه: یکای زمان به صورت $\frac{1}{86400}$ میانگین روز خورشیدی تعریف می‌شده است. تعریف اخیر: زمان براساس دقت بسیار زیاد ساعت‌های اتمی تعریف شده است. (این تعریف طبق آخرین توافق جهانی است.)

جرم: یکای جرم در SI معادل kg است که برابر با جرم یک استوانه فلزی از جنس آلیاژ پلاتین - ایریدیوم می‌باشد که در موزه‌ای در فرانسه نگهداری می‌گردد.



براساس مطالب ذکر شده در درسنامه، آخرین یکای توافق شده برای زمان براساس دقت بسیار بالای ساعت‌های اتمی درنظر گرفته شده است.

● گروه آموزشی ماز ●

-۳۷- اتومبیل از شهر A به شهر B بدون توقف درحال حرکت است. در مدل‌سازی حرکت این اتومبیل، کدام مورد نادرست است؟

(۱) اتومبیل را به صورت ذره فرض می‌کنیم.

(۲) از جرم اتومبیل و سرنشینان آن صرف نظر می‌کنیم.

(۳) از مساحت سطح لاستیک اتومبیل صرف نظر می‌کنیم.

(۴) از حرکت دورانی چرخ‌ها صرف نظر کرده و فقط انتقالی درنظر می‌گیریم.

پاسخ: گزینه ۲ (آسان - مفهومی - ۱۰۰۱)



مدل‌سازی

در مدل‌سازی یک پدیده فقط می‌توان اثرات جزئی را نادیده گرفت و صرف نظر از اثرات کلی و تأثیرگذار می‌تواند درنتیجه مدل‌سازی اثرگذار باشد.




در گزینه ۲، جرم اتومبیل و جرم سرنشینان اثر جزئی نیست و اثر مهمی در تحلیل و بررسی مسئله می‌گذارد، پس نمی‌توان چنین اثری را نادیده گرفت.

● گروه آموزشی ماز ●

-۳۸- اگر شعاع یک استوانه فلزی $2 \times 10^5 \mu\text{m}$ و حجم آن $48 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ باشد، ارتفاع آن چند دکامتر است؟ ($\pi = 3$)

$$\text{ارتفاع} = \frac{\text{حجم}}{\text{شعاع}^2} = \frac{48 \times 10^{-3}}{(2 \times 10^5)^2} = 0.0004 \text{ دکامتر}$$

پاسخ: گزینه ۳ (سخت - محاسباتی - ۱۰۰۱)



تبديل يك

برخی ضرایب مربوط به پیشووند یکاهای در جدول مقابل بیان شده است. آنها را به ذهن بسپارید و در مسائل از آنها استفاده نمائید. برای تبدیل یکاهای به روش زنجیره‌ای باید از ضرب و تقسیم استفاده کرد. مثال:

$$400 \text{ mm} = ? \text{ m}$$

$$400 \text{ mm} \times \frac{10^{-3} \text{ m}}{1 \text{ mm}} = 400 \times 10^{-3} = 0.4 \text{ m}$$



نکته:

به تعداد تبدیل واحدهای لازم از همان تعداد کسر ضرب تبدیل استفاده می‌کنیم.

p	پیکو	10^{-12}	T	ترا	10^{12}
n	نانو	10^{-9}	G	گیگا(جیگا)	10^9
μ	میکرو	10^{-6}	M	ماکا	10^6
m	میلی	10^{-3}	k	کیلو	10^3
c	سانتی	10^{-2}	h	هکتو	10^2
d	دسی	10^{-1}	da	دکا	10^1

مثال: 

$$200 \text{ nm} = ? \text{ km}$$

$$200 \text{ nm} \times \frac{10^{-9} \text{ m}}{1 \text{ nm}} \times \frac{1 \text{ km}}{10^3 \text{ m}} = 2 \times 10^{-11} \text{ km}$$

مثال: 

$$\frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ چند } \frac{\text{km}}{\text{h}} \text{ است؟}$$

$$36 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{10^3 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \frac{1 \text{ s}}{3600 \text{ s}} = 1 \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

پاسخ‌شیرینی:

می‌دانیم حجم یک استوانه از رابطه $V = \pi r^2 h$ بدست می‌آید که r بیان‌گر شعاع و h بیان‌گر ارتفاع استوانه است. ابتدا شعاع قاعده را بر حسب m و حجم استوانه را به m^3 تبدیل کرده و سپس از رابطه حجم، ارتفاع را بر حسب m بدست می‌آوریم و درنهایت آن را به دکامتر تبدیل می‌کنیم:

$$r = 2 \times 10^5 \mu\text{m} \times \frac{10^{-6} \text{ m}}{1 \mu\text{m}} = 2 \times 10^{-1} \text{ m}$$

$$V = 48 \times 10^{-3} \text{ Gm}^3 \times \frac{10^{27} \text{ m}^3}{1 \text{ Gm}^3} = 48 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$V = \pi r^2 h \Rightarrow 48 \times 10^{-3} = 3 \times (2 \times 10^{-1})^2 \times h \Rightarrow h = 4 \times 10^{-1} \text{ m} \times \frac{1 \text{ dam}}{10^1 \text{ m}} \rightarrow h = 0.4 \text{ dam}$$

توجه: از نظر یکایی می‌توانستیم شعاع را از μm به dam و نیز حجم را از Gm^3 به dam^3 تبدیل کنیم و سپس مقادیر را در رابطه حجم قرار دهیم. در این صورت ارتفاع استوانه مستقیماً بر حسب dam بدست می‌آمد. اگرچه که این روش مقداری طولانی‌تر از روش فوق است.

● گروه آموزشی ماز ●

$$\frac{0.5 \times 10^{-4} \text{ Mm} + 0.4 \times 10^{15} \text{ pm}}{0.2 \text{ min} + 1.8 \times 10^7 \mu\text{s}} \text{ در SI کدام است؟}$$

۱۵ (۴)

۳۰ (۳)

۳۲ (۲)

۱/۵ (۱)

پاسخ: گزینه ۴ (سخت - محاسباتی - ۱۰۰)

نکته: 

دو یا چند عبارت را در فیزیک زمانی می‌توان با یکدیگر جمع و تفربیق کرد که حتماً یکا و نیز پیشوند یکای آنها مشابه هم باشند.

مثال: 

حاصل جمع ۴ میکرومتر و ۶ پیکومتر چند نانومتر است؟

پاسخ: برای جمع پذیر شدن دو عدد باقیستی هر دو را به نانومتر تبدیل کنیم:

$$4 \mu\text{m} \times \frac{10^{-6} \text{ m}}{1 \mu\text{m}} \times \frac{1 \text{ nm}}{10^{-9} \text{ m}} = 4000 \text{ nm}$$

جمع $\rightarrow 4000 \text{ nm} + 0.6 \text{ nm} = 4000.6 \text{ nm} = 4.0006 \text{ nm}$

$$600 \cdot \text{pm} \times \frac{10^{-12} \text{ m}}{1 \text{ pm}} \times \frac{1 \text{ nm}}{10^{-9} \text{ m}} = 0.6 \text{ nm}$$

پاسخ‌شیرینی:

برای یافتن حاصل کسر در SI، دو جمله موجود در صورت کسر را به متر و جملات مخرج کسر را به ثانیه تبدیل می‌کنیم:

$$0.5 \times 10^{-4} \text{ Mm} \times \frac{10^6 \text{ m}}{1 \text{ Mm}} = 5 \cdot \text{m}$$

$$0.4 \times 10^{15} \text{ pm} \times \frac{10^{-12} \text{ m}}{1 \text{ pm}} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$0.2 \text{ min} \times \frac{6 \cdot \text{s}}{1 \text{ min}} = 12 \text{ s}$$

$$1/8 \times 10^{-9} \mu\text{s} \times \frac{10^{-9} \text{s}}{\mu\text{s}} = 1 \text{s}$$

$$\frac{0.5 \times 10^{-4} \text{ Mm} + 0.4 \times 10^{-15} \text{ pm}}{0.2 \text{ min} + 1/8 \times 10^{-9} \mu\text{s}} = \frac{0.5 \cdot \text{m} + 0.4 \cdot \text{m}}{12\text{s} + 18\text{s}} = \frac{0.9 \cdot \text{m}}{30\text{s}} = 0.03 \text{ m/s}$$

گروه آموزشی ماز

۴۰ - کدام یک از گزینه‌های زیر از بقیه بزرگتر است؟ (۱) $\text{Ly} = 9 \times 10^{15} \text{ m}$ ، (۲) $5\text{cm} = 2/5\text{m}$ ، (۳) $12\text{in} = 1/\text{ft}$ ، (۴) $1\text{in} = 1/\text{m}$

$$2 \times 10^{-1} \text{ hin}$$

$$2 \times 10^{-10} \mu\text{Ly}$$

$$0.4 \times 10^7 \text{ ft}$$

$$0.3 \times 10^3 \text{ ذرع}$$

پاسخ: گزینه ۳ (متوسط - محاسباتی - ۱۰۵)

نکته:

برای مقایسه دو یا چند عدد الزاماً باید یکا و پیشوند آنها یکسان باشد.

بررسی گزینه‌ها:

باید هر چهار گزینه را به یک یکای مشابه تبدیل کنیم و سپس بزرگترین عدد را انتخاب کنیم. راحت‌ترین کار، تبدیل همه گزینه‌ها به متر است:

$$0.4 \times 10^7 \text{ ft} \times \frac{12\text{in}}{1\text{ft}} \times \frac{2/5\text{cm}}{1\text{in}} \times \frac{10^{-3} \text{ m}}{1\text{cm}} = 12\text{m}$$

$$2 \times 10^{-10} \text{ hin} \times \frac{10^{-2} \text{ in}}{1\text{hin}} \times \frac{2/5\text{cm}}{1\text{in}} \times \frac{10^{-3} \text{ m}}{1\text{cm}} = 0.4\text{m}$$

$$0.3 \times 10^3 \text{ ذرع} \times \frac{1/5\text{m}}{1\text{ذرع}} = 31\text{m}$$

$$2 \times 10^{-10} \mu\text{Ly} \times \frac{10^{-6} \text{ Ly}}{\mu\text{Ly}} \times \frac{9 \times 10^{15} \text{ m}}{1\text{Ly}} = 1/8\text{m}$$

۱

۲

۳

۴

بنابراین عدد گزینه ۳ از سایر گزینه‌ها بیشتر است.

گروه آموزشی ماز

۴۱ - شتاب یک خودرو معادل $7/2 \times 10^{-8} \frac{\text{Tm}}{\text{min}^2}$ است مقدار این شتاب در SI و به صورت نمادگذاری علمی در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

$$2/0 \times 10^4$$

$$2/0 \times 10^3$$

$$1/2 \times 10^2$$

$$1/2 \times 10^3$$

پاسخ: گزینه ۴ (متوسط - محاسباتی - ۱۰۵)

بيان هر کمیت به صورت نمادگذاری علمی شامل:

توان صحیحی از ۱۰	\times	عدد بین ۱ تا ۱۰
------------------	----------	-----------------

یکای کمیت و



هر یک از موارد زیر را نمادگذاری علمی کنید.

$$\begin{aligned} \text{الف: } 15 \times 10^{-8} \text{ m} &= 1/5 \times 10^{-3} \times 10^{-8} = 1/5 \times 10^{-5} \text{ m} \\ \text{ب: } 18 \times 10^{-5} \text{ s} &= 4/5 \times 10^{-1} \times 10^{-5} = 4/5 \times 10^{-6} \text{ s} \\ \text{پ: } 2567589 \times 10^{-4} \text{ L} &= 2/5 \times 10^{-1} \times 10^{-4} = 2/5 \times 10^{-5} \text{ L} \\ \text{ت: } 117 \times 10^{-5} \text{ kg} &= 1/17 \times 10^{-1} \times 10^{-5} = 1/17 \times 10^{-6} \text{ kg} \end{aligned}$$

پاسخ شرحی:

باید مقدار شتاب به $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ تبدیل شود. فقط باید دقت داشته باشید که چون $\text{s} = 60\text{s}$ است پس $1\text{min} = 60\text{s}$ خواهد شد.

$$7/2 \times 10^{-8} \frac{\text{Tm}}{\text{min}^2} \times \frac{10^{-12} \text{ m}}{1\text{Tm}} \times \frac{1\text{min}^2}{3600\text{s}^2} = \frac{72 \times 10^{-9} \times 10^{-12}}{36 \times 10^2} = 2 \times 10^{-13} = 2/0 \times 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

www.Sakoye10hom.blog.ir

- ۴۲ - فرض کنید قد یک شخص از ابتدای ۳ سالگی تا ابتدای ۱۸ سالگی از 175cm به 121cm برسد. آهنگ متوسط افزایش قد این شخص چند واحد نجومی بر ماه است؟ (هر واحد نجومی معادل $1/5 \times 10^{-11}\text{m}$ و هر ماه ۳۰ روز فرض شود).

$$2/4 \times 10^{-11} \quad (4)$$

$$2 \times 10^{-12} \quad (3)$$

$$2/4 \times 10^{-13} \quad (2)$$

$$2 \times 10^{-14} \quad (1)$$

پاسخ: گزینه ۱ (متوسط - مفهومی و محاسباتی - ۱۰۵)



آهنگ

آهنگ هر کمیت دلخواه در فیزیک از تقسیم آن کمیت بر واحد زمان بدست می‌آید.

مثلاً از علوم نهم می‌دانید که:

پس می‌توان گفت شتاب متوسط، آهنگ متوسط تغییرات سرعت است.



$$\frac{\text{تغییرات سرعت}}{\text{زمان}} = \text{شتاب متوسط}$$

$$175 - 121 = 54\text{cm} = \text{میزان افزایش قد}$$

$$\text{سال} = 18 - 3 = 15 = \text{مدت زمان}$$

$$\Rightarrow \frac{\text{میزان افزایش قد}}{\text{مدت زمان}} = \frac{54\text{cm}}{15 \text{ سال}} = 3/\text{سال} = \frac{\text{آهنگ افزایش قد}}{\text{سال}}$$

اکنون این مقدار را به واحد نجومی (Au) بر ماه تبدیل می‌کنیم:

$$36 \times 10^{-1} \frac{\text{cm}}{\text{سال}} \times \frac{10^{-3} \text{m}}{1 \text{cm}} \times \frac{1 \text{Au}}{1/5 \times 10^{11} \text{m}} \times \frac{\text{سال}}{12 \text{ماه}} = 2 \times 10^{-14} \frac{\text{Au}}{\text{ماه}}$$

گروه آموزشی ماز

- ۴۳ - در ظرفی مکعب شکل به حجم 500mL حداقل چند مکعب فلزی کوچک به ابعاد $2\text{mm} \times 5\text{mm} \times 10^5 \mu\text{m}$ می‌توان جا داد؟

$$1/4 \quad (4)$$

$$1250 \quad (3)$$

$$12 \quad (2)$$

$$125 \quad (1)$$

پاسخ: گزینه ۲ (متوسط - محاسباتی - ۱۰۵)



سه یکای خاص

ارتباط بین سه یکای m^3 , L , cm^3 را حفظ باشید:

$$(1) 1\text{m}^3 = 1000\text{L}$$

$$(2) 1\text{L} = 1000\text{cm}^3$$



ابتدا حجم مکعب بزرگ و نیز حجم هریک از مکعب‌های کوچک را به m^3 تبدیل می‌کنیم و سپس از تقسیم دو حجم بر یکدیگر، خواسته سؤال را بدست می‌آوریم:

$$1000 \cdot \text{mL} \times \frac{10^{-3} \text{L}}{1 \text{mL}} \times \frac{1 \text{m}^3}{10^{-3} \text{L}} = 5 \times 10^{-4} \text{m}^3 = \text{حجم مکعب بزرگ}$$

$$2\text{mm} \times 5\text{mm} \times 10^5 \mu\text{m} \times 4 \times 10^{-3} \text{dam} \times \frac{10^{-3} \text{m}}{1\text{mm}} \times \frac{10^{-6} \text{m}}{1\mu\text{m}} \times \frac{10^1 \text{m}}{1\text{dam}} = 4 \times 10^{-5} \text{m}^3 = \text{حجم هر مکعب کوچک}$$

$$\frac{\text{حجم مکعب بزرگ}}{\text{حجم هر مکعب کوچک}} = \frac{5 \times 10^{-4}}{4 \times 10^{-5}} = 12.5 = \text{حداکثر تعداد مکعب‌ها}$$

که اولین عدد طبیعی کوچکتر از 12.5 عدد 12 است.

گروه آموزشی ماز

- ۴۴ - اگر A, B و C سه کمیت فیزیکی باشند، کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

(۱) مجموع دو عبارت AC و B الزاماً غیر ممکن است.

(۲) تفریق دو عبارت A و C الزاماً غیر ممکن است.

$$(3) \text{ عبارت } \frac{AC}{B} \text{ الزاماً دارای یکا است.}$$

$$(4) \text{ اگر دو عبارت BC و A جمع پذیر باشند، عبارت } \frac{BC}{A} \text{ الزاماً بدون یکا است.}$$

پاسخ: گزینه ۴ (متوسط - مفهومی - ۱۰۰)

سازگاری پکاها

براساس سازگاری پکاها، در یک رابطهٔ فیزیکی، مقدار کمیت‌های موجود در آن رابطه باید براساس یکاهایی وارد گردد که باهم سازگار بوده و بتوانند از طرفین تساوی خط بخورند.

بنابراین در فیزیک، هر رابطه‌ای بین کمیت‌ها برقرار باشد، همان رابطه بین یکاهای آن کمیت‌ها نیز برقرار است. اگر کمیت را با x نمایش دهیم، یکای کمیت را با $[x]$ نمایش می‌دهیم.
به طور مثال برای انرژی جنبشی:

$$k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$[k] = [m].[v]^2$$

$$[k] = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

مثال

یکای فرعی نیرو را در SI بدست آورید.

پاسخ: طبق قانون دوم نیوتون می‌توان نوشت:

$$F = ma$$

$$\rightarrow [F] = [m][a]$$

$$\Rightarrow N = \text{kg} \times \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \Rightarrow N = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$$

بررسی گزینه‌ها

جداگانه هریک از گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

۱ اگر یکای عبارت AC و یکای B یکسان باشد امکان جمع پذیر بودن آنها وجود دارد و قادر به جمع شدن هستند \leftarrow (نادرست)

۲ ممکن است A و C هم یکا باشند در این صورت تفریق آنها امکان پذیر است. اگر بدانیم الزاماً یکای این دو کمیت متفاوت است قادر به تفریق آنها خواهیم بود \leftarrow (نادرست)

۳ ممکن است یکای دو عبارت AC و B یکسان بوده باشد در این صورت کسر $\frac{AC}{B}$ بدون یکا خواهد بود. \leftarrow (نادرست)

۴ اگر دو عبارت BC و A جمع پذیر باشند، پس الزاماً یکای یکسان دارند. در این صورت کسر $\frac{BC}{A}$ بدون یکا خواهد بود \leftarrow (درست)

گروه آموزشی ماز

- ۴۵ - یکای آهنگ تغییرات نیروی وارد بر یک جسم در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟

$$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^3} \quad (۴)$$

$$\frac{\text{kgm}^2}{\text{s}^3} \quad (۳)$$

$$\frac{\text{kgm}}{\text{s}^2} \quad (۲)$$

$$\frac{\text{kgm}^2}{\text{s}^2} \quad (۱)$$

پاسخ: گزینه ۴ (متوسط - مفهومی - ۱۰۰)

نکته

جهت سرعت بخشیدن به حل این تیپ از مسائل یکای فرعی نیرو و انرژی که به صورت زیر می‌باشد را حفظ باشید:

$$(۱) \text{ نیرو} \Rightarrow N = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$$

$$(۲) \text{ انرژی} \Rightarrow J = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$$

آهنگ تغییرات نیروی وارد بر جسم از تقسیم نیرو بر واحد زمان بدست می‌آید:

$$\frac{\text{نیرو}}{\text{زمان}} = \frac{\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}}{\text{زمان}} = \frac{\text{نیرو}}{\text{s}} = \frac{\text{نیرو}}{\text{s}} = \text{آهنگ تغییر نیرو}$$

- ۴۶- یک رابطه فیزیکی به صورت $v = \sqrt{\alpha U + \beta^2}$ نوشته می‌شود که در آن v بیانگر تندی و U بیانگر انرژی است. یکای β و α در SI به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

$$\frac{m}{kg}, \frac{m}{s} \quad (4)$$

$$\frac{m}{kg}, \frac{m^2}{s^3} \quad (1)$$

$$\frac{1}{kg}, \frac{m^2}{s^2} \quad (4)$$

$$\frac{1}{kg}, \frac{m}{s} \quad (3)$$

پاسخ: گزینه ۳ (متوسط - مفهومی و محاسباتی - ۱۰۰۱)



اولاً برای راحتی کار طرفین تساوی را به توان ۲ می‌رسانیم تا معادله به صورت $v^2 = \alpha U + \beta^2$ درآید. ثانیاً چون دو عبارت U و β^2 توانسته‌اند با یکدیگر جمع شده و برابر یکای J شوند، پس یکای هر دوی این عبارت‌ها، همان یکای v بوده است. بنابراین می‌توان نوشت:

$$[v]^2 = [\alpha][U] \Rightarrow \frac{m^2}{s^2} = [\alpha] \times \frac{kg \cdot m^2}{s^2} \Rightarrow [\alpha] = \frac{1}{kg}$$

$$[v]^2 = [\beta]^2 \Rightarrow [\beta] = [v] \Rightarrow [\beta] = \frac{m}{s}$$

گروه آموزشی ماز

- ۴۷- اگر F بیانگر نیرو و P بیانگر توان باشد، عبارت $\frac{F}{P}$ از جنس کدام کمیت زیر است؟

(۴) معکوس تندی

(۳) تندی

(۲) معکوس زمان

(۱) زمان

پاسخ: گزینه ۴ (متوسط - مفهومی و محاسباتی - ۱۰۰۱)



می‌دانیم یکای نیرو معادل $\frac{kg \cdot m}{s}$ است. پس تلاش می‌کنیم یکای فرعی توان را بدست آوریم. توان از تقسیم انرژی بر واحد زمان بدست می‌آید. بنابراین:

$$P = \frac{\text{انرژی}}{\text{زمان}} \Rightarrow [P] = \frac{\frac{kg \cdot m^2}{s}}{\frac{zaman}{s}} \Rightarrow [P] = \frac{kg \cdot m^2}{s^2} = \frac{kg \cdot m}{s}$$

بنابراین می‌توان نوشت:

$$\frac{[F]}{[P]} = \frac{\frac{kg \cdot m}{s^2}}{\frac{kg \cdot m^2}{s^3}} = \frac{kg \cdot m \cdot s^3}{kg \cdot m^2 \cdot s^2} = \frac{s}{m}$$

که یکای $\frac{s}{m}$ مربوط به معکوس یکای کمیت تندی است.

گروه آموزشی ماز

- ۴۸- در تساوی $1000 \frac{Mg \cdot \mu m^2}{\square s^2} = 10^4 \mu J$ در جای خالی کدام پیشوند باید قرار گیرد؟

m (۴)

M (۳)

h (۲)

c (۱)

پاسخ: گزینه ۱ (سخت - محاسباتی - ۱۰۰۱)



فرض کنیم ضریب مربوط به این پیشوند x باشد. با یافتن مقدار x می‌توانیم به جواب برسیم. هم چنین مدنظر داشته باشید که J است.

$$10^4 \mu J = 1000 \frac{Mg \cdot \mu m^2}{\square s^2} \Rightarrow 10^4 \times 10^{-6} \frac{kg \cdot m^2}{s^2} = 10^3 \frac{Mg \cdot \mu m^2}{(10^x)^2 s^2}$$

$$\rightarrow 10^{-2} \times \frac{10^{-3} \text{ ج.م}}{\cancel{ج}} = 10^{-3} \times \frac{10^{-6} \text{ ج.}(10^{-6})^3 \text{ م}}{\cancel{10^{-2} \times ج}}$$

$$\rightarrow 10^{-1} = 10^{-3} \times 10^{-12} \times 10^{-2x} \rightarrow 10^{-1} = 10^{-2x-3}$$

$$\rightarrow -2x-3=1 \Rightarrow -2x=4 \Rightarrow x=-2$$

پس \square در اصل معادل $ba^2 = 10$ بوده که مربوط به پیشوند سانتی (c) است.

گروه آموزشی ماز

- ۴۹- اگر رابطه‌ای به صورت $Q = mc\Delta\theta$ داشته باشیم که Q بیانگر انرژی گرمایی، $\Delta\theta$ تغییرات دما (برحسب درجه فارنهایت) و m بیانگر جرم باشد، یکای c در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ (lb معادل پوند و یکای جرم است، ft معادل فوت و یکای طول است، ${}^{\circ}\text{F}$ معادل درجه فارنهایت و یکای دما است).

$$\frac{\text{ft}^2}{\text{s} \cdot {}^{\circ}\text{F}} \quad (3)$$

$$\frac{\text{ft}}{\text{s} \cdot {}^{\circ}\text{F}} \quad (1)$$

(پاسخ: گزینه ۲ (متوسط - مفهومی و محاسباتی - ۱۰۰۱))



می‌دانیم یکای انرژی در SI به صورت $J = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$ است که معادل آن در سیستم یکای مطرح شده در سؤال به صورت $\frac{\text{lb} \cdot \text{ft}^2}{\text{s}^2}$ می‌باشد. پس داریم:

$$Q = mc\Delta\theta$$

$$\rightarrow [Q] = [m][c][\Delta\theta]$$

$$\rightarrow \frac{\text{lb} \cdot \text{ft}^2}{\text{s}^2} = \text{lb.}[c].{}^{\circ}\text{F} \Rightarrow [c] = \frac{\text{ft}^2}{\text{s} \cdot {}^{\circ}\text{F}}$$


گروه آموزشی ماز

- ۵۰- در مدل‌سازی فیزیکی کدام‌یک از پدیده‌های زیر، می‌توان از مقاومت هوا صرف‌نظر کرد؟
 ۱) سقوط یک چتر باز
 ۲) افتادن برگی از درخت
 ۳) پرتاب یک توپ بسکتبال
 ۴) حرکت بادبادک

(پاسخ: گزینه ۳ (متوسط - حفظی و مفهومی - ۱۰۰۱))



در حرکت اجسامی مثل توپ می‌توان از چرخش‌های جسم در حین حرکت صرف‌نظر کرد.
 توپ بسکتبال در هوا



۱- از چرخش توپ صرف‌نظر می‌کنیم.

۱- توپ هنگام حرکت می‌چرخد.

۲- از اثر تغییر نیروی گرانش در اثر تغییر ارتفاع صرف‌نظر می‌کنیم.

۲- وزن توپ با تغییر ارتفاع تغییر می‌کند.

۳- اثر مقاومت هوا و باد را نادیده گرفته و فرض می‌کنیم توپ در خلا حرکت می‌کند.

۳- مقاومت هوا و باد به توپ نیرو وارد می‌کنند.

۴- از ابعاد توپ صریح‌تر می‌کنیم و آن را یک ذره در نظر می‌گیریم.

۴- توپ کره کامل نیست و درها و برجستگی‌هایی دارد.

در مدل‌سازی توپ بسکتبال اگر به جای مقاومت هوا نادیده می‌گرفتیم، آن‌گاه مدل ما پیش‌بینی می‌کرد که وقتی توپی به بالا پرتاب شود در یک خط مستقیم بالا می‌رود.



مقاومت هوا در گزینه‌های ۱، ۲ و ۴ اثر مهم و تعیین‌کننده محسوب شده و قابل چشم‌پوشی نیست.

در حالی که طبق مثال و متن کتاب درسی برای پرتاب یک توپ بسکتبال می‌توان از مقاومت هوا صرف‌نظر کرد.

-۵۱ کدام یک از مطالب زیر، نادرست است؟

- (۱) پس از مهبانگ و تشکیل ذرات زیراتومی، ابتدا عناصر هیدروژن و هلیم و سپس گازهای آنها تولید شد.
- (۲) دانشمندان با توجه به توزیع ناهمگون عناصرها در جهان، موفق به توضیح چگونگی پیدایش عناصرها شدند.
- (۳) دو فضایی‌مای وویجر ماموریت داشتند با عبور از کنار سیاره‌های سنگی، نوع عناصر سازنده‌ی آنها را شناسایی کنند.
- (۴) پاسخ به پرسش چگونگی به وجود آمدن هستی، برخلاف شکل‌گیری جهان کنونی، در قلمرو علم تجربی نمی‌گنجد.


پاسخ: گزینه ۳ (آسان - حفظی - ۱۰۵)



دو فضایی‌مای ماموریت داشتند با گذر از کنار سیاره‌های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون (سیاره‌های گازی)، شناسنامه‌ی فیزیکی و شیمیایی آنها را تهیه کنند و بفرستند. این شناسنامه‌ها می‌توانند حاوی اطلاعاتی مانند نوع عناصرهای سازنده، ترکیب‌های شیمیایی در اتمسفر آنها و ترکیب درصد این مواد باشد.

بررسی سایر نظریه‌ها:

- ۱** برخی از دانشمندان بر این باورند که سر آغاز کیهان با انفجاری مهیب (مهبانگ) همراه بوده که طی آن انرژی عظیمی آزاد شده است. در آن شرایط پس از پدید آمدن ذره‌های زیراتومی مانند الکترون، پروتون و نوترون، عناصرهای هیدروژن و هلیم پا به عرصه‌ی جهان گذاشتند. با گذشت زمان و کاهش دما، گازهای هیدروژن و هلیم تولید شده، متراکم شدند و مجموعه‌های گازی به نام سحابی ایجاد کردند.
- ۲** عناصرها به صورت ناهمگون در جهان هستی توزیع شده‌اند. این یافته باعث شد تا دانشمندان بتوانند چگونگی پیدایش عناصرها را توضیح دهند؛ به طوری که برخی از آنها بر این باورند که سر آغاز کیهان با انفجاری مهیب (مهبانگ) همراه بوده که طی آن انرژی عظیمی آزاد شده است.
- ۳** انسان همواره با پرسش‌هایی از این دست روبرو بوده است که «هستی چگونه به وجود آمده است؟ جهان کنونی چگونه شکل گرفته است؟ پدیده‌های طبیعی چگونه و چرا رخ می‌دهند؟» و پیوسته تلاش کرده است برای این پرسش‌ها، پاسخ‌هایی قانع کننده بیابد. پاسخ به نخستین پرسش (چگونگی به وجود آمدن هستی) در قلمرو علم تجربی نمی‌گنجد و آدمی تنبه با مراجعت به چارچوب اعتقادی و بینش خویش در پرتو آموزه‌های الهی می‌تواند به پاسخی جامع دست یابد. اما پس از عبور از این قلمرو، علم تجربی تلاشی گسترده را برای یافتن پاسخ پرسش‌های دوم و سوم (شکل‌گیری جهان کنونی) انجام داده است.

**-۵۲ کدام یک از مطالب زیر، نادرست است؟**

- (۱) دومین عنصر فراوان سیاره‌ی زمین، در میان ۸ عنصر فراوان سیاره‌ی مشتری وجود دارد.
- (۲) ششمین عنصر فراوان سیاره‌های زمین و مشتری یکسان است و فراوانی برابر نیز دارد.
- (۳) سپکتیرین عنصر جدول دوره‌ای، بیش از نیمی از عناصر سیاره‌ی مشتری را تشکیل می‌دهد.
- (۴) درصد فراوانی هیدروژن در سیاره‌ی مشتری، از مجموع فراوانی دو عنصر فراوان سیاره‌ی زمین، بیشتر است.

پاسخ: گزینه ۲ (متوسط - حفظی - ۱۰۵)



شكل زیر، عناصر فراوان سیاره‌های زمین و مشتری را نشان می‌دهد:



نکات زیر، دربراسی دقیق نمودار توزیع عناصر در سیاره‌های زمین و مشتری بدست می‌آید:

- رتبه فراوانی گوگرد در سیاره‌های مشتری و زمین یکسان است اما درصد فراوانی این عنصر نافلزی در سیاره‌ی مشتری کمتر از درصد فراوانی آن در سیاره‌ی زمین است.
- درصد فراوانی فراوان‌ترین عنصر سازنده‌ی مشتری (عنصر هیدروژن) بیشتر از ۵۰ درصد (حدود ۹۰ درصد) است اما درصد فراوانی فراوان‌ترین عنصر سازنده‌ی زمین کمتر از ۵۰ درصد است.
- فراوان‌ترین عنصر سازنده‌ی زمین، یک عنصر فلزی (متعلق به دسته‌ی عناصر واسطه) و فراوان‌ترین عنصر سازنده‌ی مشتری، یک عنصر نافلزی (متعلق به گروه ۱ جدول تناوبی) است.
- اندازه‌ی سیاره‌ی مشتری بزرگتر از اندازه‌ی سیاره‌ی زمین است و این سیاره عمدتاً از عناصر نافلزی و گازی تشکیل شده است.
- فالصله‌ی سیاره‌ی مشتری تا خورشید، بیشتر از فاصله‌ی زمین تا خورشید است.
- دومین عنصر فراوان در هر دو سیاره، در دسته‌ی عناصر نافلزی قرار دارد.
- دومین، هفتمین و هشتمین عنصر فراوان در سیاره‌ی مشتری، در دسته‌ی گازهای نجیب قرار دارند و متعلق به گروه ۱۸ جدول تناوبی هستند.

بررسی لزینه‌ها:

- ۱ دومین عنصر فراوان سیاره‌ی زمین، اکسیژن است که چهارمین عنصر فراوان سیاره‌ی مشتری نیز، است.
- ۲ ششمین عنصر فراوان سیاره‌های زمین و مشتری، گوگرد است اما فراوانی آن در سیاره‌ی زمین، بیشتر از مشتری است.
- ۳ سیک‌ترین عنصر جدول دوره‌ای، هیدروژن است که بیش از ۵۰٪ از عناصر سیاره‌ی مشتری را تشکیل می‌دهد.
- ۴ درصد فراوانی هیدروژن در سیاره‌ی مشتری، از مجموع فراوانی دو عنصر فراوان سیاره‌ی زمین، بیشتر است؛ این موضوع را می‌توان از مقایسه‌ی مجموع فراوانی سایر عناصر (به جز آهن و اکسیژن) در زمین و سایر عناصر (به جز هیدروژن) در مشتری نیز دریافت. با توجه به شکل، مجموع فراوانی عناصر سوم تا هشتم در سیاره‌ی زمین، بیشتر از مجموع فراوانی عناصر دوم تا هشتم در سیاره‌ی مشتری است؛ پس می‌توان گفت مجموع فراوانی دو عنصر فراوان سیاره‌ی زمین، کمتر از فراوانی هیدروژن در سیاره‌ی مشتری است.

• گروه آموزشی ماز •

-۵۳ - مجموع شمار نوترون‌ها و الکترون‌ها در فراوان‌ترین ایزوتوپ لیتیم، چند برابر شمار نوترون‌ها در رادیوایزوتوپ طبیعی هیدروژن است؟

۲ (۴)

۳/۵ (۳)


۳ (۲)

۷ (۱)

پاسخ: گزینه ۳ (متوسط - مفهومی - ۱۰۰)

پاسخ شریعتی

لیتیم دارای دو ایزوتوپ طبیعی است. ایزوتوپ سنگین‌تر، پایدارتر بوده و فراوانی بیشتری نیز، دارد.



هیدروژن نیز دارای ۳ ایزوتوپ طبیعی است. ایزوتوپ‌های طبیعی و ساختگی هیدروژن، به صورت زیر است:

ایزوتوپ	^1H	^2H	^3H	^4H	^5H	^6H	^7H
نیم عمر	پایدار	پایدار	۱۲/۳۲ سال	$1/4 \times 10^{-32}$ ثانیه	$9/1 \times 10^{-22}$ ثانیه	$2/9 \times 10^{-22}$ ثانیه	$2/3 \times 10^{-23}$ ثانیه
درصد فراوانی در طبیعت	۹۹/۹۸۸۵ (طبیعی)	۰/۰۱۱۴ (طبیعی)	ناقیز (طبیعی)	۰ (ساختگی)	۰ (ساختگی)	۰ (ساختگی)	۰ (ساختگی)

هیدروژن ۳ ایزوتوپ طبیعی و ۴ ایزوتوپ ساختگی است.

فراوان‌ترین ایزوتوپ هیدروژن ^1H است و دو ایزوتوپ ^2H و ^3H پایدار محسوب می‌شوند.

تنها رادیوایزوتوپ طبیعی هیدروژن ^3H است که نیم عمری در حدود ۱۲ سال دارد.

همه‌ی ایزوتوپ‌های ساختگی هیدروژن پرتوزا هستند و نیم عمر کمتر از 10^{-21} ثانیه دارند.

مقایسه‌ی نیم عمر ایزوتوپ‌های ساختگی هیدروژن به صورت رو به رو است: $^7\text{H} > ^6\text{H} > ^5\text{H} > ^4\text{H} > ^3\text{H} > ^2\text{H} > ^1\text{H}$.

منظور از رادیوایزوتوپ طبیعی هیدروژن ^1H است. بنابراین مجموع شمار نوترون‌ها و الکترون‌ها در فراوان‌ترین ایزوتوپ لیتیم که برابر با ۷ است، $3/5$ برابر شمار نوترون‌ها در رادیوایزوتوپ طبیعی هیدروژن (۲ نوترون)، می‌باشد.

• گروه آموزشی ماز •

-۵۴- کدام موارد از مطالب زیر، درست هستند؟

- آ: عناصر سبک مانند لیتیم، بور و برلیم، عناصر سنگین تر مانند آهن، طلا و کربن را به وجود می‌آورند.
- ب: درون ستاره‌ها در دماهای بسیار بالا، واکنش‌های شیمیایی رخ می‌دهد و عناصر گوناگون تشکیل می‌شود.
- پ: جرم همه‌ی اتم‌های منیزیم در یک نمونه از آن یکسان نیست، بلکه مخلوطی از سه ایزوتوپ(هم‌مکان) است.
- ت: تفاوت مقدار عدد جرمی و شمار نوترون‌های عنصر لیتیم، در همه‌ی ایزوتوپ‌های آن یکسان است.

(۱) آ و پ (۲) ب و پ (۳) آ و ت (۴) پ و ت

پاسخ: گزینه ۴ (متوسط - حفظی و مفهومی - ۱۰۰۱)




موارد (پ) و (ت) درست هستند. به مراحل تشکیل عناصر دقت کنید:



بررسی سایر موارد:

(آ) عناصر سبک مانند لیتیم(Li_2)، بور(B_5)، برلیم(Be_4)، کربن(C_6) و... عناصر سنگین تر مانند آهن، طلا و... را به وجود می‌آورند.

(ب) درون ستاره‌ها همانند خورشید در دماهای بسیار بالا، واکنش‌های هسته‌ای(نه شیمیایی) رخ می‌دهد؛ واکنش‌هایی که در آن‌ها از عنصرهای سبک‌تر، عنصرهای سنگین تر پدید می‌آیند. ستاره‌ها متولد می‌شوند؛ رشد می‌کنند و زمانی می‌میرند. مرگ ستاره اغلب با یک انفجار بزرگ همراه است که سبب می‌شود عنصرهای تشکیل شده در آن در فضا پراکنده شود. به همین دلیل باید ستارگان را کارخانه‌ی تولید عنصرها دانست.



پ) منیزیم دارای سه ایزوتوپ ^{24}Mg , ^{25}Mg و ^{26}Mg است. پس جرم همه اتم‌های منیزیم در یک نمونه از آن یکسان نیست، بلکه مخلوطی از سه ایزوتوپ(هم‌مکان) است.

ت) تفاوت مقدار عدد جرمی و شمار نوترون‌ها، برابر با شمار پروتون‌ها و یا عدد اتمی عنصر است. مقدار عدد اتمی در همه ایزوتوپ‌های یک عنصر یکسان است. تفاوت ایزوتوپ‌ها در شمار نوترون‌ها، عدد جرمی و خواص فیزیکی وابسته به جرم است از آن جا که خواص شیمیایی عنصرها، به عدد اتمی وابسته است، خواص شیمیایی ایزوتوپ‌ها یکسان است.

گروه آموزشی ماز

۵۵- چند مورد از موارد زیر، درست است؟

آ: نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون‌ها در فراوان‌ترین ایزوتوپ Mg با این نسبت در سنگین‌ترین ایزوتوپ پایدار H , برابر است.

ب: شمار ایزوتوپ‌های ساختگی هیدروژن، با شمار نوترون‌های فراوان‌ترین ایزوتوپ لیتیم برابر است.

پ: اگر e نماد الکترون باشد، با توجه به نماد همگانی اتم‌ها، مقدار $A - Z$ برابر با e است.

ت: ۲۶ عنصر ساختگی جدول دوره‌ای در دوره‌های ششم و هفتم قرار گرفته‌اند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

پاسخ: گزینه ۲ (سخت - مفهومی - ۱۰۰)



موارد (آ) و (ب) درست هستند.

پرسنی سایر موارد:

ت) فراوان‌ترین ایزوتوپ منیزیم، ^{24}Mg است که دارای شمار پروتون و نوترون برابری است. سنگین‌ترین ایزوتوپ پایدار هیدروژن نیز، H^3 است که دارای شمار پروتون و نوترون برابری است.

ب) عنصر هیدروژن، دارای ۴ ایزوتوپ ساختگی است. فراوان‌ترین ایزوتوپ لیتیم (Li^7) نیز، دارای ۴ نوترون است.

پ) نماد شیمیایی همگانی اتم‌ها به صورت A_Z^E است که A بیانگر عدد جرمی و Z بیانگر عدد اتمی است. تفاوت این دو مقدار برابر با شمار نوترون‌های آن اتم است. شمار الکترون با شمار پروتون و نه نوترون برابر است.

ت) از ۱۱۸ عنصر شناخته شده، ۹۲ عنصر در طبیعت یافت می‌شود و ۲۶ عنصر دیگر ساختگی هستند. نخستین عنصر ساخته شده، تکنسیم (Tc^{99}) است که در دوره‌ی پنجم قرار دارد. پس عناصر ساختگی می‌توانند در دوره‌های ۵ تا ۷ باشند.

گروه آموزشی ماز

۵۶- اگر نیم عمر ایزوتوپ H^3 در حدود ۱۲ سال باشد، جرم مخلوطی از ۳۰۰ گرم H^3 و ۲۰۰ گرم H^1 ، بعد از گذشت ۳۶ سال، به تقریب چند درصد کاهش می‌یابد؟

۳۷/۵ (۴)

۶۳ (۳)

۵۵ (۲)

۴۴ (۱)

پاسخ: گزینه ۱ (سخت - مساله - ۱۰۰)



ایزوتوپ‌های H^1 و H^3 پایدار هستندو با گذر زمان تغییر جرم نمی‌دهند اما H^3 ناپایدار است و با توجه به صورت سوال، هر ۱۲ سال، مقدار آن نصف می‌شود؛ پس می‌توان گفت جرم 300 گرم H^3 پس از گذشت 12 سال به 150 گرم می‌رسد. در 12 سال بعد نیز، جرم آن به 75 گرم و در 12 سال بعد از آن نیز(مجموعاً 36 سال) به جرم $37/5$ گرم می‌رسد. پس جرم این نمونه $= \frac{37/5}{300} = 262/5$ گرم کاهش می‌یابد. جرم اولیه مخلوط، 600 گرم بود؛ پس درصد کاهش جرم برابر است با:

$$\frac{262/5}{600} \times 100 \cong 44\%$$

پس جرم این نمونه، 44% کاهش می‌یابد.

گروه آموزشی ماز

۵۷- کدام یک از مطالب زیر، در مورد نخستین عنصر ساخته شده در راکتور هسته‌ای درست است؟

(۱) عنصری رادیوایزوتوپ است؛ زیرا نسبت شمار نوترون به پروتون آن، بیشتر از $1/5$ است.

(۲) شمار نوترون‌های آن، با عدد اتمی ششمین عنصر گروه دوم جدول دوره‌ای یکسان است.

(۳) یون یدید با یون این عنصر، اندازه‌ی مشابهی دارد و غده‌ی تیروئید هر دو یون را جذب می‌کند.

(۴) از آن جا که نیم عمر آن کم است، نمی‌توان مقادیر زیادی از این عنصر را تهیه و برای مدت طولانی نگهداری کرد.



پاسخ شرحی:

نخستین عنصر ساخته شده در راکتور هسته‌ای، ^{90}TC است. نیم عمر این عنصر کم است و نمی‌توان مقادیر زیادی از این عنصر را تهیه و برای مدت طولانی نگهداری کرد.

بررسی سایر گروه‌ها:

۱) اغلب هسته‌هایی که نسبت شمار نوترون به پروتون آن‌ها بیشتر از $1/5$ است، رادیوایزوتوپ هستند. عنصر تکنسیم دارای ۵۶ نوترون و ۴۳ پروتون است؛ پس نسبت شمار نوترون به پروتون در آن، کمتر از $1/5$ است اما با این وجود، عنصری پرتوزا است.

۲) ^{90}TC دارای ۵۶ نوترون است که با عدد اتمی پنجمین عنصر گروه دوم جدول دوره‌ای (ba_{عده}) یکسان است. پنجمین عنصر گروه دوم جدول دوره‌ای، در دوره‌ی ششم قرار دارد؛ پس دو عنصر بعد از Xe_{۴۵} است. به درسنامه‌ی زیر، دقت کنید:

برای تعیین شماره‌ی گروه: مجموع عدد اتمی و شماره‌ی دوره‌ی هر کدام ابا_{عده} باشد.

گاز نجیب	عدد اتمی	شماره تناوب
هليم	۲	۱
نئون	۱۰	۲
آرگون	۱۸	۳
كريپتون	۳۶	۴
زنون	۵۴	۵
رادون	۸۶	۶
اوگانسون	۱۱۸	۷

تعیین شماره‌ی گروه:


برای تعیین سریع شماره‌ی گروه عنصرها، اختلاف عدد اتمی آن‌ها را نسبت به نزدیکترین گاز نجیب محاسبه می‌کنیم؛ که با دو حالت ممکن است مواجه شویم:

(۱) اگر عدد اتمی مورد نظر نسبت به عدد اتمی نزدیکترین گاز نجیب بزرگتر بود، میزان تفاوت آن‌ها، بیانگر شماره‌ی گروه است.

به عنوان مثال در مورد عنصر سرب با عدد اتمی ۸۲، می‌توان گفت نزدیکترین گاز نجیب به آن، زون(He_۴) است. چون تفاوت عدد اتمی آن‌ها $= 54 - 82 = 18$ است، نتیجه می‌گیریم این عنصر در گروه اول قراردارد.


(۲) اگر عدد اتمی مورد نظر نسبت به عدد اتمی نزدیکترین گاز نجیب کوچکتر بود، به اندازه‌ی تفاوت آن‌ها از عدد کم می‌کنیم.

به عنوان مثال در مورد عنصر سرب با عدد اتمی ۸۲ می‌توان گفت نزدیکترین گاز نجیب به عدد اتمی ۸۰، رادون(Rn_{۸۶}) است. چون تفاوت عدد اتمی آن‌ها $= 86 - 82 = 4$ است، نتیجه می‌گیریم این عنصر در گروه ۱۴ (۱۸-۴=۱۴) قراردارد.



تعیین شماره‌ی دوره:

برای تعیین سریع شماره‌ی دوره‌ی عنصرها، از انگشتان دست کمک می‌گیریم؛ به این صورت که انتهای انگشتان را انتهای دوره در نظر می‌گیریم:



اگر عدداتمی عنصر مورد نظر بیشتر از عدداتمی نزدیکترین گاز نجیب به آن عنصر بود، نتیجه می‌گیریم که در دوره‌ی بعد از آن گاز نجیب قرار دارد.

به عنوان مثال در مورد عنصری با عدد اتمی ۲۴، می‌توان گفت نزدیکترین گاز نجیب به آن، آرگون (Ar) است؛ بنابراین دوره‌ی سوم را رد کرده و در دوره‌ی چهارم قرار دارد.

اگر عدداتمی عنصر مورد نظر کمتر از عدداتمی نزدیکترین گاز نجیب به آن عنصر بود، نتیجه می‌گیریم که با آن گاز نجیب هم دوره است.

به عنوان مثال عنصری با عدد اتمی ۴۸، قبل از زئون (Ze) است، پس در دوره‌ی پنجم قرار دارد.

 یون یدید با یون حاوی این عنصر، اندازه‌ی مشابهی دارد و غده‌ی تیروئید هر دو یون را جذب می‌کند. بنابراین از ^{99m}Tc در تصویربرداری از غده‌ی تیروئید، استفاده می‌شود.

تکنسیم (^{99m}Tc)

- ✓ نخستین عنصری که در راکتور هسته‌ای ساخته شد، تکنسیم (^{99m}Tc) بود. این عنصر دارای ^{93}Tc پروتون و 56 نوترون است.
- ✓ این عنصر در دوره‌ی پنجم و گروه هفتم قرار دارد.
- ✓ اغلب عنصرها با نسبت نوترون به پروتون مساوی یا بیشتر از $1/5$ ، رادیوایزوتوپ هستند. این عنصر نیز رادیوایزوتوپ است اما نسبت شمار نوترون به پروتون آن کمتر از $1/5$ است.
- ✓ از ^{99m}Tc در پژوهش برای تصویربرداری از غده‌ی تیروئید استفاده می‌شود. زیرا یون یدید با یونی که حاوی ^{99m}Tc اندازه‌ی مشابهی دارد و غده‌ی تیروئید هنگام جذب یدید، این یون را نیز جذب می‌کند. با افزایش مقدار این یون در غده‌ی تیروئید، امکان تصویربرداری فراهم می‌شود.
- ✓ همه‌ی ^{99m}Tc موجود در جهان باید به طور مصنوعی و با استفاده از واکنش‌های هسته‌ای ساخته شود. از آنجا که نیم عمر آن کم است و نمی‌توان مقادیر زیادی از این عنصر را تهیه و برای مدت طولانی نگهداری کرد، بسته به نیاز آن را با یک مولد هسته‌ای تولید و سپس مصرف می‌کنند.

گروه آموزشی ماز

۵۸- اگر تفاوت و مجموع نوترون‌ها در دو عنصر A و B به ترتیب برابر با 34 و 74 باشد، عدد اتمی عنصر B کدام است؟ (شمار نوترون‌های عنصر B بیشتر از عنصر A است).

۴۶ (۴)

۱۹ (۳)

۳۸ (۲)

۴۲ (۱)

پاسخ: گزینه ۱ (متوجه مساله - ۱۰۰)



شمار نوترون‌ها از تفاضل عددجرمی و عدداتمی به دست می‌آید. بنابراین شمار نوترون‌های دو عنصر A و B برابر است با:

$$n_A = 2a + 1 - a = a + 1$$

$$n_B = 2/b + 1 - (b + 4) = 1/b - 3$$

تفاوت و مجموع نوترون‌های دو عنصر برابر است با:

$$n_A + n_B = a + 1 + 1/b - 3 = 74 \Rightarrow a + 1/b = 76$$

$$n_A - n_B = (1/b - 3) - (a + 1) = 34 \Rightarrow 1/b - a = 38$$

با حل دستگاه، مقدار a و b به ترتیب برابر با 19 و 38 به دست می‌آید. پس عدداتمی عنصر B برابر با 42 است.

برای تمرین بیشتر، مثال زیر را حل کنید:

در عنصر Hg^{200} شمار نوترون‌ها $1/5$ برابر شمار پروتون‌ها است. در یون Hg^{2+} اختلاف شمار نوترون‌ها و الکترون‌ها کدام است؟

۴۲ (۴)

۸۲ (۳)

۸۰ (۲)

۴۰ (۱)

پاسخ: گزینه ۴

$$p + n = 200$$

$$n = 1/5 p \Rightarrow p + 1/5 p = 200 \Rightarrow p = 80 \text{ و } n = 120$$

با توجه به داده‌های سوال می‌توان نوشت:

شمار نوترون‌ها $1/5$ برابر شمار پروتون‌هاست. پس داریم:

برای محاسبه‌ی تعداد الکترون‌های موجود در یک یون، از رابطه‌ی زیر استفاده می‌کنیم.

$$\text{بار یون} - \text{تعداد پروتون}(\text{عدد اتمی}) = \text{تعداد الکترون‌ها}$$

در عنصر Hg^{2+} شمار الکترون و پروتون برابر است اما در یون Hg^{2+} ، 2 الکترون از دست رفته؛ پس اختلاف شمار نوترون‌ها و الکترون‌ها در این یون برابر 42 است.

گروه آموزشی ماز

۵۹- اختلاف عدداتمی هر عنصر در دوره‌ی با عنصر زیرین خود، واحد است.

۱۸ (۴) چهارم

۲ (۳) اول -

۱۸ (۲) دوم -

(۱) سوم - ۸

پاسخ: گزینه ۴ (سخت - مفهومی - ۱۰۵)

پاسخ شریحه:

اختلاف عدداتمی هر عنصر در دوره‌ی چهارم، با عنصر زیرین خود، ۱۸ واحد است؛ زیرا هم در دوره‌ی چهارم و هم در دوره‌ی پنجم، ۱۸ عنصر وجود دارد. اما اگر اختلاف عدداتمی هر عنصر در دوره‌ی پنجم با عنصر زیرین خود را در نظر بگیریم، در دو عنصر اول برابر با ۱۸ و در عناصر بعدی، برابر با ۳۲ واحد است؛ به عنوان مثال اختلاف عدداتمی ^{۲۷}Rb با عنصر زیرین آن (^{۲۹}Cs) برابر با ۱۸ واحد است اما اختلاف عدداتمی ^{۳۹}Y با عنصر زیرین آن، یعنی ^{۳۱}Lu ، برابر با ۳۲ واحد است. این موضوع به این دلیل است که شمار عناصر دوره‌های پنجم و ششم با هم متفاوت است. به عبارتی عناصری که در پایین جدول دوره‌ی ای نوشته شده‌اند (عناصر با عدداتمی ۵۷ تا ۷۰ و ۸۹ تا ۱۰۲)، متعلق به دوره‌های ۶ و ۷ هستند. پس هر کدام از دوره‌های ۶ و ۷، دارای ۳۲ عنصر هستند.

شمار عناصر هر دوره از جدول دوره‌ای در جدول زیر آمده است:

شمار عناصر	شماره‌ی دوره
۲	۱
۸	۳ و ۲
۱۸	۵ و ۴
۳۲	۷ و ۶

بررسی سایر نزیههای:

۱ در دوره‌ی سوم، اختلاف عدداتمی دو عنصر گروه اول و دوم، با عناصر زیرین خود، ۸ واحد است اما از گروه سیزدهم به بعد این اختلاف برابر با ۱۸ واحد است.

۲ اختلاف عدداتمی هر عنصر در دوره‌ی دوم با عنصر زیرین خود، ۸ واحد است. زیرا هم در دوره‌ی دوم و هم در دوره‌ی سوم، ۸ عنصر وجود دارد.

۳ اختلاف عدداتمی هیدروژن با عنصر زیرین خود که لیتیم است، ۲ واحد می‌باشد اما اختلاف عدداتمی هلیم با عنصر زیرین خود که Ne است، ۸ واحد می‌باشد؛ زیرا در دوره‌ی اول ۲ عنصر و دوره‌ی دوم، ۸ عنصر وجود دارد.

گروه آموزشی ماز

۴۰- کدام یک از مطالب زیر، نادرست است؟

(۱) عنصر ^{۲۱}Cr همانند عنصر ^{۲۱}Ga در دوره‌ی چهارم و همانند عنصر ^{۴۲}Mo گروه ششم قرار دارد.

(۲) از رادیوایزوتوپ‌ها در پیشکی، کشاورزی و به عنوان سوخت در نیروگاه‌های اتمی استفاده می‌شود.

(۳) اگر عنصر کلر دارای دو ایزوتوپ طبیعی باشد، حداقل ۴ نوع مولکول Cl_2 در طبیعت وجود دارد.

(۴) از ایزوتوپ ^{۹۳}U که فراوانی آن کمتر از $1/7$ درصد در مخلوط طبیعی اورانیوم است، در راکتورهای اتمی استفاده می‌کنند.

پاسخ: گزینه ۳ (متوسط - مفهومی - ۱۰۵)

پاسخ شریحه:

اگر عنصر کلر دارای دو ایزوتوپ طبیعی باشد، ۳ نوع مولکول Cl_2 در طبیعت وجود دارد. فرض کنیم کلر دارای دو ایزوتوپ A و B است. مولکول‌های دو اتمی آن به صورت زیر است:

$$(A.A)/(B.B)/(A.B)$$

بررسی سایر نزیههای:

۱ عنصر ^{۲۱}Cr همانند عنصر ^{۲۱}Ga در دوره‌ی چهارم و همانند عنصر ^{۴۲}Mo در گروه ششم قرار دارد.

۲ رادیوایزوتوپ‌ها اگرچه بسیار خطرناک هستند، اما پیشرفت دانش و فناوری، بشر را موفق به مهار و بهره‌گیری از آن‌ها کرده است، به طوری که از آن‌ها در پیشکی، کشاورزی و سوخت در نیروگاه‌های اتمی استفاده می‌شود.

۳ از ایزوتوپ ^{۹۳}U که فراوانی آن کمتر از $1/7$ درصد در مخلوط طبیعی اورانیوم است، در راکتورهای اتمی استفاده می‌کنند. به افزایش مقدار ^{۹۳}U مخلوط طبیعی اورانیوم، غنی سازی ایزوتوپی گفته می‌شود.

گروه آموزشی ماز

۶۱- خواص شیمیابی کدام دو عنصر، مشابه یکدیگر است؟

(۱) ^{۲۷}Rb و ^{۲۹}Mg

(۲) ^{۵۳}I و ^{۹}F

(۳) ^{۶۳}Zn و ^{۴۹}In

(۴) ^{۷۵}As و ^{۱۳}S

پاسخ: گزینه ۳ (متوسط - مفهومی - ۱۰۰۱)



عناصری که در یک گروه از جدول دوره‌ای قرار دارند، خواص شیمیایی مشترکی دارند. هر دو عنصر F و I در گروه ۱۷ جدول دوره‌ای قرار دارند. F ، یک عنصر قبل از Ne (گاز نجیب دوره‌ی دوم) است؛ پس در گروه ۱۷ قرار دارد. I نیز یک عنصر قبل از Xe (گاز نجیب دوره‌ی پنجم) است؛ پس این عنصر نیز، در گروه ۱۷ قرار دارد.

بررسی سلیر نزدیکی:

۱ عنصر K در گروه ۱۶ و عنصر As در گروه ۱۵ قرار دارد.

۲ عنصر In در گروه ۱۳ و عنصر Zn در گروه ۱۲ قرار دارد.

۳ عنصر Mg در گروه ۲ و عنصر Rb در گروه ۱ قرار دارد.

گروه آموزشی ماز

- ۶۲- اگر شمار نوترون‌ها در یون Br^{-}_{25} ، Ge^{73} درصد بیشتر از شمار نوترون‌ها در اتم Ge^{73} باشد، اختلاف شمار الکترون‌ها و نوترون‌ها در یون برمید کدام است؟

۱۲ (۴)

۱۱ (۳)

۱۰ (۲)

۹ (۱)

پاسخ: گزینه ۱ (متوسط - مساله - ۱۰۰۱)



شمار نوترون‌ها در اتم Ge^{73} برابر با $40 = 32 - 72$ است. $12/5$ درصد بیشتر از عدد ۴۰ برابر است با:

$$40 + \frac{12/5}{100} \times 40 = 45$$

پس شمار نوترون‌های یون Br^{-}_{25} برابر با ۴۵ است. این یون دارای ۳۵ پروتون بوده و با دریافت یک الکترون، دارای ۳۶ الکترون نیز، است. پس اختلاف شمار نوترون و الکترون در آن برابر با $9 = 36 - 45$ است.

گروه آموزشی ماز

- ۶۳- کدام یک از مطالب زیر در مورد دوره و گروههای جدول دوره‌ای، درست است؟

(۱) تنها دو گروه، دارای ۷ عنصر هستند.

(۲) شش گروه سمت راست، دارای ۶ عنصر هستند.


(۳) ۴۳٪ از دوره‌ها، حداقل ۱۸ عنصر دارند.

(۴) سه دوره با ۸ عنصر وجود دارد.

پاسخ: گزینه ۱ (آسان - حفظی - ۱۰۰۱)



گروههای اول و هجدهم جدول دوره‌ای دارای ۷ عنصر هستند.



نکات زیر، دربراسی دقیق جدول دوره‌ای بدست من آید:

جدول دوره‌ای از ۱۸ گروه و ۷ دوره تشکیل شده است.

در دوره‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب ۱، ۲، ۳، ۸، ۸، ۱۸ و ۱۸ عنصر وجود دارد.

دوره‌ی اول فقط دارای دو عنصر با عدداتمنی ۱ و ۲ است. دوره‌ی دوم از عنصری با عدداتمنی ۳ شروع و به عنصری با عدداتمنی ۱۰ ختم می‌شود.

دوره‌ی سوم از عدداتمنی ۱۱ شروع و به ۱۸ ختم می‌شود. دوره‌ی چهارم نیز از عدد اتنی ۱۹ شروع و به ۳۶ ختم می‌شود.

در دوره‌های دوم و سوم، گروههای ۳ تا ۱۲ وجود ندارد.

بررسی سایر گروه‌ها:

۱) گروه دوم و گروه‌های ۱۳ تا ۱۷، یعنی ۶ گروه، دارای ۶ عنصر هستند اما ۶ گروه سمت راست جدول، شامل گروه‌های ۱۳ تا ۱۸ است که گروه ۱۸، دارای ۷ عنصر است.

۲) دوره‌های دوم و سوم، دارای ۸ عنصر هستند.

۳) همانطور که در سوال ۵۹ گفته شد، دوره‌های ۶ و ۷، دارای ۳۲ عنصر و دوره‌های ۴ و ۵، دارای ۱۸ عنصر هستند. پس ۴ دوره از ۷ دوره، حداقل ۱۸ عنصر دارند. درصد آن برابر است با:

$$\frac{4}{7} \times 100 = 57\%.$$

• گروه آموزشی ماز •

۶۴- کدام یک از مطالب زیر، نادرست است؟

(۱) در جدول دوره‌ای، ۱۱۸ عنصر بر اساس افزایش عدد اتمی سازماندهی شده‌اند.

(۲) در هر خانه از جدول دوره‌ای، نماد شیمیایی هر عنصر، نام و شمار پروتون‌های آن نوشته شده است.

(۳) با استفاده از داده‌های عددی نوشته شده در هر خانه از جدول دوره‌ای، شمار ذرات زیراتمی را می‌توان به دست آورد.

(۴) در هر خانه از جدول دوره‌ای، مقدار دقیق عدد جرمی نوشته شده و با کم کردن عدد اتمی از آن، می‌توان شمار نوترون‌ها را به دست آورد.

پاسخ: گزینه ۴ (آسان - حفظی و مفهومی - ۱۰۵)


پاسخ سُرچشمه‌ی:

در هر خانه از جدول دوره‌ای، عدد جرمی نوشته شده، بلکه مقدار جرم اتمی میانگین هر عنصر نوشته شده است. از آن جا که عناصرها، ایزوتوپ‌هایی با جرم‌های متفاوت دارند، مقدار عدد جرمی با جرم اتمی میانگین، اندکی تفاوت دارد.

بررسی سایر گروه‌ها:

۱) جدول دوره‌ای دارای ۱۱۸ عنصر است که بر اساس افزایش عدد اتمی سازماندهی شده‌اند.





۲) در هر خانه از جدول دوره‌ای، نماد شیمیایی، نام، شمار پروتون‌ها و جرم اتمی میانگین هر عنصر نوشته شده است. به عنوان مثال خانه‌ی مربوط به عنصر هیدروژن به صورت زیر است:



نمادها، داده‌های عددی و خلاصه نویسی‌ها در جدول دوره‌ای، اطلاعات مفیدی درباره‌ی عناصرها ارائه می‌کنند. با استفاده از این نشانه‌ها می‌توان اطلاعاتی مانند شماره‌ی گروه، دوره، شمار ذره‌های زیراتمی و... را برای یک عنصر به دست آورد.

• گروه آموزشی ماز •

۶۵- مجموع ارقام عدد اتمی عنصری که با عنصر هم دوره و با عنصر هم گروه است، با مجموع ارقام عدد اتمی عنصری که در زیر آن قرار دارد، برابر است.



پاسخ: گزینه ۲ (سخت - مفهومی - ۱۰۵)

پاسخ سُرچشمه‌ی:

عنصری که با عنصر $_{31}^{75}Ga$ هم دوره و با عنصر $_{78}^{190}Pt$ هم گروه است، $_{28}^{40}Ni$ می‌باشد. $_{28}^{40}Ni$ در گروه ۱۰ قرار دارد. عنصر زیرین آن، دارای عدد اتمی ۴۶ واحد کمتر از عدد اتمی $_{34}^{40}Se$ است. مجموع ارقام عدد اتمی هر دو عنصر برابر با ۱۰ است.

بررسی سایر گروه‌ها:

۱) عنصری که با عنصر $_{19}^{40}K$ هم دوره و با عنصر $_{8}^{18}Hg$ هم گروه است، $_{20}^{40}Zn$ می‌باشد. $_{20}^{40}Zn$ در گروه ۱۲ قرار دارد. عنصر زیرین آن، دارای عدد اتمی ۴۸ واحد کمتر از عدد اتمی $_{34}^{40}Se$ است. مجموع ارقام عدد اتمی هر دو عنصر برابر نیست.

۲) عنصری که با عنصر $_{10}^{18}Ne$ هم دوره و با عنصر $_{34}^{40}Se$ هم گروه است، $_{8}^{16}O$ می‌باشد. $_{8}^{16}O$ در گروه ۱۶ قرار دارد. عنصر زیرین آن، دارای عدد اتمی ۱۶ واحد کمتر از عدد اتمی $_{18}^{36}Ar$ است. مجموع ارقام عدد اتمی این دو عنصر با هم برابر نیست.

- ۲۰ عنصری که با عنصر Cl_{17} هم دوره و با عنصر Sr_{38} هم گروه است، Mg_{12} در گروه ۲ قرار دارد. عنصر زیرین آن، دارای عدد اتمی ۱۸ واحد بیشتر از عدد اتمی Ar_{18} است. مجموع ارقام عدد اتمی این دو عنصر با هم برابر نیست.

● گروه آموزشی ماZ ●



پاسخ: گزینه ۴ (متوسط - مفهومی - ۱۰۰)

پاسخ شریحه:

برای یافتن تعداد عناصر بین دو عنصر، کافی است از تفاضل عدداتمی آن‌ها، یک واحد کم کنیم، پس ابتدا عدد اتمی دومین و پنجمین عنصر گروه دوم را، به دست می‌آوریم. دومین عنصر گروه دوم، دومین عنصر دوره‌ی سوم است؛ پس عدد اتمی آن دو واحد از Ne ، بیشتر و برابر با ۱۲ است. پنجمین عنصر گروه دوم، دومین عنصر دوره‌ی ششم است؛ پس عدد اتمی آن دو واحد بیشتر از Xe و برابر با ۵۶ است. اختلاف عدداتمی آن دو، برابر با $= 56 - 12 = 44$ است؛ پس ۴۳ عنصر میان این دو عنصر وجود دارد.

گروه آموزشی ماز

۶۹- چند مورد از مطالب زیر، درست است؟

آ: گلوکز نشان‌دار، پس از تزریق، همراه با گلوکز معمولی در محل توده‌ی سلطانی تجمع می‌یابد.

ب: برای تشخیص توده‌ی سلطانی از گلوکز نشان‌دار که حداقل یک اتم آنم پرتوزا است، استفاده می‌شود.

پ: گلوکز نشان‌دار، همانند گلوگز طبیعی به همراه جریان خون، در سرتاسر بدن از جمله مغز و اندام‌ها توزیع می‌شود.

ت: آشکارساز پرتو، تجمع گلوکز نشان‌دار و نه گلوکز معمولی را، که در محل بافت با رشد غیرمعمولی بیشتر است، نشان می‌دهد.

۴

۳

پاسخ: گزینه ۴ (متوسط - مفهومی - ۱۰۰)

پاسخ شریحه:

همهٔ موارد درست هستند.


بررسی موارد:

(آ) گلوکز نشان‌دار، پس از تزریق، به همراه جریان خون در کل بدن توزیع می‌شود اما به دلیل مصرف زیادتر گلوکز، توسط توده‌ی سلطانی، در اطراف آن، بیشتر تجمع می‌یابد. گلوکز معمولی نیز در سراسر بدن از جمله توده‌ی سلطانی وجود دارد.

(ب) برای تشخیص توده‌ی سلطانی از گلوکز نشان‌دار که حاوی اتم پرتوزا است، استفاده می‌شود.

(پ) گلوکز نشان‌دار، به همراه جریان خون و همانند گلوکز طبیعی، در سرتاسر بدن از جمله مغز و اندام‌ها توزیع می‌شود.

(ت) آشکارساز پرتو، تجمع گلوکز نشان‌دار را، که در اطراف توده‌ی سلطانی (بافت با رشد غیرطبیعی) بیشتر است، نشان می‌دهد اما گلوکز معمولی پرتویی تولید نمی‌کند که توسط آشکارساز نمایان شود.



گروه آموزشی ماز

۷۰- در نمونه‌ای طبیعی از عنصر لیتیم، که حاوی ۵۰ اتم است، فراوانی ایزوتوپ ناپایدارتر، ۶٪ است. در این نمونه، چند نوترون وجود دارد؟

۱۸۷

۱۵۰

۱۵۳

۱۹۷

پاسخ: گزینه ۱ (متوسط - مساله - ۱۰۰)

پاسخ شریحه:

لیتیم دارای دو ایزوتوپ Li^{+3} و Li^{+7} می‌باشد. ایزوتوپ سنگین‌تر، پایدارتر بوده و فراوانی بیشتری نیز، دارد. پس فراوانی ایزوتوپ Li^{+7} ٪، ۹۴٪ و فراوانی ایزوتوپ Li^{+3} ٪، ۶٪ است. در یک نمونه‌ی ۵۰ اتمی، تعداد هر ایزوتوپ برابر است با:

$$\% Li^{+3} = 50 \times \frac{6}{100} = 3$$

$$^{7Li}: 5 \times \frac{94}{100} = 47$$

پس در این نمونه، ۳ ایزوتوپ 7Li که دارای ۳ نوترون و ۴ ایزوتوپ 7Li که دارای ۴ نوترون است، وجود دارد. پس مجموع شمار نوترون‌ها برابر است با:
 $3 \times 3 + 4 \times 4 = 197$

بنابراین در این نمونه، ۱۹۷ نوترون وجود دارد.

گروه آموزشی ماز



دیجی‌ماز، کتابخانه‌ی دیجیتال هاز

دیجی‌ماز یه پلتفرم الکترونیکی و آموزشیه که بهتون کمک میکنه در هر زمان و مکانی به کتاب‌های درسی و کمک درسی‌تون دسترسی داشته باشین و ازشون استفاده کنین.



دیجی‌ماز این بستر روبرات
فراهم میکنه تابوتونی همه‌ی
کتاب‌های رودریک اپلیکیشن
کنار هم داشته باشی و همه‌ی جا
با خودت ببریشون



تولید کمتر کاغذ به
حفظ محیط زیست‌مون
کمک میکنه



هزینه‌ی کتاب‌های الکترونیکی
خیلی کمتر از کتاب‌های
چاپ شده است



یک باره کتابی رو میخربی
ولی با هر چاپ جدید و
آپدیت محتوای کتاب،
بهش دسترسی
کامل داری!



سری کتاب‌های بیست شو ماز منتشر شد

برای ۱۰ شدن در امتحان نهایی —

تهیه‌ی کتاب بیست شو فارسی و دین و زندگی،
هم‌اکنون از طریق سایت و اپلیکیشن دیجی‌ماز

آشنایی بیشتر با امکانات اپلیکیشن و تهیه‌ی کتاب‌ها از طریق [سایت digimaze.org](http://digimaze.org)

www.Sakoye10hom.blog.ir