

بسمه تعالی

زمان: ۱۰۰ دقیقه

امتحان میان ترم اول ریاضی عمومی یک (آبان ۹۸)

نکته: برای حل هر قسمت می‌توانید از نتیجه قسمت‌های قبل اگر چه آنها را حل نکرده اید استفاده کنید.

۱. الف. تمام اعداد مختلط  $\alpha$  و  $\beta$  را باید که  $|\alpha| = |\beta| = 1$  و  $|\alpha + \beta| = -1$ . (۵ نمره)

ب. نشان دهید اگر  $|z_1| = |z_2| = |z_3|$  و  $|z_1 + z_2 + z_3| = 0$  آنگاه عدد مختلط  $\gamma$  وجود دارد که  $\{z_1, z_2, z_3\} = \{\gamma, \gamma\omega, \gamma\omega^2\}$  که در آن  $\omega$  یک ریشه سوم واحد است. (۵ نمره)

۲. نشان دهید دنباله زیر همگرا است و حد آن را بدست آورید. (۱۰ نمره)

$$a_1 = \sqrt{2}, a_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}, a_3 = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}, \dots$$

۳. الف. نشان دهید مجموعه  $\{x \in \mathbb{R} : x > 0, x^3 < 2\}$  ناتهی و دارای کوچکترین کران بالا در  $\mathbb{R}$  است که آن را در ادامه  $\gamma$  می‌نامیم. (۳ نمره).

ب. نشان دهید  $\gamma^3 = 2$ . (۴ نمره)

ج. نشان دهید  $\gamma$  گویا نیست. (۳ نمره)

موفق باشید

$$|\alpha|=|\beta|=1 \Rightarrow \alpha = \cos\theta + i \sin\theta, \quad \beta = \cos\varphi + i \sin\varphi \quad (\text{أعلاه})$$

$$\alpha+\beta=-1 \Rightarrow \sin\theta = -\sin\varphi \Rightarrow \begin{cases} \theta = \pi + \varphi & \Rightarrow \cos\theta = -\cos\varphi \Rightarrow \alpha+\beta = 0 \\ \theta = -\varphi & \Rightarrow \cos\theta = \cos\varphi \Rightarrow \alpha = \bar{\beta} \end{cases} \quad (\text{أعلاه})$$

$$\Rightarrow 2\cos\theta = -1 \Rightarrow \cos\theta = -\frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{2\pi}{3} \text{ or } -\frac{2\pi}{3} \quad (\text{أعلاه})$$

نبردین تدوین اعداد مختلط صفر برداری کنید بر ساز  
 (أعلاه)  $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$  (دورانی فرم و راه)

(أعلاه)

ب: اگر  $\gamma=0$  (رازن اعداد مختلط صفر برداری کنید با صفر برابر باشد) و در این حالت  $|z_1|=|z_r|=|z_{rp}|=1$  (أعلاه)

$$z_1+z_r+z_{rp}=0 \Rightarrow z_r \left( \frac{z_1}{z_r} + \frac{z_r}{z_{rp}} + 1 \right) = 0 \quad (\text{أعلاه})$$

$$\Rightarrow \frac{z_1}{z_r} + \frac{z_r}{z_{rp}} = -1 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{طريق اول} \\ \hline \end{array} \right. \quad \frac{z_1}{z_r} = \omega, \quad \frac{z_1}{z_{rp}} = \omega^2 \quad (\text{أعلاه})$$

$$|z_1|=|z_r|=|z_{rp}| \Rightarrow \left| \frac{z_1}{z_r} \right| = \left| \frac{z_r}{z_{rp}} \right| = 1 \quad (\text{أعلاه})$$

$$\Rightarrow \{z_1, z_r, z_{rp}\} = \{z_1\omega, z_1\omega^2, z_1\omega^3\}$$

(٢) مُعَدِّل

اسیداً توصیہ کیجئے با توصیہ یونیورسٹی دینہ درج :

$$a_1 = \sqrt{r}, \quad a_{n+1} = \sqrt{r+a_n} \quad (n \geq 1)$$

این دینہ صعودی اس :

$a_n = \sqrt{r+a_{n-1}} < \sqrt{r+a_n} = a_{n+1}$  و ایسا کہ  $a_{n-1} < a_n$  کے لئے  $a_1 < a_2$  و ایسا کہ  $a_n < a_{n+1}$  بنیاد پر بدل دیا جائے

این دینہ کران طراحت و درج :

$a_n = \sqrt{r+a_{n-1}} < \sqrt{r+r} = r$  و ایسا کہ  $a_{n-1} < r$  کے لئے  $a_1 = \sqrt{r} < r$  ایسا کہ  $a_n < r$  بنیاد پر بدل دیا جائے

(٣) مُعَدِّل

$a_n < r$  بنیاد پر بدل دیا جائے

و دینہ صعودی کی طرح کوچھ کیلئے بالآخر اسکے کیان کا  $\alpha$  ہے نام۔ بالخصوص حوصلہ دینہ صعودی کی طرح کیا جائے۔

از ربط  $a_{n+1}^2 = r + a_n$  میں ایسا نہیں  $\alpha^2 = r + \alpha$ . ایسے کیا طرح دو جاپ ۲و ۱ کے وچکا ایک دینہ صعودی دینہ صعودی کی طرح کیا جائے۔

$a_n$  سُبُّت کو مقدار ۱ کی طرح ممکن ہے۔ دیگر حد این دینہ ۲ رک۔

$$\text{مثال ٢:} \quad \text{لما} \quad (a_n < r) \quad \text{و} \quad a_{n+1} = \sqrt{r+a_n} \quad \text{لما} \quad a_{n+1} < r \quad \text{لما} \quad a_n < r$$

$a_n < r$

$$a_1 = \sqrt{r} < r, \quad a_n < r \Rightarrow a_{n+1} = \sqrt{r+a_n} < \sqrt{r+r} = r$$

لما  $a_n < r$

(دالة  $f(x) = \sqrt{x}$  متقطعة في  $x=0$  (ابنها  $\infty$  !)

$$|a_{n+1} - r| = \left| \frac{(a_{n+1} - r)(a_{n+1} + r)}{a_{n+1} + r} \right| = \frac{|a_{n+1} - r|}{a_{n+1} + r} < \frac{|(r+a_n) - r|}{r+r} = \frac{|a_n - r|}{r}$$

ويعادل  $n$  بار  $|a_n - r|$  يذهب إلى  $0$ :

$$|a_{n+1} - r| < \frac{1}{r^n} |a_1 - r| = \frac{r - \sqrt{r}}{r^n}$$

(امثلة)

:  $\exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N \quad \frac{r - \sqrt{r}}{r^n} < \varepsilon$  (طريق العدد)

$$\forall n \geq N : |a_{n+1} - r| < \frac{r - \sqrt{r}}{r^n} < \frac{r - \sqrt{r}}{r^N} < \varepsilon$$

(امثلة)

. لذا  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  متقارب من  $r$

٣٦

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x > 0, x^r < r\}$$

الف:  $a \in \mathbb{R}$  و  $\forall i = 1, 2, 3$  و  $\exists x_i \in A$  و  $\sum_{i=1}^3 x_i = a$ .

$$(\exists x \in L) \quad x > y \Rightarrow x^w > x > y \Rightarrow x \notin A$$

نیز برای خود می‌توانند این روش را در تحلیل داده‌ها و برآوردهای آنها استفاده کنند.

$$\sup A = \alpha$$

(أ) (ب) (ج) (د) (هـ)

$\vdash \exists b \in N \varphi(b) . \alpha < \beta$

$$\left\{ \begin{aligned} & \left( \alpha + \frac{1}{n} \right)^r = \alpha^r + \frac{r\alpha^{r-1}}{n} + \frac{r\alpha^r}{n^r} + \frac{1}{n^r} = \alpha^r + \frac{1}{n} \left[ r\alpha^{r-1} + \frac{r\alpha^r}{n} + \frac{1}{n^{r-1}} \right] \leq \alpha^r + \frac{1}{n} [r\alpha^{r-1} + r\alpha^r + 1] \\ & \text{Given } \frac{1}{n} < \varepsilon \text{ for all } n \in \mathbb{N}, \text{ where } \varepsilon = \frac{(r-\alpha^r)}{(r\alpha^{r-1} + r\alpha^r + 1)} > 0 \end{aligned} \right.$$

$$\left(\alpha + \frac{1}{n}\right)^r \leq \alpha^r + \frac{1}{n} [r\alpha^{r-1} + r\alpha + 1] < \alpha^r + (r - \alpha^r) = r \quad , \quad \alpha + \frac{1}{n} > 0 \Rightarrow \alpha + \frac{1}{n} \in A$$

آنچه در اینجا نشان داده شده است این است که اگر  $\alpha < \alpha + \frac{1}{n}$  باشد، آنگاه  $\alpha + \frac{1}{n} \in A$  است. بنابراین فرض  $\alpha < \alpha + \frac{1}{n}$  مغایر باشد.

حال فرض کنیم  $\alpha^r > 2$  داریم  $n \in \mathbb{N}$  برای  $\varphi_{\alpha^r}$ .

$$\left(\alpha - \frac{1}{n}\right)^r = \alpha^r - \frac{r\alpha^{r-1}}{n} + \frac{r\alpha^r}{n^2} - \frac{1}{n^r} = \alpha^r - \frac{1}{n} \left[ r\alpha^{r-1} - \frac{r\alpha^r}{n} + \frac{1}{n^{r-1}} \right] \geq \alpha^r - \frac{1}{n} [r\alpha^r + 1]$$

$$\therefore \frac{1}{n} < \varepsilon \quad \text{و هر } n \in \mathbb{N} \text{ باشد، } \varepsilon = (\alpha^r - 2) / (r\alpha^r + 1) > 0.$$

$$\left(\alpha - \frac{1}{n}\right)^r \geq \alpha^r - \frac{1}{n} [r\alpha^r + 1] > \alpha^r - (\alpha^r - 2) = 2$$

$$\alpha - \frac{1}{n} \notin A. \quad \alpha \notin A \quad \text{بنابراین } x^r > (\alpha - \frac{1}{n})^r > 2 \quad \alpha > \alpha - \frac{1}{n} \quad \text{برای } \varphi_{\alpha^r}$$

نیز  $\alpha - \frac{1}{n} \in A$  نباشد. این باتوجه به  $\varphi_{\alpha^r}$  کافی نیست. دلیل فرض  $\alpha^r > 2$  نیز نادرست است.

پس از این حالت استدلال را در آغاز بسته. بنابراین  $\alpha^r = 2$

از قسمت اول فرض  $\alpha^r > 2$  داریم  $\alpha^r > \alpha - \frac{1}{n} \Rightarrow \alpha^r > \alpha - \frac{1}{n} \Rightarrow \alpha^r > (\alpha - \frac{1}{n})^r \Rightarrow \alpha^r > (\alpha - \frac{1}{n})^r > 2$ . در نتیجه  $\alpha^r$  و  $(\alpha - \frac{1}{n})^r$  متساویاند.

ج: اگر  $\alpha = \frac{m}{n}$  باشد و  $n, m \in \mathbb{N}$  باید  $m, n$  بسبابی اول باشند (عنی  $m, n$  نسبت به  $\varphi_{\alpha^r}$  ایجاب شوند).

$$2 = \alpha^r = \frac{m^r}{n^r} \Rightarrow 2n^r = m^r \Rightarrow \text{دو قدر} \Rightarrow m = 2k \Rightarrow 2n^r = (2k)^r \Rightarrow n^r = k^r \Rightarrow n = k$$

بنابراین فرض متساقط است. بنابراین  $\alpha = \frac{m}{n}$  باشد و  $\alpha^r = 2$  است.