

نام آزمون



00:20:32

زمان مانده:

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

عنوان آزمون:

39. زمان حیاتی جهت قرار دادن مجدد دندان های دچار آوالژن در ساکت دندانپزشکی چقدر است؟

15 دقیقه ☐

60 دقیقه ☐

30 دقیقه ☒

45 دقیقه ☐

00:25:44

⌚ زمان مانده:

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

عنوان آزمون:

27. 2) به نمایان شدن هر دندان قدامی باریکتر از دندان مزیالی همسایه خود

Principle of gradation ☐

Image ☐

Outline asymmetry ☐

Law of the face ☒

عنوان آزمون: دندان پزشکی ترمیمی نظری 2 زمان مانده: 0:34:36

11. کدامیک از موارد زیر جزو مزایای استفاده از FRC بریجها نمی باشد

☒ در مقایسه با سایر ترمیم ها نیاز به ایزولاسیون کامل ندارد

☐ هزینه کمتری دارد

☐ سایش کمتری در دنتیشن مقابل ایجاد می کند

☐ زیبایی بهتری ایجاد میکنند

1. بیمار با درد در جلسه بعد از ترمیم آمالگام کلاس II مراجعه نموده است بعد از معاینه منوجه نقطه شفاف روی ترمیم آمالگام می شویم. درمان مشکل بیمار چیست؟

☐ مشاوره با متخصص لثه

☐ ترمیم مجدد با کامپوزیت

☒ اصلاح اکثرین بیمار

☐ تحویل رادیوگرافی و بررسی مشکل ریشه

صفحه: 1 از 20 تعداد سوال این صفحه: 1

مورد پاسخ ها

صفحه بعدی

11:07 AM
1/7/2021

ENG

انتخاب برای برگشت به صفحه 10 از 20

18. کدامیک از موارد زیر در رابطه با تکنیک open و closed بلیچینگ داخل تاجی دندانهای اندو شده صحیح می باشد؟

☐ در تکنیک open از کاربامید پراکساید 40% استفاده می شود

☐ طول مدت درمان در تکنیک 50% closed کاهش می یابد

☒ تکنیک closed برای بیماران مسوولیت پذیر توصیه می شود

☐ انجام تکنیک closed عملی ترمی باشد

47. کدامیک از انواع فایبرها حین استفاده در ناحیه اتصال پروتزهای ثابت استحکام شکست بیشتری دارد

Unidirectional polyethylene ☒

Woven polyethylene ☐

Woven glass ☐

Braided carbon ☐



00:37:02

⌚ زمان مانده:

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

عنوان آزمون:

8. درمان پیشنهادی برای بد رنگی ناشی از هیپر کلسیفیکاسیون عاجی کدامیک از م

office bleaching همه دندانها ☐

بلیچینگ walking ☐

بلیچینگ داخل تاجی ☐

بلیچینگ خارج تاجی با تری همان دندان ☒

نام آزمون: دندانپزشکی ترمیمی نظری 2
زمان مانده: 00:19:50

42. بیس اصلی سرامیک e.max چیست؟

- ☐ سیلیکات آلومینیوم
- ☐ سیلیکات لیتیوم
- ☒ دی سیلیکات لیتیوم
- ☐ دی سیلیکات آلومینیوم

00:36:15

⌚ زمان مانده:

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

عنوان آزمون:

9. کدامیک از ویژگیهای زیر به عنوان یکی از نقاط ضعف کامپوزیت رزین مطرح

Coefficient of thermal expansion ☐

Fracture toughness ☐

Bond to dental substrate ☒

Transverse strength ☐



نام آزمون دهنده:



00:22:30

زمان مانده:

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

عنوان آزمون:

32. وجود خط شکستگی در ناحیه اکلوزال در ترمیمهای آمالگام کلاس II به علت مشکل تراش در کدام ناحیه

☐ کف پالپال حفره

☐ لابین انگل داخلی

☐ کف جینجیوال حفره

☒ لابین انگل خارجی

عنوان آزمون: دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

زمان مانده: 00:20:17

40. Deflection کاسپی از عوارض مربوط به کدام ویژگی کامپوزیت رزین میباشد؟

☐ میکرولیکیج

☒ انقباض پلیمریزاسیون

☐ جذب آب

☐ تشکیل گپ مارژینال

21. در کدامیک از تغییر رنگهای دندانی درگیری دندانهایی که دیرتر رویش می کنند مثل پرمولرها بیشتر از بقیه می باشد؟

☒ تغییر رنگ ناشی از فلوروزیس

☐ تغییر رنگ ناشی از سن

☐ تغییر رنگ خارجی

☐ تغییر رنگ ناشی از تتراسایکلین

13. در یک فرد نوجوان که دچار فقدان مادرزادی لترال های فک بالا می باشد و از طریق ارتودنسی فضاها پر کدام بریج محافظه کارانه تجویز می شود؟

☒ یونتیگ تمام یوسلن

☐ مریلند

☐ ادهیژن بریج

☐ روشت

45. شکل مناسب پونتیک برای ساخت پونتیک دندان طبیعی در ناحیه تنایای ماگزینا در همان جلسه کشیدن دندان کدام

Ovate ☐

Hygienic ☐

Ridge-lap ☐

modified Ridge-lap ☒

عنوان آزمون: دندانپزشکی ترمیمی نظری 2 زمان مانده: 00:34:20 نام آزمون

12. کدامیک از گزینه های زیر در مورد تغییر رنگ ناشی از تترا سایکلین صحیح می باشد؟
- ☐ با تابش اشعه ماورا بنفش به دندان مبتلا به بد رنگی تترا سایکلین بد رنگی کمتر نمایان می شود.
 - ☐ مشتقات تترا سایکلین قادر به عبور از جفت در بارداری نمی باشند.
 - ☒ تغییر رنگ ناشی از مصرف تترا سایکلین هم قبل و هم بعد از شکل گیری دندان می تواند رخ دهد.
 - ☐ تترا سایکلین از طریق اتصال به یون فسفر و تشکیل تترا سایکلین ارتو فسفات به عاج متصل می گردد.

نام آزمون دهنده:

00:22:14

زمان مانده:

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

عنوان آزمون:

33. میزان مصرف کلر هگزیدین در درمان ضایعات سطح ریشه چه میزانی می باشد؟

☐ یک هفته شبها قبل خواب

☐ 2 بار در روز 2 هفته

☐ 2 بار در روز به مدت 2 ماه

☒ هر 8 ساعت یکبار به مدت یک هفته

عنوان آزمون: دندان پزشکی ترمیمی نظری 2 زمان مانده: 12

46. رایجترین Failure مربوط به ترمیمهای کامپوزیتی چیست؟

☐ یوسیدگی ثانویه

☐ Staining

☐ Marginal fracture

☒ Bulk fracture

6. استفاده از مابیل جهت جسیانندن اینله سرامیکی ، باعث افزایش چه نوع گیری میشود؟

☐ فیزیکی

☒ میکرو مکانیکی

☐ شیمیایی

☐ مکانیکی

نام آزمون



00:24:10

زمان مانده:

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

عنوان آزمون:

30. تکنیک مستقیم برای ونیر کردن دندانها برای کدام یک از موارد زیر منطقی تر میباشد؟

☐ هنگام نیاز به ونیر کردن تعداد زیادی از دندانهای بد رنگ

☐ بیماران مسن

☒ برای بیمارانی که مشکل اقتصادی دارند

☐ زمانی که بیمار مشکلی با طول کشیدن پروسه درمان ندارد

10. کدامیک از ویژگیهای ماده کور ایده آل میباشد؟

Modulus of elasticity بالا ☐

Compressive strength پایین ☐

Fracture toughness پایین ☒

Coefficient of thermal expansion بیشتر نسبت به عاج ☐

3. کدام گزینه به نحو مطلوب پروسه ادهیزن به عاج را نشان می‌دهد؟

☐ تشکیل تک‌های رینی بین مشوره‌های میانی

☐ هم‌پوشانی عاج

☒ تشکیل تک‌های رینی داخل نوبه‌های عاجی

☐ تشکیل تاند هم‌پوشانی بین الیاف کلان عاج بصورت پیره

انتخاب برای برگشت به صفحه (10 از 10)

صفحه: 3 از 5 تعداد سوال این صفحه: 1

سوال صحیح

صفحه بعدی

11:01 AM
1/16/2021

نام آزمون

00:24:25

زمان مانده:

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

عنوان آزمون:

29. کدام گزینه در مورد اثر کاربرد برخی مواد شیمیایی طی مراحل درمان ریشه بر ساختار دندان

- ☐ واکنش EDTA و هیپوکلریت سدیم با جز معدنی عاج
- ☒ واکنش هیپوکلریت با جز آلی و EDTA با جز معدنی عاج
- ☐ واکنش EDTA و هیپوکلریت سدیم با جز آلی عاج
- ☐ واکنش هیپوکلریت با جز معدنی و EDTA با جز آلی عاج

38. در صورت برهم خوردن تناسب ارتفاع به قاعده کاسپ در دندانهای دارای حفره دسترسی، بهترین راه مقابله با افزایش احتمال

☒ کوتاه کردن کاسپ

☐ استفاده از فایبر پست

☐ تجویز اینله زیبایی باند شونده

☐ استفاده از پست پیش ساخته فلزی

نام آزمون



00:23:27

زمان مانده:

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

عنوان آزمون

31. کدامیک از گزینه های زیر در مورد مواد سفید کننده صحت دارد؟
- ☒ برومبه پیوسیدگی موجود دندانها در هنگام استفاده از کاربامید پراکساید سریع تر پیش می رود.
- ☐ Active time کاربامید پراکساید کمتر از هیدروژن پراکساید میباشد.
- ☐ استفاده روزانه 2-4 ساعت برای هوم بلیچینگ هنگام کاربرد هیدروژن پراکساید توصیه می شود.
- ☐ PH هیدروژن پراکساید در حین درمان تغییر نمی یابد.

14. کدام گزینه در مورد سمانهای سلف ادهسیو مورد استفاده جهت چسباندن پستهای بیش ساخته صحیح میباشد

- ☐ قابلیت باند شیمیایی به هیدروکسی آپاتیت
- ☐ خصوصیات مکانیکی قویتر نسبت به سمان رزینی کانوشنال
- ☒ دارای مراحل مجزا دمنرالیزاسیون و نفوذ به نسج دندانی
- ☐ درجه کانورژن بالاتر

2. کدامیک از موارد زیر، جزو گستراندیکاسیونهای ترمیمهای غیرمستقیم همرنگ دندان نیست؟

Deep subgingival preparations ☒

Heavy occlusal forces ☐

Ability to maintain a dry field ☐

Bruxism ☐

24. برای دندان مولر چپ بالا با تخریب متوسط تاجی و وجود یک کاسپ سالم، طرح درمان مناسب چیست؟

☐ درمان محافظه کارانه با مواد ترمیمی مستقیم

☒ ترمیم تاجی با مواد ترمیمی مستقیم + بست بیش ساخته + روکش


☐ بست ریختگی + روکش

☐ انله MOD بدون بست

نام: 00:24:45 زمان مانده: دندانپزشکی ترمیمی نظری 2 عنوان آزمون:

28. طبق نظریه Lynch کدام عامل بهترین شاخص فعالیت میکروبیولوژیک پوسیدگی ریش

- ☐ رنگ ضایعه
- ☒ قوام سطحی
- ☐ محل ضایعه
- ☐ وسعت ضایعه



تلاش

00:19:54

www.daneshgoh.com

تست تخصصی مهندسی معماری 2

تلاش

41. فاصله مارجین جینتبول تراش در یوسیدگی های زیر که حد اکثر حد سلیست می باشد

3 میلیمتر ☐

2 میلیمتر ☐

1 میلیمتر ☒

4 میلیمتر ☐

6. استفاده از سابلین جهت چسباندن اینله سرامیکی ، باعث افزایش چه نوع گیری میشود؟

☐ فیزیکی

☐ میکرو مکانیکی

☒ شیمیایی

☐ مکانیکی

یا

➤ صفحه بعدی

بروز پاسخ ها

نام آزمون ده



00:32:50

⌚ زمان مانده:

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

عنوان آزمون:

16. کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟

☐ دندانهای اندو شده را نمی توان ونیر کرد.

☐ دندان شکسته قدامی را در مواردی که شکستگی زیاد وسیع نباشد می توان ونیر کرد.

☒ در مواردی که ساییش روی دندان وجود داشته باشد نباید آن را ونیر کرد.

☐ جهت اصلاح دیاستم در دندانهای قدامی حتما باید از رستوریشن های تمام سرامیک استفاده کرد.

نام آزمون

00:26:40

زمان مانده:

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

عنوان آزمون:

26. به منظور کاهش اثر بازدارندگی اوژنول بر پلیمریزاسیون سمان رزینی کدام گزینه صحیح است؟

☐ کاربرد عامل اچینگ

☐ حذف عاج حاوی اوژنول

☒ آماده سازی فضای پست بلافاصله بعد از پر کردن کانال

☐ کاربرد عوامل باندینگ

نام آزمون دهند



00:21:47

زمان مانده:

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

عنوان آزمون

34. حداکثر میزان دیده شدن لته در یک لبخند کامل وایده آل حداکثر چند میلیمتر می باشد؟

1 تا 2 میلیمتر ☒

3 تا 4 میلیمتر ☐

5 تا 6 میلیمتر ☐

4 تا 5 میلیمتر ☐

نام آزمون



00:19:01

زمان مانده:

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

عنوان آزمون:

44. معمولا مارجین لته ای تراش برای قرار دادن ونیر در کدام ناحیه ختم می شود؟

Free gingival crest کوتاهتر از ☐

Free gingival crest اییکالی تر از ☐

Free gingival crest در حد ☒

Free gingival crest بلندتر از ☐

عنوان آزمون: دندانپزشکی ترمیمی نظری 2
زمان مانده: 00:33:11
نام آزمون دهنده: علیر

15. کدام ویژگی از رنگ دندانها با گذشت سن کاهش می یابد.

Hue ☐

Maverick colors ☐

Chroma ☐

Value ☒

نام آزمون دهنده



00:20:50

زمان مانده:

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

عنوان آزمون:

37

بیماری درمان ترمیمی دندان قدامی درمان ریشه شده خود مراجعه کرده است. در بررسی بالینی مارژینال باشد، طرح درمان مناسب چیست؟

☒ پست ریختگی + کراون

☐ پست پیش ساخته + کور کامپوزیتی + کراون

☐ ونیر سرامیکی باند شونده

☐ پست پیش ساخته + بیلداپ کامپوزیتی

نام آزمون ده



00:19:25

زمان مانده:

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

عنوان آزمون:

43. اج الکترولیتی سطح داخلی فریم فلزی در کدامیک از انواع بریج های محافظه کارانه کاربرد دارد

✓ مرینند

روشت

اد هیژن بریج

کارولینا

19. کدامیک از موارد زیر در مورد کامپوزیتهای تقویت شده با فایبر صحیح نمی باشد

☐ استفاده از کامپوزیتهای تقویت شده با فایبر های کوتاه در دندانهای خلفی مقاومت به سایش و شکست را افزایش می دهد

☐ اتصال دیواره های باکال و لینگوآلی توسط فایبر با افزایش flexural strength دندان اندو شده می شود

☐ طول کوتاه و ناکافی فایبر ها یکی از دلایل عدم موفقیت آنها می باشد

☒ در مورد استفاده از تکنیک overlay نیازی به پوشاندن فایبر با کامپوزیت وجود ندارد

5. کدامیک از موارد زیر در رابطه با carbapol موجود در بعضی محصولات کاربامید پراکساید صدق نمی کند؟

☒ عنوان Diluting agent استفاده می شود

☐ shelf life ماده پلیچینگ را بهبود می بخشد

☐ میزان آزاد سازی ماده فعال را طولانی تر می کند

☐ پلیمری محلول در آب می باشد

00:21:30

⌚ زمان مانده:

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

عنوان آزمون:

35. کدامیک از گزینه های زیر در مورد ماکرو ابریژن صحیح نمی باشد؟

☐ توسط فرز 12 - fluted composite finishing انجام می گیرد.

☐ باید با فشار ملایم و منقطع انجام شود.

☒ با هندبیس Low - speed انجام می گیرد.

☐ بالیش نهایی آن با abrasive rubber point انجام می شود.

عنوان آزمون: دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

زمان مانده: 1:20

36. در اینله های سرامیکی جهت Block out کردن اندرگانه های کوچک از چه ماده ای استفاده میشود؟

☐ کمپوزیت میکروفیل

☒ گلس آینومر تقویت شده با رزین

☐ ادهزیوهای یونیورسال

☐ کمپوزیت هیبرید

4. کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟

☐ براحتی می شود تیرگی لبه اتسیرال دندانهای ترانسلوکسنت را با بلیچینگ اصلاح نمود.

☐ مانعی برای بلیچ کردن دندانهای قدامی با اکسپوزر ریشه وجود ندارد.

☐ مانعی برای هوم بلیچینگ دندانهای فردی که مشکل مفصل تمپورو مندیبولار دارد وجود ندارد.

☒ سفیدی مطلوب دندانهای قدامی زمانی است که برنگ سفیدی چشم بیمار باشد.

7

تراش در محدوده مینا جهت قرار دادن ونیر روی دندانها به کدام دلیل زیر توصیه می شود؟

☐ مینا جهت حفظ نسج دندان اینکار در همه موارد بدون تراش (No Prep) انجام می گیرد.

☐ عاج برای ایجاد یک سطح صاف برای بهبود باندینگ

☒ برای ایجاد یک finishing line مشخص

☐ برای ایجاد لایه نعلی از فلوراید در مینا متعاقب تراش

نام آزمون

00:26:49

زمان مانده:

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

عنوان آزمون:

25. علت ضرورت توجه به ثبات اضافی رستوریشن در دندانهای قدامی درمان ریشه شده چیست

☐ اعمال نیروهای سنگین اکلوژالی

☒ جهت اترالی بردار نیروهای فانکشنال

☐ عدم وجود فیدبک حسی در دندانهای درمان ریشه شده

☐ جهت عمودی بردار نیروهای فانکشنال