

زیست شناسی ۲

پایه یازدهم

دکتر رضا مقدسی

دکتری تخصصی نوروفیزیولوژی از دانشگاه شهید چمران اهواز

کارشناسی ارشد فیزیولوژی از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی زیست شناسی از دانشگاه خوارزمی تهران



حواشی

BIOLOGY 2

Reza Moghaddasi

Ph.D in Neurophysiology

Biology teacher in high school

Email: ghr.moghaddasi@gmail.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

زیست شناسی (۲)

رشته علوم تجربی

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه

فصل ۶ - تقسیم یاخته

۷۹

گفتار ۱ - فام تن (کروموزوم)

۸۰

گفتار ۲ - رشتمان (میتوز)

۸۴

گفتار ۳ - کاستمان (میوز) و تولیدمثل جنسی

۹۲

فصل ۷ - تولیدمثل

۹۷

گفتار ۱ - دستگاه تولیدمثل در مرد

۹۸

گفتار ۲ - دستگاه تولیدمثل در زن

۱۰۲

گفتار ۳ - رشد و نمو جنین

۱۰۸

گفتار ۴ - تولیدمثل در جانوران

۱۱۵

فصل ۸ - تولیدمثل نهان دانگان

۱۱۹

گفتار ۱ - تولیدمثل غیر جنسی

۱۲۰

گفتار ۲ - تولیدمثل جنسی

۱۲۴

گفتار ۳ - از یاخته تخم تا گیاه

۱۳۰

فصل ۹ - پاسخ گیاهان به محرک‌ها

۱۳۷

گفتار ۱ - تنظیم کننده‌های رشد در گیاهان

۱۳۸

گفتار ۲ - پاسخ به محیط

۱۴۶

فصل ۱ - تنظیم عصبی

۱

گفتار ۱ - یاخته‌های بافت عصبی

۲

گفتار ۲ - ساختار دستگاه عصبی

۹

فصل ۲ - حواس

۱۹

گفتار ۱ - گیرنده‌های حسی

۲۰

گفتار ۲ - حواس ویژه

۲۳

گفتار ۳ - گیرنده‌های حسی جانوران

۳۳

فصل ۳ - دستگاه حرکتی

۳۷

گفتار ۱ - استخوان‌ها و اسکلت

۳۸

گفتار ۲ - ماهیچه و حرکت

۴۵

فصل ۴ - تنظیم شیمیایی

۵۳

گفتار ۱ - ارتباط شیمیایی

۵۴

گفتار ۲ - غده‌های درون‌ریز

۵۶

فصل ۵ - ایمنی

۶۳

گفتار ۱ - نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع

۶۴

گفتار ۲ - دومین خط دفاعی: واکنش‌های عمومی اما سریع

۶۶

گفتار ۳ - سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی


۷۲



بدن چگونه اطلاعات گوناگون را دریافت می‌کند و به آنها پاسخ می‌دهد؟ چرا گاهی تماس ساعت یا عینک با پوست خود را احساس نمی‌کنیم؟ چرا فردی که تحت عمل جراحی قرار دارد، دردی احساس نمی‌کند؟ چرا برخی جانوران می‌توانند اطلاعاتی را دریافت کنند که ما بدون استفاده از ابزار مناسب، نمی‌توانیم آنها را درک کنیم؟

گیرنده حسی، یاخته یا بخشی از آن است که اثر محرک را دریافت می‌کند و اثر محرک در آن به پیام عصبی تبدیل می‌شود. صدا، فشار، اکسیژن، گرما و نور نمونه‌هایی از این محرک‌ها هستند که هر کدام گیرنده ویژه‌ای را در بدن تحریک می‌کنند. گیرنده‌های حسی انسان گوناگون‌اند؛ ولی می‌توان آنها را براساس نوع محرک، در پنج دسته کلی طبقه‌بندی کرد: گیرنده‌های مکانیکی، شیمیایی، دمایی، نوری و درد. در ادامه درس با این گیرنده‌ها آشنا می‌شوید.

شکل ۱- ایجاد پیام عصبی به وسیله گیرنده فشار.
الف) ساختار گیرنده،
ب) وارد آمدن تحریک (فشار)
پ) تبدیل اثر محرک به پیام عصبی (هدایت پیام عصبی)



Types of Sensory Receptors

- **Based on the energy they transduce, sensory receptors fall into five categories**
 - 1. Mechanoreceptors**
 - 2. Chemoreceptors**
 - 3. Electromagnetic receptors**
 - 4. Thermoreceptors**
 - 5. Pain receptors**

Mechanoreceptors

- **Mechanoreceptors sense physical deformation**
 - **Caused by stimuli such as pressure, stretch, motion, and sound**

Chemoreceptors

- **Chemoreceptors include**
 - **General receptors that transmit information about the total solute concentration of a solution**
 - **Specific receptors that respond to individual kinds of molecules**

Electromagnetic Receptors


- **Electromagnetic receptors detect various forms of electromagnetic energy**
 - **Such as visible light, electricity, and magnetism**

Thermoreceptors

- **Thermoreceptors, which respond to heat or cold**
 - **Help regulate body temperature by signaling both surface and body core temperature**

Pain Receptors

- **In humans, pain receptors, also called nociceptors**
 - **Are a class of naked dendrites in the epidermis**
 - **Respond to excess heat, pressure, or specific classes of chemicals released from damaged or inflamed tissues**



(a) **Crayfish stretch receptors** have dendrites embedded in abdominal muscles. When the abdomen bends, muscles and dendrites

stretch, producing a receptor potential in the stretch receptor. The receptor potential triggers action potentials in the axon of the stretch

receptor. A stronger stretch produces a larger receptor potential and higher frequency of action potentials.

Figure 49.2a


گیرنده‌ها سازش پیدا می‌کنند

شاید توجه کرده باشید که بوی غذا یا عطر را پس از گذشت مدتی، دیگر احساس نمی‌کنیم. در این حالت، آیا مولکول‌های بودار در محیط کم می‌شوند، یا گیرنده‌های بو درست کار نمی‌کنند؟ وقتی گیرنده‌ها مدتی در معرض محرک ثابتی قرار گیرند، پیام عصبی کمتری ایجاد می‌کنند، یا اصلاً پیامی ارسال نمی‌کنند. این پدیده را سازش گیرنده‌ها می‌نامند. سازش گیرنده‌ها چه فایده‌ای دارد؟

حواس را به دو گروه تقسیم می‌کنند

گروهی از گیرنده‌ها مانند گیرنده‌های دما در بخش‌های گوناگون بدن پراکنده‌اند و گروهی از گیرنده‌های بدن ما در اندام‌های ویژه‌ای قرار دارند؛ مانند گیرنده‌های بینایی در چشم. از این رو، حواس را به دو گروه حواس پیکری و حواس ویژه تقسیم کرده‌اند. در ادامه درس با کار هر گروه از این حواس آشنا می‌شوید.

در بخش‌های گوناگون بدن مانند پوست، ماهیچه‌های اسکلتی و زردپی‌ها، گیرنده‌هایی به نام گیرنده‌های حس‌های پیکری وجود دارند. حس‌های پیکری شامل حس تماس، دما، وضعیت و دردند. انتهای دارینه آزاد، مانند گیرنده‌های درد، یا انتهای دارینه‌هایی درون پوششی از بافت پیوندی مانند گیرنده فشار در پوست، نمونه‌هایی از




گیرنده‌های تماسی، گیرنده‌های مکانیکی اند که با تماس، فشار یا ارتعاش تحریک می‌شوند (شکل ۲). این گیرنده‌ها، مثلاً در پوست وجود دارند. تعداد گیرنده‌های تماس در پوست بخش‌های گوناگون بدن متفاوت است و بخش‌هایی که تعداد گیرنده‌های بیشتری دارند، مانند نوک انگشتان و لب‌ها، حساس‌ترند.

گیرنده‌های دمایی در بخش‌هایی از درون بدن، مانند برخی سیاهرگ‌های بزرگ و پوست جای دارند. گیرنده‌های دمایی درون بدن به تغییرات

دمای درون بدن و گیرنده‌های دمایی پوست به تغییرات دمای سطح بدن حساس‌اند؛ در نتیجه سرما یا گرما را دریافت می‌کنند.

— A hair cell found in vertebrates




(b) Vertebrate hair cells have specialized cilia or microvilli ("hairs") that bend when surrounding fluid moves. Each hair cell releases an excitatory neurotransmitter at a synapse

with a sensory neuron, which conducts action potentials to the CNS. Bending in one direction depolarizes the hair cell, causing it to release more neurotransmitter and increasing frequency

of action potentials in the sensory neuron. Bending in the other direction has the opposite effects. Thus, hair cells respond to the direction of motion as well as to its strength and speed.

Figure 49.2b

فعالیت گیرنده‌های مکانیکی **حس وضعیتی** موجب می‌شود که مغز از چگونگی قرارگیری قسمت‌های مختلف بدن نسبت به هم، هنگام سکون و حرکت اطلاع یابد. گیرنده‌های حس وضعیتی در ماهیچه‌های اسکلتی، زردپی‌ها و کپسول پوشاننده مفصل‌ها قرار دارند و به کشیده شدن حساس‌اند. مثلاً وقتی دست خود را حرکت می‌دهید، گیرنده‌های درون ماهیچه کشیده و تحریک می‌شوند.



شکل ۳. گیرنده‌های حس وضعیتی
در زردپی

گیرنده‌های درد در پوست و برخی بخش‌های دیگر بدن مانند دیواره سرخرگ‌ها قرار دارند. گیرنده‌های درد به آسیب بافتی پاسخ می‌دهند. آسیب بافتی در اثر عوامل مکانیکی مثل بریدگی، سرما یا گرمای شدید و برخی مواد شیمیایی مثل لاکتیک اسید ایجاد می‌شود. گیرنده‌های درد سازش پیدا نمی‌کنند. در نتیجه، این پدیده کمک می‌کند مادامی که محرک آسیب‌رسان وجود دارد، فرد از وجود محرک اطلاع داشته باشد.


درد یک سازوکار حفاظتی است. هرگاه یاخته‌ها در معرض تخریب قرار گیرند، درد ایجاد و موجب می‌شود که فرد برای برطرف کردن عامل ایجاد درد، واکنش مناسب نشان دهد؛ مثلاً نشستن طولانی مدت ممکن است موجب آسیب دیدن پوست در محل نشیمن‌گاه شود. بنابراین، فرد به طور ناخودآگاه تغییر وضعیت می‌دهد؛ در غیر این صورت، پوست در نقاط تحت فشار تخریب می‌شود.


گیرنده‌های حواس ویژه شامل گیرنده‌های حس بینایی، شنوایی، تعادل، بویایی و چشایی اند که در اندام‌های حسی قرار دارند. این گیرنده‌ها در کدام بخش هر یک از این اندام‌ها قرار دارند؟

بینایی

بیشتر اطلاعات محیط پیرامون را از راه دیدن و به کمک اندام حس بینایی، یعنی چشم دریافت می‌کنیم. کره چشم در حفره استخوانی کاسه چشم قرار دارد. ماهیچه‌هایی که به کره چشم متصل‌اند، آن را حرکت می‌دهند. این ماهیچه‌ها را در فعالیت تشریح چشم می‌توانید ببینید. پلک‌ها، مژه‌ها، بافت چربی روی کره چشم و اشک از چشم حفاظت می‌کنند. در شکل ۴ ساختار کره چشم را می‌بینید.


ساختار کره چشم: خارجی ترین لایه کره چشم از صلیبیه و قرنیه تشکیل شده است. صلیبیه پرده ای سفید رنگ، محکم و قرنیه پرده شفاف جلوی چشم است. لایه میانی چشم شامل مشیمیّه، جسم مزگانی و عنیبّه است. مشیمیّه لایه ای رنگدانه دار و پر از مویرگ های خونی است.





شکل ۵- الف) گیرنده‌های نوری و یاخته‌های عصبی شبکه‌ای * طرح سؤال از این شکل مجاز نیست.

پرده شبکیه از راه عصب بینایی با مغز ارتباط دارد. بعدها ابن سینا، ابوریحان بیرونی و دیگران نظر او را پذیرفتند. ترجمه کتاب او برای سال‌ها، یکی از کتاب‌های درسی دانشگاه‌های اروپا بود.



شکل ۵- ب) گیرنده‌های نوری (رنگ‌های تصاویر واقعی نیستند)

اثر نور بر شبکیه: پرتوهای نور از قرنیه می‌گذرند و به علت انحنای آن همگرا می‌شوند. این پرتوها از زلالیه، سوراخ مردمک، عدسی و زجاجیه عبور می‌کنند. عدسی، پرتوهای نور را روی شبکیه و گیرنده‌های نوری آن متمرکز می‌کند.

یاخته‌های استوانه‌ای در نور کم و یاخته‌های مخروطی در نور زیاد تحریک می‌شوند. گیرنده‌های مخروطی، تشخیص رنگ و جزئیات اجسام را امکان‌پذیر می‌کنند. بخشی از شبکیه را که در امتداد محور نوری کره چشم قرار دارد، لکه زرد می‌نامند. این بخش در دقت و تیزبینی اهمیت دارد؛ زیرا گیرنده‌های مخروطی در آن فراوان‌ترند.

با برخورد نور به شبکیه، ماده حساس به نور، درون گیرنده‌های نوری تجزیه می‌شود و واکنش‌هایی را به راه می‌اندازد که به ایجاد پیام عصبی منجر می‌شود. ویتامین A برای ساخت ماده حساس به نور لازم است.

شکل ۶- تطابق برای دیدن اجسام
الف) نزدیک




ب) دور



تطابق: با تغییر همگرایی عدسی چشم، می توان اجسام دور و نزدیک را واضح دید. هنگام دیدن اشیای نزدیک، با انقباض ماهیچه های جسم مژگانی، عدسی ضخیم می شود. وقتی به اشیای دور نگاه می کنیم با استراحت این ماهیچه ها، عدسی باریک تر می شود. به این ترتیب، تصویر در هر حالت روی شبکیه تشکیل می شود. این فرایندها تطابق نام دارد (شکل ۶).


- **Humans and other mammals**

- **Focus light by changing the shape of the lens**



- Rods contain the pigment rhodopsin

- Which changes shape when it absorbs light



(a) Rods contain the visual pigment rhodopsin, which is embedded in a stack of membranous disks in the rod's outer segment. Rhodopsin consists of the light-absorbing molecule retinal bonded to opsin, a protein. Opsin has seven α helices that span the disk membrane.

(b) Retinal exists as two isomers. Absorption of light converts the *cis* isomer to the *trans* isomer, which causes opsin to change its conformation (shape). After a few minutes, retinal detaches from opsin. In the dark, enzymes convert retinal back to its *cis* form, which recombines with opsin to form rhodopsin.

Figure 49.20a, b

- **Absorption of light by retinal**

- **Triggers a signal transduction pathway**





Figure 49.21

- **In the light, rods and cones hyperpolarize**

- **Shutting off their release of glutamate**

- **The bipolar cells**

- **Are then either depolarized or hyperpolarized**



Fi

- **Three other types of neurons contribute to information processing in the retina**

- **Ganglion cells, horizontal cells, and amacrine cells**




Figure 49.23

- **Signals from rods and cones**
 - Travel from bipolar cells to ganglion cells
- **The axons of ganglion cells are part of the optic nerve**
 - That transmit information to the brain








Figure 49.24



الف) چشم نزدیک بین و اصلاح آن

ب) چشم دور بین و اصلاح آن
شکل ۷- اصلاح نزدیک بینی و دور بینی

الف)



A

بیماری های چشم

برای دیدن درست اجسام، قرنیه، عدسی و کره چشم باید شکل ویژه ای داشته باشند، تا پرتوهای نور به طور دقیق روی شبکیه متمرکز شوند.

نزدیک بینی و دور بینی: در افراد نزدیک بین، کره چشم بیش از اندازه بزرگ است و پرتوهای نور

اجسام دور، در جلوی شبکیه متمرکز می شوند. در نتیجه فرد، اجسام دور را واضح نمی بیند.

در فرد دور بین، کره چشم از اندازه طبیعی کوچک تر است و پرتوهای نور اجسام نزدیک در پشت

شبکیه متمرکز می شوند و فرد این اجسام را واضح نمی بیند.

آستیگماتیسم: اگر سطح عدسی یا قرنیه کاملاً کروی و صاف نباشد، پرتوهای نور به طور نامنظم به هم می رسند و روی یک نقطه شبکیه متمرکز نمی شوند. در نتیجه تصویر واضحی تشکیل نمی شود. در این حالت، چشم دچار آستیگماتیسم است (شکل ۸). برای اصلاح دید این فرد از عینکی استفاده می کنند که عدسی آن عدم یکنواختی انحنای قرنیه یا عدسی را جبران می کند.

پیر چشمی: با افزایش سن، انعطاف پذیری عدسی چشم کاهش پیدا می کند و تطابق دشوار می شود. این حالت را پیر چشمی می گویند که به کمک عینک های ویژه اصلاح می شود.


تشریح چشم



شکل ۱- بالا و پایین چشم



شکل ۲- چشم راست



شکل ۴- بخش های درونی چشم



شکل ۳- کره چشم برش خورده

پس از انجام تشریح و با استفاده از مشاهده های خود، به این پرسش ها پاسخ دهید.

الف) ویژگی های هر یک از سه لایه چشم و بخش های تشکیل دهنده آنها را بیان کنید.


ب) زجاجیه و زلالیه را با یکدیگر مقایسه کنید.


از فعالیت خود گزارش تهیه کنید و به معلم ارائه دهید.



لایه درخشان در چشم گاو

گیرنده‌های مکانیکی درون گوش، در شنیدن و حفظ تعادل بدن نقش دارند. این گیرنده‌ها در کدام بخش‌های گوش قرار گرفته‌اند؟ همان‌طور که آموخته‌اید، گوش از سه بخش بیرونی، میانی و درونی تشکیل شده است (شکل ۹).





تبدیل صدا به پیام عصبی: امواج صوتی پس از عبور از مجرای شنوایی، به پرده صماخ برخورد می کنند و آن را به ارتعاش درمی آورند. دسته استخوان چکشی روی پرده صماخ چسبیده و با ارتعاش آن می لرزد و استخوان های سندان و رکابی را نیز به ارتعاش درمی آورد. کف استخوان رکابی طوری روی دریچه ای به نام دریچه بیضی قرار گرفته است که لرزش آن، دریچه را می لرزاند. این دریچه پرده ای نازک است که در پشت آن، بخش حلزونی گوش قرار دارد. بخش حلزونی را مایعی پر کرده است. لرزش دریچه بیضی، مایع درون حلزون را به لرزش درمی آورد.

همان طور که در شکل ۱۰ می بینید، در بخش حلزونی یاخته های مژک داری قرار دارند که مژک هایشان با پوششی ژلاتینی تماس دارند. این یاخته ها، گیرنده های مکانیکی اند که با لرزش مایع درون بخش حلزونی، مژک های آنها خم می شود. در نتیجه کانال های یونی غشای آنها باز و این یاخته ها تحریک می شوند. در نتیجه بخش شنوایی عصب گوش پیام عصبی ایجاد شده را به مغز می برد (شکل ۱۰).

• Exploring the structure of the human ear




Figure 49.8

- **These vibrations create pressure waves in the fluid in the cochlea**
 - **That travel through the vestibular canal and ultimately strike the round window**




Figure 49.9

- **The cochlea can distinguish pitch**

- **Because the basilar membrane is not uniform along its length**




Figure 49.10

• The utricle, saccule, and semicircular canals in the inner ear

— Function in balance and equilibrium





Figure 49.11

The utricle and saccule tell the brain which way is up and inform it of the body's position or linear acceleration.

The hairs of the hair cells project into a gelatinous cap called the cupula.

Bending of the hairs increases the frequency of action potentials in sensory neurons in direct proportion to the amount of rotational acceleration.



شکل ۱۲- گیرنده های بویایی

گیرنده های بویایی در سقف حفره بینی قرار دارند. مولکول های بودارِ هوای تنفسی این یاخته ها را تحریک می کنند. این یاخته ها پیام های بویایی را به لوب های (پیازهای) بویایی مغز که در تشریح مغز آنها را مشاهده کردید، می برند. پیام بویایی سرانجام به قشر مخ ارسال می شود (شکل ۱۲).

- **When odorant molecules bind to specific receptors**
 - **A signal transduction pathway is triggered, sending action potentials to the brain**





Figure 49.15

در دهان و برجستگی‌های زبان **جوانه‌های چشایی** و درون این جوانه‌ها **گیرنده‌های چشایی** قرار گرفته‌اند. ذره‌های غذا در بزاق حل می‌شوند و یاخته‌های گیرنده‌ی چشایی را تحریک می‌کنند. (شکل ۱۳).

انسان پنج مزه اصلی شیرینی، شوری، ترشی، تلخی و مزه اومامی را احساس می‌کند. اومامی، کلمه‌ای ژاپنی به معنای لذیذ است که برای توصیف یک مزه مطلوب که با چهار مزه دیگر تفاوت دارد، به کار می‌رود، اومامی مزه غالب غذاهایی است که آمینواسید گلوتمات دارند، مانند عصاره گوشت. حس بویایی در درک درست مزه غذا تأثیر دارد؛ مثلاً وقتی سرماخورده و دچار گرفتگی بینی شده‌ایم، مزه غذاها را به درستی تشخیص نمی‌دهیم.



- **Transduction in taste receptors**

- **Occurs by several mechanisms**





Figure 49.14

پردازش اطلاعات حسی

با وجود یکسان بودن ماهیت پیام عصبی که از گیرنده‌های گوناگون بدن به دستگاه عصبی مرکزی می‌رسند، مغز چگونه آنها را به شکل‌های متفاوتی مانند صدا، تصویر، یا مزه تفسیر می‌کند؟ پیام‌هایی که هر نوع از گیرنده‌های حسی ارسال می‌کنند، به بخش یا بخش‌های ویژه‌ای از دستگاه عصبی مرکزی و قشر مخ وارد می‌شوند.

شکل ۱۴ مسیر ارسال پیام‌های بینایی را نشان می‌دهد. چلیپای (کیاسمای) بینایی که در فعالیت تشریح مغز آن را مشاهده کردید، محلی است که بخشی از آسه‌های عصب بینایی یک چشم به نیمکرهٔ مخ مقابل می‌روند. پیام‌های بینایی سرانجام به لوب‌های پس سری قشر مخ وارد و در آنجا پردازش می‌شوند. پیام‌های بینایی قبل از رسیدن به قشر مخ از بخش‌های دیگری از مغز مانند تالاموس می‌گذرند.



شکل ۱۴- مسیر پیام‌های بینایی


* طرح سؤال از این شکل مجاز نیست.

گفتار ۳ گیرنده‌های حسی جانوران

گیرنده‌های حسی انسان می‌توانند محرک‌های گوناگون محیط را دریافت کنند. اما محرک‌هایی مانند پرتوهای فرابنفش نیز وجود دارد که انسان به کمک دستگاه‌های ویژه‌ای می‌تواند آنها را دریافت کند؛ در حالی که برخی جانوران گیرنده‌های دریافت‌کننده آنها را دارند. در ادامه به برخی گیرنده‌های حسی در جانوران می‌پردازیم.

گیرنده‌های مکانیکی خط جانبی: در دو سوی بدن ماهی‌ها ساختاری به نام خط جانبی وجود دارد. این ساختار، کانالی در زیر پوست جانور است که از راه سوراخ‌هایی با محیط بیرون ارتباط دارد. درون کانال، یاخته‌های مژک‌داری قرار دارند که به ارتعاش آب حساس‌اند. مژک‌های این

یاخته‌ها در ماده‌ای ژلاتینی قرار دارند. جریان آب در کانال، ماده ژلاتینی را به حرکت در می‌آورد. حرکت ماده ژلاتینی، یاخته‌های گیرنده را تحریک می‌کند و ماهی به کمک خط جانبی از وجود اجسام و جانوران دیگر (شکار و شکارچی) در پیرامون خود آگاه می‌شود (شکل ۱۵).



شکل ۱۵- ساختار خط جانبی در ماهی

- **The lateral line system contains mechanoreceptors**
 - **With hair cells that respond to water movement**




Figure 49.12



گیرنده‌های شیمیایی در پا:

در مگس، گیرنده‌های شیمیایی در موهای حسی روی پاهای آن قرار دارند. مگس‌ها به کمک این گیرنده‌ها انواع مولکول‌ها را تشخیص می‌دهند (شکل ۱۶).


شکل ۱۶- گیرنده شیمیایی در مگس



گیرنده مکانیکی صدا در پا: روی هر یک از پاهای جلویی جیرجیرک یک محفظه هوا وجود دارد که پرده صماخ روی آن کشیده شده است. لرزش پرده در اثر امواج صوتی، گیرنده‌های مکانیکی را که در پشت پرده صماخ قرار دارند، تحریک و جانور صدا را دریافت می‌کند (شکل ۱۷).



گیرنده های نوری چشم مرکب: چشم مرکب که در حشرات دیده می شود، از تعداد زیادی واحد بینایی تشکیل شده است. هر واحد بینایی، یک قرنیه، یک عدسی و تعدادی گیرنده نوری دارد. هر یک از این واحدها تصویر کوچکی از بخشی از میدان بینایی را ایجاد می کنند. دستگاه عصبی جانور، این اطلاعات را یکپارچه و تصویری موزاییکی ایجاد می کند (شکل ۱۸). گیرنده های نوری برخی حشرات مانند زنبور، پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت می کنند.



- **Compound eyes are found in insects and crustaceans**

- **And consist of up to several thousand light detectors called ommatidia**

(a) The faceted eyes on the head of a fly, photographed with a stereomicroscope.



(b) The cornea and crystalline cone of each ommatidium function as a lens that focuses light on the rhabdom, a stack of pigmented plates inside a circle of photoreceptors. The rhabdom traps light and guides it to photoreceptors. The image formed by a compound eye is a mosaic of dots produced by different intensities of light entering the many ommatidia from different angles.





Figure 49.17a–b



گیرنده فروسرخ مار زنگی: برخی مارها می‌توانند پرتوهای فروسرخ را تشخیص دهند. همان‌طور که در شکل ۱۹ می‌بینید، در جلو و زیر هر چشم مار زنگی سوراخی است که گیرنده‌های پرتوهای فروسرخ در آن قرار دارند. به کمک این گیرنده‌ها، مار پرتوهای فروسرخ تابیده از بدن شکار را دریافت می‌کند و محل آن را در تاریکی تشخیص می‌دهد.





Many mammals appear to use the Earth's magnetic field lines

- To orient themselves as they migrate



Figure 49.5b

(b) Some migrating animals, such as these beluga whales, apparently sense Earth's magnetic field and use the information, along with other cues, for orientation.

گیرنده‌های مغناطیسی:

جانورانی مانند لاک‌پشت‌های دریایی که هنگام مهاجرت مسافت‌های طولانی را می‌پیمایند، گیرنده‌های مغناطیسی دارند که به کمک آنها جهت و موقعیت خود را به درستی تشخیص می‌دهند؛ زیرا الگوی میدان مغناطیسی زمین، در نواحی مختلف کره زمین متفاوت و تقریباً در طول زمان ثابت است و با تغییر آب و هوا و شب و روز تغییر نمی‌کند.

گیرنده‌های الکتریکی:

بسیاری از کوسه‌ها و برخی از پستانداران مانند پلاتی پوس (نوک اردکی)، گیرنده‌هایی دارند که میدان‌های الکتریکی را تشخیص می‌دهند. این جانوران از گیرنده‌های الکتریکی برای یافتن شکار و جهت‌یابی استفاده می‌کنند. برخی از ماهی‌ها برای ایجاد ارتباط با هم‌نوعان این گیرنده‌ها را به کار می‌برند.

- **One of the simplest is the eye cup of planarians**
 - **Which provides information about light intensity and direction but does not form images**





Figure 49.16

۱- طرح زیر مغز ماهی را نشان می دهد.



- لوب های (پیازهای) بویایی ماهی نسبت به کل مغز جانور از لوب های بویایی انسان بزرگ تر است.
 این مطلب چه واقعیتی را درباره حس بویایی ماهی نشان می دهد؟
 ۲- ساختار و عملکرد چشم مرکب و چشم انسان را مقایسه کنید.
 ۳- خط جانبی در ماهی ها با کدام ساختارها در انسان شباهت دارد؟

خدايا جهان پادشاهی تو راست
زما خدمت آید خدایی تو راست
پناه بلندی و پستی تویی
همه نیستند آنچه هستی تویی
همه آفریدست بالا و پست
تویی آفریننده هر چه هست