

## ریاضیات عمومی ۱


میان‌ترم دوم، ۱۳۸۹/۸/۲۰، زمان: ۹۰ دقیقه

(۱) فرض کنید  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  تابعی پیوسته و تناوبی با دوره تناوب  $2\pi$  است یعنی برای هر  $x \in \mathbb{R}$ ،  $f(x + 2\pi) = f(x)$ .

الف) نشان دهید  $a \in \mathbb{R}$  وجود دارد که  $f(a + \pi) = f(a)$ .

ب) اگر  $f$  مشتق‌پذیر باشد نشان دهید  $f'$  در هر بازه بسته به طول  $2\pi$  دست کم دو بار صفر می‌شود.

(۲)  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  دو تابع هستند که در نقطه  $a \in \mathbb{R}$  مشتق‌پذیرند،  $f(a) = g(a)$  و  $f'(a) < g'(a)$ . نشان دهید  $\delta > 0$  وجود دارد که برای هر  $h$  که  $0 < h < \delta$  داریم  $f(a + h) < g(a + h)$ .



(۳) در مثلث  $ABC$ ، طول بعضی از قطعات مربوط در شکل مشخص شده است. فرض کنید طول  $h$  در مقایسه با سایر طول‌های نمایش داده شده بسیار کوچک است. از روش تقریب خطی مقداری تقریبی برای سینوس زاویه  $BAC$  به دست آورید.

(سوالات نمره برابر دارند.)

دانشجویان عزیز،

- برای درخواست تجدید نظر نوشتن شماره صدلی در فرم مربوط ضروری است.
- برای مشاهده نتیجه امتحان و تجدید نظر به سایت درس ([math.sharif.edu/~calculus](http://math.sharif.edu/~calculus)) مراجعه کنید.
- برای دریافت اطلاعات راجع به فرآیند امتحان و ارائه پیشنهاد یا انتقاد در مورد کلاس‌های حل تمرین تنها از طریق ایمیل معرفی شده در سایت درس ([calculus1389@gmail.com](mailto:calculus1389@gmail.com)) اقدام کنید.

جوابها

الف) تابع  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  را به صورت  $g(x) = f(x+\pi) - f(x)$  تعریف می‌کنیم. چون  $f$  در  $[a, b]$  پیوسته است،  $g$  نیز پیوسته است. این تابع  $g$  در  $a$  مقدار  $g(a) = 0$  را می‌گیرد. نقطه  $a$  در  $\mathbb{R}$  به گونه‌ای قرار دارد که  $a \in [b, b+\pi]$  باشد.

$$g(b) = f(b+\pi) - f(b) = f(b+\pi) - f(b+\pi) = 0$$

بنابراین  $g$  در  $[a, b]$  پیوسته است و  $g(a) = g(b) = 0$ . بر اساس قضیه رول، در  $[a, b]$  نقطه  $c$  وجود دارد که  $g'(c) = 0$  است. این یعنی  $f'(c+\pi) = f'(c)$ .

ب) فرض کنید  $[a, b]$  بازه  $\pi$  طول است. اگر  $f(b) = f(a)$  که نیاز داریم بدان  $f$  در  $[a, b]$  پیوسته است و  $f(b) = f(a)$  و  $f'(c) = 0$  در  $(a, b)$  وجود دارد. اگر  $f(b) = f(a)$  و  $f'(c) = 0$  در  $(a, b)$  وجود دارد، پس  $f(a) = f(a+\pi)$  و  $f'(c) = 0$  در  $(a, a+\pi)$  نیز برقرار است.

در صورتی که  $f'(c) = 0$  در  $(a, b)$  و  $b < a < c < a+\pi < b+\pi$  باشد،  $f(a) = f(a+\pi)$  و  $f'(c) = 0$  در  $(a+\pi, a+2\pi)$  نیز برقرار است.

بنابراین  $f'(c) = 0$  در  $(a, a+\pi)$  و  $(a+\pi, a+2\pi)$  برقرار است.

$$f'(c-\pi) = 0 \text{ در } (a, a+\pi) \text{ و } f'(c) = 0 \text{ در } (a+\pi, a+2\pi)$$

$$f'(x+\pi) = f'(x) \text{ در } (a, a+\pi) \text{ و } (a+\pi, a+2\pi)$$

بنابراین  $f'(x+\pi) = f'(x)$  در  $(a, a+2\pi)$  برقرار است.

حالا فرض کنیم  $\phi(x) = g(x) - f'(x)$ . پس  $\phi(a) = 0$  و  $\phi(a+\pi) = 0$ . نشان می‌دهیم  $\phi(a) = 0$ .

$\delta > 0$  وجود دارد که برای هر  $h$  با  $0 < h < \delta$  داریم  $\phi(a+h) > 0$ . چرا که  $\phi(a) = 0$  و  $\phi(a) = 0$ .

پس برای هر  $h$  با  $0 < h < \delta$  داریم  $\phi(a+h) > 0$ .

$$0 < h < \delta \Rightarrow \left| \frac{\phi(a+h) - \phi(a)}{h} - \phi'(a) \right| < \epsilon$$

$$-\epsilon < \frac{\phi(a+h) - \phi(a)}{h} - \phi'(a) < \epsilon$$

$$0 < h < \delta \Rightarrow 0 \leq \phi(a) - \epsilon < \frac{\phi(a+h) - \phi(a)}{h}$$

بنابراین  $\phi(a+h) > \phi(a) - \epsilon$  و  $\phi(a+h) > 0$  در  $(a, a+\pi)$  برقرار است.  $\square$



$$\widehat{BAC} = \alpha + \theta(h)$$

$$f(h) = \sin(\alpha + \theta(h)) \stackrel{\text{تقریبی}}{\approx} f(0) + hf'(0) = \frac{r}{\delta} + hf'(0)$$

۳

$$f(h) = \sin\left(\alpha + \tan^{-1}\frac{h}{r}\right)$$

اولی

$$f'(h) = \cos\left(\alpha + \tan^{-1}\frac{h}{r}\right) \cdot \frac{\frac{1}{r}}{1 + \left(\frac{h}{r}\right)^2}$$

$$f'(0) = \cos\alpha \cdot \frac{1}{r} = \frac{r}{\delta} \cdot \frac{1}{r} = \frac{1}{\delta}$$

$$\sin(\alpha + \theta(h)) \approx \frac{r}{\delta} + \frac{1}{\delta}h$$

نهایی

$$\sin(\alpha + \theta(h)) = (\sin\alpha)(\cos\theta(h)) + (\cos\alpha)(\sin\theta(h))$$

دومی

$$= \frac{r}{\delta} \cdot \frac{r}{\sqrt{r^2+h^2}} + \frac{r}{\delta} \cdot \frac{h}{\sqrt{r^2+h^2}} \quad (*)$$

$$g(h) = (r^2+h^2)^{-\frac{1}{2}} \quad : \text{تقریبی} \quad (r^2+h^2)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{r^2+h^2}}$$

$$g(h) \approx g(0) + h \cdot g'(0), \quad g'(h) = \left(-\frac{1}{2}\right)(r^2+h^2)^{-\frac{3}{2}}(2h) = -h \cdot (r^2+h^2)^{-\frac{3}{2}}$$

$$g(h) \approx g(0) = \frac{1}{r} \Leftarrow g'(0) = 0$$

$$\sin(\alpha + \theta(h)) \approx \frac{r}{\delta} \cdot \frac{r}{r} + \frac{r}{\delta} \cdot \frac{h}{r} = \frac{r}{\delta} + \frac{h}{\delta}$$

نهایی

(توجه: از روش اولی و روش دومی هر دو نتیجه یکسان است. (\*))