

wikiAzmoon  
wikiazmoon.ir


622

F

نام

نام خانوادگی

محل اقامت



622F

عصر جمهوری  
۹۱/۱۱/۲۰

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلام ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

### آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۲

مجموعه مهندسی کشاورزی - دام و طیور

کد ۱۳۰۹

تعداد سوال: ۱۸۰

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زیان عمومی و تخصصی	۳۰	۱	۳۰
۲	زنیک و اسلام دام و طرح آزمایش‌های کشاورزی	۲۰	۳۱	۵۰
۳	بیوشیمی	۳۰	۶۱	۹۰
۴	تفصیل دام	۳۰	۹۱	۱۲۰
۵	پرورش دام و طیور	۳۰	۱۲۱	۱۵۰
۶	آناتومی و فیزیولوژی دام	۳۰	۱۵۱	۱۸۰

بهمن ماه سال ۱۳۹۱

استفاده از عاشقین حساب مجاز نمی‌باشد.



**Part A: Vocabulary**

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- Currently 80 percent of drugs are shot down in early clinical trials because they are not effective or are even \_\_\_\_\_.  
 1) intense      2) initial      3) toxic      4) prior
- 2- With such rapid advances in the field of human transplantation, researchers such as myself are now beginning to consider what some have previously \_\_\_\_\_ unthinkable: transplanting a human brain.  
 1) deemed      2) pursued      3) perplexed      4) excluded
- 3- Weather forecasters are a frequently humbled bunch. No matter how far their science advances, the atmosphere finds ways to \_\_\_\_\_ prediction.  
 1) underlie      2) defy      3) expose      4) strive
- 4- Many armed groups \_\_\_\_\_ mix with the population to avoid identification. Sometimes they actually use civilians as shields.  
 1) inherently      2) coincidentally      3) persuasively      4) deliberately
- 5- After receiving a phone call that a bomb had been planted somewhere in the hotel, Police ordered the \_\_\_\_\_ of the building.  
 1) resistance      2) evacuation      3) authority      4) invalidity
- 6- Cosmologists, however, can make \_\_\_\_\_ about the early universe based on the cosmic microwave background radiation, which was emitted about 400,000 years after the big bang.  
 1) concessions      2) ramifications      3) foundations      4) deductions
- 7- The fact that there are many earth-like planets in the universe supports the widely held view that life \_\_\_\_\_ the universe.  
 1) pervades      2) innovates      3) exemplifies      4) overlaps
- 8- Centuries before the development of effective cannons, huge artillery pieces were demolishing castle walls with \_\_\_\_\_ the weight of an upright piano.  
 1) estimations      2) ensembles      3) barricades      4) projectiles
- 9- People in their late 90s or older are often healthier and more \_\_\_\_\_ than those 20 years younger.  
 1) civil      2) durable      3) robust      4) concurrent
- 10- One of the first prominent geologists to raise concern that global warming might \_\_\_\_\_ a catastrophic collapse of the Antarctic ice cap was J. H. Mercer.  
 1) trigger      2) negate      3) exceed      4) replace

**Part B: Cloze Test**

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Our hunt for caloric restriction mimetics grew out of our desire to better understand caloric restriction's many effects on the body. Scientists first recognized the value of the practice more than 60 years ago, when they found that rats (11) \_\_\_\_\_ a low-calorie diet lived longer on average than free-feeding rats (12) \_\_\_\_\_. a reduced incidence of conditions (13) \_\_\_\_\_. What is more, some of the treated animals survived longer than the oldest-living animals in the control group. (14) \_\_\_\_\_ that the maximum life span (the oldest attainable age), not merely the average life span, increased. Various interventions, such as infection-fighting drugs, can increase (15) \_\_\_\_\_, but only approaches that slow the body's rate of aging will increase the maximum life span.

- 11- 1) feed      2) they were fed      3) fed      4) feeding
- 12- 1) to have      2) had      3) in having      4) and had
- 13- 1) in old age they became increasingly common  
 2) that become increasingly common in old age  
 3) becoming common in increasingly old age  
 4) they became in old age increasingly common
- 14- 1) which means      2) but means      3) it means      4) what it means
- 15- 1) the average time in survival population  
 2) a survival population average time  
 3) a population's average survival time  
 4) the survival time in average population



### Part C. Reading Comprehension

**Directions:** *Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3) or (4). Then mark it on your answer sheet.*

#### PASSAGE 1

Mastitis in dairy cattle is the persistent, inflammatory reaction of the udder tissue. Milk from cows suffering from mastitis has an increased somatic cell count. Mastitis occurs when white blood cells (leucocytes), are released into the mammary gland, usually in response to an invasion of bacteria of the teat canal. Milk-secreting tissue, and various ducts throughout the mammary gland are damaged due to toxins by the bacteria. Mastitis can also occur as a result of chemical, mechanical, or thermal injury. The mammary gland does not produce any milk. The udder sac is hard, tight, and firm. Mastitis is most often transmitted by contact with the milking machine, and through contaminated hands or materials. A good milking routine is vital. This usually consists of applying a pre-milking teat dip or spray, such as an iodine spray, and wiping teats dry prior to milking. The milking machine is then applied. After milking, the teats can be cleaned again to remove the growth medium for bacteria. A post milking product such as iodine-propelyne glycol dip is used, to act as a disinfectant and a barrier between the open teat and the bacteria in the air. Treatment is possible with long-acting antibiotics, but milk from such cows is not marketable until drug residues have left the cow's system. Antibiotics may be systemic (injected into the body), or they may be forced upwards into the teat through the teat canal (intramammary infusion). Cows being treated may be marked with tape to alert dairy workers, and their milk is syphoned off and discarded. Vaccinations for mastitis do exist, but as they only reduce the severity of the condition, and do not prevent new infection they should be used in conjunction with a mastitis prevention program.

**16. It is stated in the passage that.....**

1. an increased the somatic cell count results in severe mastitis
2. white blood cells are routinely released into the mammary gland
3. inflammatory reactions of the udder tissue are called mastitis
4. one way to prevent mastitis is by applying a pre-milking teat dip

**17. The passage mentions that (the).....**

1. mammary gland destroys the bacteria produced by toxins
2. mastitis can occur as a result of bacterial as well bacterial causes
3. mammary gland is linked to udder sac at several places
4. milk-secreting tissue is invaded by bacteria of the teat canal

**18. The passage points to the fact that.....**

1. iodine-propelyne glycol cannot be used during milking
2. teats should be regularly cleaned by the milking machine
3. the iodine spray wipes the teats dry prior to milking
4. the milking machine is the main source of teat contamination



**19. We understand from the passage that.....**

1. mastitis prevention programs should be used with new infections
2. vaccinations for mastitis is effective but can be quite expensive
3. mastitis treating antibiotics need not be injected into the body
4. antibiotics remain in the cattle's system for almost several days

**20. The word 'discard' in the passage (underlined) is closest to '..... away'.**

- |           |            |
|-----------|------------|
| 1. 'get'  | 2. 'throw' |
| 3. 'take' | 4. 'wash'  |

**PASSAGE 2**

Fog fever is a misnomer, since neither is it caused by fog, nor do sufferers have a high temperature. The scientific name is Acute Bovine Pulmonary Edema (ABPE). The condition occurs in hungry, typically adult cattle, having been fed on dried feed indoors, and then moved to foggage pasture (fast growing, lush pasture, with high protein levels). The cattle graze on the new feed, clinical signs begin within 1 – 14 days and death often follows within 2 to 4 days after the appearance of clinical signs. The condition can affect up to 50% of the herd, and around 30% of affected cattle may die as a result. A similar condition has been reported on a wide variety of grasses, alfalfa, kale, and turnip tops. The bovine experiences difficulty breathing and will do everything it can to ease this discomfort. It will try to stand with its airway as straight and extended as possible, raising its head and stretching its neck forwards. Breathing rate will increase as high as 80 breaths per minute. There may also be extension of the tongue, and drooling. The animal may grunt as it breathes and froth may form around the mouth as the condition progresses. Rectal temperature will be normal although some may show an elevated temperature from respiratory effort. There is little that can be done for affected cattle. The cattle should not be moved except on the advice of a veterinarian since stress will kill many less severely affected cattle. Ideally pastures should be used before they become overly lush and protein-rich. If this is not possible, introduce the new diet slowly, grazing the cattle just a few hours each day and increasing gradually, over a period of a fortnight.

**21. The passage points to the fact that.....**

1. the dried feed used for indoors comes from foggage pasture outdoors
2. hungry adult cattle which are fed on dried feed indoors have ABPE
3. it may take up two weeks before any sign of ABPE show itself in cattle
4. fog fever is followed by high temperature but is not related to fogs

**22. It is stated in the passage that the cattle affected with ABPE.....**

1. cannot have its head bent
2. can manage to ease its discomfort
3. moves its neck backwards and forwards
4. used to have 80 breaths per minute

**23. The passage suggests that hungry adult cattle, fed on dried feed indoors, and moved to foggage pasture afterwards should.....**

1. have its rectal temperature regularly examined
2. be moved on the advice of a veterinarian (for fear of cattle stress)
3. ideally graze on a pasture only after it is lush and protein-rich
4. reach their full grazing capacity only after two weeks



24. The passage does NOT include information on.....of fog fever.

1. treatment
2. cause(s)
3. prevention
4. clinical signs

25. The word 'grunt' in the passage (underlined) is based related to a case where the animal.....here.

1. uses its forelegs to ease its pain
2. lies down on the floor
3. makes sounds
4. moves anxiously about

### **PASSAGE 3**

In poultry keeping, yarding is the practice of providing the poultry with a fenced yard in addition to a poultry house. Movable yarding is a form of managed intensive grazing. Yarding is often confused with free range. The distinction is that free-range poultry are either totally unfenced, or the fence is so distant that it has little influence on their freedom of movement. Before the discovery of vitamins A and D in the 1920s, green feed and sunshine were essential to the health of poultry. Vitamin D was synthesized from sunlight on the skin (as with humans), while Vitamin A was obtained through green forage plants such as grass. Yards small enough to be fenced economically were soon stripped of palatable green forage and become barren. This is followed by a build-up of manure, parasites, and other pathogens. Free range husbandry was the most common method in these early days. Most farms had only a small free-range barnyard flock. Larger flocks were kept in small houses built on skids, which were dragged periodically to a fresh piece of ground. This method is similar to the modern practice of pastured poultry. Experts of the day estimated the sustainable level to be about fifty hens per acre ( $80\text{ m}^2$  per hen), with one hundred hens per acre ( $40\text{ m}^2$  per hen) as an absolute upper limit if special care was taken. These levels are sustainable in the sense that the turf can make use of the nutrients in the manure left behind by the chickens, and in the sense that, at this stocking density, the chickens will not completely destroy the turf through scratching.

26. The passage points to the fact that.....

1. free-range poultry do not feel the presence of the fence around them
2. totally unfenced chicken farming is actually the same as yarding
3. poultry is normally provided with a fenced yard as well as a poultry house
4. intensive grazing for the poultry consists mainly of movable yarding

27. We understand from the passage that.....

1. poultry should feed on vitamins D and A at the same time
2. vitamin A can be obtained from nearly any green plant
3. green feed and sunshine were essential to the health of poultry
4. yarding is a relatively new development in poultry keeping

28. The passage mentions that.....

1. modern practice of pastured poultry was somehow also practiced in the past
2. economical poultry yards are quickly stripped of palatable green forage
3. most sustainable farms have small free-range barnyard flock
4. large flocks of poultry should be dragged periodically to fresh pieces of ground

**29. The passage implies that it was not technically possible.....in the past**

1. destroy the turf completely (by chicken)
2. do mixed farming (of cattle and chicken)
3. keep over 100 hens in an acre of land
4. make use of the nutrients in chicken manure

**30. The passage can most logically be followed by.....**

1. the advantages of chicken farming on collective farms
2. a description of recent practice in poultry farming
3. how poultry is marketed and sold in developing countries
4. the diseases common in poultry farming today

**زنگنه و اصلاح دام و طرح آزمایش‌های کشاورزی**

-۳۱

علت تقاضوت ارزش اصلاحی فروزنده از میانگین ارزش اصلاحی والدین چیست؟

- (۱) اثر ترکیبی زن‌ها
- (۲) اثر مستقل زن‌ها
- (۳) اثر نمونه‌گیری مندلی
- (۴) تقاضوت عوامل محیطی

-۳۲

در کدامیک از حالات زیر تعداد نسل‌های لازم برای رسیدن جمعیت به تعادل بیشتر است؟

- (۱) دو جایگاه پیوسته وابسته به جنس
- (۲) دو جایگاه پیوسته انزوومی
- (۳) دو جایگاه مستقل وابسته به جنس
- (۴) دو جایگاه مستقل انزوومی

-۳۳

زن نهفته وابسته به جنس (k) باعث کاهش میزان رشد پرها اولیه در جوجه می‌گردد. اگر رشد پرها اولیه در سک درصد جوجه‌های ماده کند باشد انتظار می‌رود چند درصد از جوجه‌های نر، حامل آلل نهفته k باشند؟

- (۱) ۱
- (۲) ۲
- (۳) ۳
- (۴) ۴

-۳۴

وقتی که تعداد واحدهای آزمایشی همگن با محدودیت روبرو باشد، کدامیک از طرح‌های زیر برای اجرای آزمایش مناسب‌تر است؟

- (۱) مربع لاتین
- (۲) بلوک
- (۳) بلوک نافض
- (۴) چرخشی

-۳۵

اگر میانگین صفتی دارای توزیع نرمال ۱۵ کیلوگرم و واریانس ۴ کیلوگرم باشد، ۹۵ درصد از افراد در چه دامنه‌ای قرار می‌گیرند؟

- (۱) ۷ - ۱۱
- (۲) ۱۱ - ۱۹
- (۳) ۱۳ - ۱۷
- (۴) ۱۴ - ۲۰

-۳۶

چنانچه مقدار  $s_{y,x}$  و  $s_{y,y}$  به ترتیب برابر با ۴ و  $\frac{2}{25}$  باشد، مقدار ضریب همبستگی متغیر  $y$  و متغیر  $x$  چقدر است؟

- (۱) ۰/۲۵
- (۲) ۰/۵۰
- (۳) ۱
- (۴) ۲/۵

-۳۷

کدامیک از موارد زیر بیانگر خطای نوع اول و میزان احتمال بروز آن می‌باشد؟

- (۱) رد فرض درست  $H_0$
- (۲) قبول فرض درست  $H_0$
- (۳) رد فرض نادرست  $H_0$
- (۴) قبول فرض نادرست  $H_0$

-۳۸

بررسی اثر سه جیره غذایی به منظور افزایش تعداد تکرار آزمایش در قالب طرح مربع لاتین مکرر و با استفاده از سه مربع انجام شود. درجات آزادی مربع، تیمار، ستون در مربع و خطای آزمایشی به ترتیب چند می‌باشند؟

- (۱) ۶ و ۶، ۲، ۲
- (۲) ۱۰ و ۶، ۲، ۲
- (۳) ۸ و ۶، ۲، ۲
- (۴) ۱۰ و ۸، ۲، ۲

-۳۹

کدامیک از موارد زیر برای محاسبه خطای استاندارد میانگین‌ها استفاده می‌شود؟

$$S_{\bar{Y}} = \sqrt{\frac{S_Y^2}{n}} \quad (۱) \quad S_{\bar{Y}} = \sqrt{\frac{S_Y^2}{n}} \quad (۲) \quad S_{\bar{Y}} = \frac{S_Y^2}{\sqrt{n}} \quad (۳) \quad \frac{S_{\bar{Y}}}{n} = \sqrt{S_Y^2} \quad (۴)$$

-۴۰

در یک طرح بلوک تصادفی با چند مشاهده در هر واحد آزمایشی تعداد تیمارها برابر با  $t$  و تعداد بلوک‌ها برابر با  $s$  و تعداد نمونه برای هر واحد آزمایشی برابر با  $n$  باشد. خطای نمونه‌برداری و مجموع عribut واحدهای آزمایشی با استفاده از کدامیک از موارد زیر محاسبه می‌شوند؟

$$\frac{\sum y_{ij.}^2}{s} - CF \quad ts(t-1) \quad (۱) \quad \frac{\sum y_{ij.}^2}{t} - CF \quad (t-1)(s-1) \quad (۲)$$

$$\frac{\sum y_{ij.}^2}{t} - CF \quad (t-1)(s-1) \quad (۳) \quad \frac{\sum y_{ij.}^2}{s} - CF \quad ts(s-1) \quad (۴)$$

- در طرح آزمایشی کاملاً تصادفی، امید ریاضی میانگین مربعات تیمار کدام است؟  
 ۱)  $\sigma_e^2 + r\sigma_i^2$  (۴)      ۲)  $\sigma_e^2 + \sigma_i^2$  (۲)      ۳)  $\sigma_e^2 + \sigma_i^2 + \sigma_{ei}^2$  (۳)
- در چه موردی از تجزیه کوواریانس استفاده می‌شود?  
 ۱) حضور همزمان عامل قابل طبقه‌بندی و عامل همبسته در معادله مدل  
 ۲) حضور همزمان دو عامل طبقه‌بندی در معادله مدل  
 ۳) حضور دو عامل همبسته در معادله مدل  
 ۴) همه سه مورد
- اگر ویژگی مورد بحثی در بین افراد یک جامعه دارای تغییرات شدید باشد و بتوان جامعه را برای این ویژگی به گروه‌هایی تقسیم کرد، کدامیک از روش‌های نمونه‌برداری برای این جامعه مناسب‌تر است?  
 ۱) نمونه‌گیری غیرصادفی  
 ۲) نمونه‌گیری تصادفی منظم  
 ۳) نمونه‌گیری تصادفی ساده
- در خودکشی فردی با زنوتیپ **AaBbCCDd** چه نسبتی از نتایج دارای زنوتیپ **AABBCCeDd** خواهد بود?  
 ۱)  $\frac{1}{128}$  (۴) صفر      ۲)  $\frac{1}{64}$  (۲)      ۳)  $\frac{1}{32}$  (۱)      ۴)  $\frac{1}{2}$  (۱)
- کدام باز آلی از نوع پورینی است?  
 ۱) A (۱)      ۲) T (۲)      ۳) C (۲)      ۴) U (۴)
- اگر جمعیتی شامل **n** فرد باشد، در یک جایگاه لوکوسی بخصوص که جهش‌های زیادی در آن به وقوع می‌پیوندد احتمال یافتن چند نوع آل در آن وجود دارد?  
 ۱)  $\frac{n}{2}$  (۱)      ۲)  $\frac{n}{3}$  (۲)      ۳)  $\frac{n}{4}$  (۳)      ۴)  $\frac{n}{5}$  (۴)
- صفتی تحت تأثیر یک جایگاه زنی آنژوومی بوده و فراوانی ال **A** در جنسن تر و ماده به ترتیب ۹٪ و ۳٪ است.  
 فراوانی‌های زنوتیپی **A<sub>1</sub>A<sub>1</sub>**, **A<sub>1</sub>A<sub>2</sub>** و **A<sub>2</sub>A<sub>2</sub>** در زمان تعادل هارדי - واینبرگ به ترتیب از راست به چسب چقدر است?  
 ۱) ۵۰٪، ۴۹٪، ۴۲٪ (۱)  
 ۲) ۴۹٪، ۴۲٪، ۵۰٪ (۲)  
 ۳) ۴۸٪، ۴۶٪، ۵۱٪ (۳)  
 ۴) ۵۰٪، ۴۸٪، ۴۱٪ (۴)
- فراآنی‌الی **A<sub>2</sub>** در جمعیت اولیه و مهاجرت کننده که در تعادل هارדי - واینبرگ هستند به ترتیب ۶٪ و ۴٪ می‌باشد.  
 در صورتی که نسبت افراد مهاجرت کننده ۳٪ تعداد کل جمعیت باشد، فراآنی زنوتیپ **A<sub>1</sub>A<sub>2</sub>** در جمعیت اصلی (مخلوط دو جمعیت) کدام است?  
 ۱)  $\frac{۲۲}{۲۴}$ ٪ (۱)      ۲)  $\frac{۲۴}{۲۶}$ ٪ (۲)      ۳)  $\frac{۲۶}{۲۸}$ ٪ (۳)      ۴)  $\frac{۲۸}{۳۰}$ ٪ (۴)
- در یک جمعیت در تعادل (هارדי - واینبرگ) که فراآنی زنوتیپ هتروزیگوت (**AB**) دو برابر زنوتیپ هموزیگوت (**AA**) است، فراآنی دو آل **A** و **b** به ترتیب از راست به چب چقدر است?  
 ۱)  $\frac{۲۵}{۲۵}, \frac{۰}{۰}$ ٪ (۱)      ۲)  $\frac{۲۵}{۲۵}, \frac{۵}{۵}$ ٪ (۲)      ۳)  $\frac{۲۵}{۲۵}, \frac{۰}{۵}$ ٪ (۳)      ۴)  $\frac{۲۵}{۲۵}, \frac{۰}{۰}$ ٪ (۴)
- در تشخیص صفت واپسنه به جنس مغلوب پستانداران کدام گزینه صحیح است?  
 ۱) در ماده‌ها بیشتر بروز می‌گند.  
 ۲) در ارها بیشتر از ماده‌ها بروز می‌گند.  
 ۳) به پسران مادری که این صفت را ادارند منتفع نمی‌شود.  
 ۴) در همه فرزندان ماده‌ای که بدرشان دارای جنسن زنی باشد بروز می‌گند.
- اگر جمعیتی دارای ۱۰۰ فرد ناخالص (**Bb**) (هتروزیگوت) باشد و خودگشته در آنها صورت گیرد، در هرنسل چند درصد از آنها هتروزیگوس باقی‌مانده و بعد از چند نسل درصد هتروزیگوستی در آنها به ۶/۲۵ می‌رسد?  
 ۱) ۳ نسل (۱)      ۲) ۴ نسل (۲)      ۳) ۵ نسل (۳)      ۴) ۶ نسل (۴)
- کدامیک از روش‌های انتخاب زیر منجر به حداکثر شدن پیشرفت زنگنه از بعد اقتصادی می‌شود?  
 ۱) انتخاب چند صفتی به روش مرحله‌ای  
 ۲) انتخاب چند صفتی به روش شاخص انتخاب خانوادگی  
 ۳) انتخاب به روش شاخص انتخاب خانوادگی  
 ۴) انتخاب چند صفتی به روش حذف سطوح مستقل
- برای ارزیابی زنومی، کدامیک از موارد زیر مورد نیاز است?  
 ۱) زنگنه عمده  
 ۲) SNPs و رکوردهای عملکردی



- کدام یک از موارد زیر برای انتخاب جهت دار (Directional Selection) درست است؟

  - (۱) حیوانات دارای بیشترین و کمترین ارزش ارثی (BV) یا عملکرد انتخاب می‌شوند.
  - (۲) حیوانات دارای بیشترین ارزش ارثی (BV) یا عملکرد انتخاب می‌شوند.
  - (۳) حیوانات دارای ارزش ارثی (BV) یا عملکرد در حد میانگین جامعه انتخاب می‌شوند.
  - (۴) حیوانات بدون ارزش ارثی (BV) یا عملکرد انتخاب می‌شوند.

اگر در یک جمعیت دامی ۷۲۵ الفراد به عنوان والدین نسل آینده انتخاب شوند، اگر تعداد صفات مبنای انتخاب به ترتیب برای با یک و دو صفت باشند نسبت موقوت انتخاب ( $P_c$ ) به ترتیب از راست به چپ کدام می‌باشد؟

  - (۱) ۰/۲۵ (۲) ۰/۲۵ (۳) ۰/۵۰ (۴) ۰/۱۲۵
  - (۲) میانگین وزن ۴۲ روزگی در یک گله مرغ ۲۵۰۰ گرم است. میانگین وزن پرندگان انتخاب شده به عنوان مولد ۲۶۵۰ گرم و میانگین وزن نتاج حاصل از آنها ۲۵۴۰ گرم است. وراثت پذیری صفت وزن در این گله چقدر است؟
  - (۳) ۰/۳۵ (۴) ۰/۳۶۰
  - (۴) کوواریانس بین دو قلوهای حقیقی برابر با کدامیک از موارد زیر است؟
  - (۱) واریانس زنتکی (۲) واریانس زنتکی غایلیت (۳) واریانس زنتکی افزایشی (۴) واریانس زنتکی خیفرافایی
  - (۵) اگر در گلهای با میانگین ۷۰۰ لیتر شیر گاو در زایش‌های اول، دوم و سوم به طور میانگین ۹۰۰۰ لیتر شیر تولید نموده باشد، یا در نظر گرفتن ضریب تکرار پذیری و ضریب وراثت پذیری که به ترتیب برابر با ۰/۵۰ و ۰/۲۵ می‌باشد، میزان MPPA این گاو چند لیتر شیر است؟
  - (۶) ۱۵۰۰ (۷) ۱۰۰۰ (۸) ۷۵۰ (۹) ۵۰۰
  - (۱۰) در آمیزش دام تر با تعدادی حیوان ماده و اینکه هر دام ماده دارای تعدادی نتاج می‌باشد و با توجه به پارامترهای زنتکی و مؤلفه‌های واریانس، میزان وراثت پذیری او چقدر است؟
$$\hat{\sigma}_S^2 = ۳۰۰, \quad \hat{\sigma}_D^2 = ۳۵۰, \quad \hat{\sigma}_w^2 = ۲۲۰۰$$

$$۰/۲۴ (۱) \quad ۰/۲۱ (۲) \quad ۰/۴۸ (۳) \quad ۰/۴۲ (۴)$$

با توجه به پارامترهای زنتکی زیر، پاسخ همبسته (Correlated Response) تولید سالیانه ( $y$ ) از طریق انتخاب، برای پشم ناشور (GFW) چقدر است؟

二三

- |    |  |   |
|----|--|---|
| ۶۱ | منحنی تیتراسیون گلایسین دارای چند نقطه عطف است؟  | ۱) ۴<br>۲) ۳<br>۳) ۲<br>۴) ۱  |
| ۶۲ | گلیکوزن سنتاز، گلوکز را در فرم متصل به کدام نوکلئوتید دی فسفات موردنظر کاتالیز قرار می‌دهد؟  | UDP<br>GDP<br>ADP<br>CDP  |
| ۶۳ | گیرنده عامل آمین اسیدهای آمینه در هنگام سوختن کدام یک از موارد زیر است؟  | ۱) اسپارتات<br>۲) اگرالو اشت<br>۳) اسید گلوتامیک<br>۴) آلفا کتو گلوتارات                              |
| ۶۴ | در صورت اکسیداسیون روی کربن شماره ۶ گلوکز کدام ماده حاصل می‌شود؟   | ۱) سوربیتول<br>۲) اسید گلوکونیک<br>۳) اسید گلوکورونیک<br>۴) اسید ساکاریک                              |
| ۶۵ | کدام یک از ترکیبات زیر پیش‌ساز اسیدهای صفراءست؟  | ۱) کلسترول<br>۲) اسید لیپولیک<br>۳) اسید لینولیک<br>۴) استیل کوتزیم A                                 |
| ۶۶ | در هاربیج $\alpha$ چرخش حاصله در اثر پیوند هیدروژنی $\text{CO}$ اسید آمینه $\text{NH}$ با $\text{NH}$ اسید آمینه چند زنجیره پلی پیتیدی حاصل می‌گردد؟ | $\text{N} + ۵$<br>$\text{N} + ۴$<br>$\text{N} + ۳$<br>$\text{N} + ۲$                                  |
| ۶۷ | کدام یک از پیوندهای زیر در تشکیل ساختمان سوم بروتین مؤثر است؟  | ۱) دی سولفیدی<br>۲) فسفو دی اتری<br>۳) کووالانس<br>۴) گلیکوزیدی                                       |
| ۶۸ | کاهش سرعت آنزیم ممکن است به چه دلیلی رخ دهد؟   | ۱) افزایش سویسترا<br>۲) کم شدن سویسترا<br>۳) تخریب شدن آنزیم<br>۴) مهار سویسترا به وسیله افزایش محصول |

- بیوندهای شیمیایی کدام دو ترکیب مشابه یکدیگرند؟  
 ۱) مالتوز و امیلوز      ۲) سوبیوز و مالتوز  
 ۳) لاکتوز و مالتوز      ۴) ساکاروز و مالتوز
- ۶۹
- کدام ترکیبات زیر ساختار فسفولیپیدی دارند؟  
 ۱) لیستن و نربین ها      ۲) کولین و واکس ها  
 ۳) استنگومیلین و لیستین      ۴) لیبوکرومها و استرون ها
- ۷۰
- کدام ترکیب زیر واحد دو نوع بیوند گلیکوزیدی است؟  
 ۱) سولور      ۲) گنیکوز  
 ۳) کتین      ۴) آمیلوز
- ۷۱
- در مورد اسیدهای آمینه، کدام عبارت صحیح می باشد؟  
 ۱) در صفحات بتا، آلانین به قور دیده می شود.  
 ۲) در ساختار پروتئین های ترشحی سیستین فراوان نر دیده می شود.
- ۷۲
- ۳) پیوند هیدروپنی در مارپیچ آلفا بین یک باقیمانده و سومی می باشد.  
 ۴) اسیدهای آمینه نمی توانند در طول موج  $280\text{ nm}$  نالومتر جذب مؤثری داشته باشند.
- ۷۳
- کدام یک از موارد زیر جزء اصلی کرموموپلاست را تشکیل می دهد؟  
 ۱) نتاسته      ۲) پتاکاروتین      ۳) کلرونیل a  
 ۴) لیکوبین
- ۷۴
- کدام یک از اسیدهای آمینه زیر جزء اسیدهای آمینه بازی است؟  
 ۱) تروزین      ۲) لیزین      ۳) گلوتامین  
 ۴) فنیل الانین
- ۷۵
- گیاهان  $C_3$  برای جذب یک مولکول  $C_2$  به  $ATP$  نیاز دارند. (به ترتیب از راست به چپ)
- ۷۶
- ۱)  $5,3,2,5$       ۲)  $2,5,9,5$       ۳)  $2,5,4$       ۴)  $5,3,4,2$
- کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟  
 ۱) کاتالیزور، یک واکنش انرژی را به انرژی خواه تبدیل می کند.  
 ۲) کاتالیزور عمل تشکیل مواد حد واسط را کاهش می دهد.  
 ۳) کاتالیزور امکان رسیدن به مرحله انتقالی را بیشتر می کند.  
 ۴) تمام موارد صحیح می باشد.
- ۷۷
- چرخه کالوین ماهیتا مشابه کدام یک از مسیرهای بیوشیمیایی سلول می باشد؟  
 ۱) کرس      ۲) گلیکولیز      ۳) سترلیپید  
 ۴) پتاکسیداسیون
- ۷۸
- کدام دو ترکیب این مر هستند؟  
 ۱) گلوکز و گالاکتوز      ۲) گالاکتوز و مالتوز      ۳) مالتوز و فروکتوز  
 ۴) فروکتوز و گلوکز
- ۷۹
- چه یدیدهای از موارد زیر می توانند مولد ایزومری نوری جدید در قندها گردند؟  
 ۱) پلیمریزاسیون      ۲) استیلیزاسیون      ۳) آمین مربیزاسیون  
 ۴) گلیکوزیلیزاسیون
- ۸۰
- ترکیب  $D(-)2\text{-کتوگزوز}$  معادل کدام ترکیب شیمیایی زیر است؟  
 ۱) بتا، D(+)-کنوکو پیرانوز      ۲) آلفا، D(-)-کنوکو پیرانوز  
 ۳) آلفا، L(-)-فروکتو پیرانوز      ۴) فروکتو پیرانوز
- ۸۱
- کدام عبارت صحیح است؟  
 ۱)  $P_k$  همینه برابر  $P_I$  می باشد.  
 ۲)  $P_k$  همینه بزرگتر از  $P_I$  می باشد.  
 ۳)  $P_k$  نقطه مانی تغییرات  $P_H$  برای هر ماده است.  
 ۴)  $P_k$  نقطه ای از تغییرات  $P_H$  است که غلظت آسیون با بنیان قبلی برابر باشد.
- ۸۲
- اسید فیتائیک توسط واکنش های کاتابولیزه می گردد.  
 ۱) اکسیداسیون در میتوکندری      ۲) اکسیداسیون در برآکسی زوم  
 ۳) اکسیداسیون در برآکسی زوم      ۴) اکسیداسیون در میتوکندری
- ۸۳
- کدام یک از اسیدهای آمینه های زیر در داخل کبد تجزیه نمی شود؟  
 ۱) تریپتوфан      ۲) اوزین      ۳) لوسن  
 ۴) لزین
- ۸۴
- سنحش غیر مستقیم فعالیت آنزیم ها توسط کدام ترکیبات زیر راچ نر است؟  
 ۱) بیوتین و اسد لیبوتک  
 ۲)  $FADH^+$  و  $H^+$  و  $FAD$   
 ۳)  $NAD^+$  و  $H^+$  و  $NADH$       ۴)  $NADPA^+$  و  $H^+$  و  $NADP$
- ۸۵
- در مورد مهار کننده غیر رقابتی کدام عبارت صحیح است?  
 ۱)  $K_m$  افزایش می دهد.  
 ۲)  $V_{max}$  افزایش می باشد.  
 ۳) به جانبگاه فعل آنزیم متصل می شود.  
 ۴) با مجموعه ES واکنش می دهد.
- ۸۶
- در مرحله شروع سنتز پروتئین در باکتری چه عامل مانع از اتصال زیر واحد  $5^{\circ}S$  و  $3^{\circ}S$  قبل از بلوغ می شود؟  
 ۱)  $IF_3$       ۲)  $IF_2$       ۳)  $IF_1$       ۴)  $IF_4$



- سوکسینات دهیدروزنانز در بروکاریوت‌ها در اتصال محکم به ..... می‌باشد.
- (۱) غشاء پلاسمایی (۲) غشاء داخلی میتوکندری (۳) غشاء خارجی میتوکندری (۴) غشاء داخلی کلروبلاست استیل - کوآکربوکسیلاز در گیاهان توسط ..... فعال می‌شود.
- (۱) سیترات (۲) اسید pH (۳) کهتر استروما در جرخه نیتروژن ..... انجام می‌شود.
- (۱) تبدیل نیترات به  $N_2$  توسط گیاهان عالی (۲) نیتریپلکلسیون آمونیاک به نیترات توسط گیاهان عالی (۳) نیتریپلکلسیون آمونیاک به نیترات توسط نسانی موجودات زنده (۴) نیتریپلکلسیون آمونیاک به نیترات توسط موجودات زنده موجود در خاک کدام عبارت صحیح است؟
- (۱) FMN واحد حلقه ایزو-او-کسین است (۲) همه آنزیم‌ها سوستراز از نوع مواد آبی دارد (۳) برای بیانیش حالت کوآنزیم و بتامین بـ ATP خسروی است (۴) ترکیب دو جزء، کوآنزیم A از طریق اتصالات کربن‌های  $^3 \rightarrow ^5$  است.
- تغذیه دام**
- کدام یک برای بیان کربوهیدرات‌های غیر قابل هضم و یا کمتر قابل هضم طیور مناسب می‌باشد؟
- (۱) الاف خام (CF) (۲) بلی ساکاریدهای غیر لشاستای (NSP) (۳) الاف نامحلول در شوینده خشند (NDF) (۴) الاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF)
- کدام گزینه در مورد عبارت کلیت (**Chelate**) نادرست است؟
- (۱) اسید فاینک یک کلیت است (۲) به کمپلکس‌های آلبی عنصرهای معدنی اطلاق می‌شود (۳) گلوکورونولات‌ها جزو کلیت کنندۀ‌های قوی هستند (۴) آگلولات کلسیم از جمله کمپلکس‌های آلبی - فلزی نامحلول است.
- متداول‌ترین روش بیولوژیکی برای ارزشیابی کیفیت پروتئین‌ها در طیور کدام است؟
- (۱) نسبت باردهی بروتنین (PER) (۲) ارزش کل بروتنین (GPV) (۳) ارزش خالص بروتنین (NPV) (۴) صرف (استفاده) خالص بروتنین (NPU)
- کدام مورد جزء مواد ضد تغذیه‌ای موجود در کنجداله مذاب (**Rapeseed**) نمی‌باشد؟
- (۱) سیمانین (۲) اسیداوروسک (۳) گلوکورونولات‌ها (۴) آلفا - گالاکوزیدها
- کدام یک جزء مواد ضد تغذیه‌ای موجود در سویا نمی‌باشد؟
- (۱) اورهار (۲) لکتین‌ها (۳) بازدارنده تریپین (۴) تیامیناز
- کدام یک از غلات زیر بالاترین میزان ارزی قابل متابولیسم را دارد؟
- (۱) جو (۲) بولاف (۳) ذرت (۴) گندم
- استفاده از علوفه مرجوب در جیره غذایی آغازین گوساله‌های شتر خوار سبب توسعه بهتر ..... می‌شود.
- (۱) جسم شبک (۲) تراکم بیرونی شبک (۳) فحامت دیواره شبک (۴) ارتفاع برزهای شبک
- برای تأمین ۶۰ گرم پروتئین خام در جیره از جه مقدار اوره بر حسب گرم باید استفاده شود؟
- (۱) حدود ۱۰ (۲) ۲۳ (۳) ۲۰ (۴) ۲۰
- ورود اسید معدی و پیتیدها به داوزده سبب رها سازی چه هورمون‌هایی می‌شود؟
- (۱) لیبتین و بولوتین (۲) انسولین و کورتیزون (۳) کورتیکوسترونید و تیروکسین (۴) سکرین و کوله سیستوکینین
- NSP** موجود در گندم عمدتاً از نوع ..... می‌باشد.
- (۱) مانان (۲) گالاکتان (۳) بناگلوكان (۴) آریبوزالان
- در تشکیل میسل در روده مرغ برای جذب اسیدهای چرب اشباع بلند زنگیر ..... حائز اهمیت است.
- (۱) کلسرون (۲) فسفوپیدها (۳) لیدهای صفرایی و -۲-مونوگلیسرید
- شاخص فرآوری (**Processing Index**) در دانه غلات چیست؟
- (۱) نسبت اندازه قطعات دانه اولیه به دانه فرآوری شده (۲) میزان پراکن انداره ذرات دانه فرآوری شده (۳) نسبت چگالی دانه پس از فرآوری به چگالی دانه اولیه
- کدام اسید آهینه دارای سرعت جذب پایین می‌باشد؟
- (۱) گلیسین (۲) آریبین (۳) منیوتین (۴) آریزین



- در مسیر تخمیر کربوهیدرات‌ها توسط باکتری‌های شکمبه ترتیب کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) گلوکز - ۶ - فسفات، گلوکز - ۱ - فسفات، فروکتوز - ۶ - فسفات، بیرونات
  - (۲) گلوکز - ۱ - فسفات، گلوکز - ۶ - فسفات، فروکتوز - ۶ - فسفات، بیرونات
  - (۳) گلوکز - ۱ - فسفات، فروکتوز - ۱ - فسفات، فروکتوز - ۶ - فسفات، بیرونات
  - (۴) فروکتوز - ۶ - فسفات، گلوکز - ۶ - فسفات، گلوکز - ۱ - فسفات، بیرونات
- باکتری‌های شکمبه در تأمین چه ویتامین‌هایی مؤثر هستند؟
- A (۱) گروه (۲) گروه B C (۱) D (۲)
- کدام ترکیبات زیر هنگام مصرف کنجاله پنهان‌دانه سبب اختلال وضعیت تولید مثلی می‌شود؟
- (۱) اسید مالوایک و اسید استر کولیک
  - (۲) اسید سیانیک و اسید مالوایک
  - (۳) اسید ایزو پروپوئنیک و اسید ایزو بوتریک
  - (۴) اسید ایزو سیانیک و اسید ایزو پروپوئنیک
- کدام بخش گیاه در شناسایی گونه‌های گیاهی، مورد استفاده در تغذیه دام مؤثر است؟
- (۱) همی سلولز
  - (۲) پکتین
  - (۳) کوئین
  - (۴) آلکالوئیدها
  - (۵) پروپونات
  - (۶) کسیه
- کدام ماده ضد تغذیه‌ای سبب همولیز گلبول‌های قرمز در دام می‌شود؟
- (۱) تانن
  - (۲) اگزالات
  - (۳) سایپونین
- لاکتات در مسیر تولید کدام یک از اسیدهای چرب زیر تولید می‌شود؟
- (۱) استات
  - (۲) بوتیرات
  - (۳) ایزوپوتیرات
- کدام یک از عناصر ذبل در بروز بیماری انسفالو عالاتیا مؤثر است؟
- (۱) روی
  - (۲) گوگرد
  - (۳) فسفر
- ارزش بیولوژیکی یک پروتئین برابر ..... است.
- (۱) نسبتی از بروتئین هضم شده است که در بدن ابقاء می‌شود.
  - (۲) نسبتی از بروتئین مصرف شده است که در بدن ابقاء می‌شود.
  - (۳) نسبتی از نیتروژن مصرف شده است که در بدن ابقاء می‌شود.
  - (۴) حاصل ضرب مقدار نیتروژن در قابلیت هضم آن است.
- امروزه سومین اسید آمینه محدود گنتد در چیره طیور محسوب می‌شود؟
- (۱) آرژین
  - (۲) والین
  - (۳) ترتوپین
  - (۴) متیونین
- کدامیک از عناصر زیر عنصر ضروری بر مصرف برای پرندگان است؟
- (۱) کیالت
  - (۲) منزیم
  - (۳) مس
  - (۴) منگنز
- کدام یک از موارد زیر از باکتری‌یا باکتری‌های مقید دستگاه گوارش طیور محسوب می‌شوند؟
- (۱) لاکتو بسلوس و سالمونلا
  - (۲) کمبیلو باکتر و کلستریدیا
  - (۳) کمپیلو باکتر و لاکتو بسلوس
- کمود پروتئین در جوجه‌های گوشته و مرغ‌های تخم‌گذار موجب ..... چربی لاشه و ..... وزن تخم می‌شود.
- (۱) افزایش - کاهش
  - (۲) افزایش - افزایش
  - (۳) کاهش - کاهش
  - (۴) کاهش - افزایش
- معادل پروتئینی کدام یک از اسیدهای آمینه بیشتر است؟
- (۱) لیزین
  - (۲) ترتوپین
  - (۳) ایزو لیوسین
  - (۴) اسیدهای آمینه گوگرد دار
- مازاد کدام یک از اسیدهای آمینه سمعی تر است؟
- (۱) آرژین
  - (۲) متیونین
  - (۳) والین
  - (۴) لاکزین
- غلظت نیتروژن اورهای شیر (MUN) در چه شرایطی افزایش می‌یابد؟
- (۱) کاهش RDP جرمه
  - (۲) افزایش UDP
  - (۳) در فصل زمستان
- کدام ترکیب چربی سبب مهار بیشتر تخمیر الیاف گیاهی در شبکه می‌شود؟
- (۱) اسیدهای چرب هیدروزنه
  - (۲) اسیدهای چرب زنجیر بلند
  - (۳) اسیدهای چرب انساع
- گلوکز از چه مسیرهای غیر مستقیمی می‌تواند در بدن نشخوار کنندگان تولید شود؟
- (۱) تبدیل اسید پوتیک، تجزیه چربی‌ها، تجزیه فیر خام
  - (۲) تجزیه فندهای محلول، تبدیل استو اسٹیک، تجزیه ناسامه
  - (۳) تبدیل اسید اسٹیک، تبدیل اسید پوتیک، تبدیل اسید لیتوئیک
  - (۴) تبدیل اسید پروپوئنیک، دی آمینه شدن آمینواسید، مسر برگشتی گلیسرول به گلیسرول تری فسفات

- ۱۲۱- افزایش شدت تحریک نوری (از لحاظ مدت و شدت نور) در سن بلوغ جنسی در مرغ های عادر و نخم گذار موجب می شود.
- (۱) افزایش وزن نخم مرغ  
 (۲) افزایش تعداد نخم مرغ دو زرده  
 (۳) کاهش تعداد نخم مرغ دو زرده  
 (۴) کاهش وزن نخم مرغ دو زرده
- کدام یک از معماری های زیر برای ارزیابی عملکرد گله های مرغ مادر دقیق تر است؟
- (۱) مجموع تولید نخم مرغ به ازای هر مرغ در ابتدای دوره تولید  
 (۲) مجموع تولید جوجه به ازای هر مرغ در ابتدای هفته  
 (۳) مجموع تولید جوجه به ازای هر مرغ در ابتدای دوره تولید  
 (۴) مجموع تولید نخم مرغ به ازای هر مرغ در ابتدای هفت
- تلقیح مصنوعی در کدام یک از گله های زیر کاربرد داشته و مرسوم است؟
- (۱) لاین های مولد  
 (۲) تخم گذار تجاري  
 (۳) گله های مادر تخم گذار  
 (۴) گله های مادر گوشتی
- هدف از پرورش گله های مادر گوشتی چیست؟
- (۱) تکثیر تعداد و تلاش سویه ها  
 (۲) پیشید زنگنه کی جوجه های گوشتی از طریق نلاقی  
 (۳) استمرار انتخاب زنگنه کی اعمال شده در گله های لاین و اجداد  
 (۴) کدام یک از روش های تهیه مکابیکی در پرورش جوجه های گوشتی در ایران مرسوم است؟
- (۱) تولی فشار منبت  
 (۲) غرضی فشار منبت  
 (۳) عرضی فشار منبت  
 (۴) تولی فشار منبت
- مهترین صفتی که مورد توجه متخصصین اصلاح نژاد مرغ های نخم گذار بوده است، کدام است؟
- (۱) وزن نخم مرغ  
 (۲) درصد تولید نخم مرغ  
 (۳) درصد مواد جانبی نخم مرغ  
 (۴) کیفیت بوسته نخم مرغ
- در ارتباط با تشکیل پوسته نخم مرغ کدام گزینه نادرست می باشد؟
- (۱) روند تشکیل پوسته نخم به طور پوسته در سیاله رور صورت می گیرد.  
 (۲) فرآیند تشکیل پوسته نخم مخصوصاً در غده بوسته ساز انجام می گیرد.  
 (۳) وجود ذخایر کلسیمی در استخوان مدلاری برای تشکیل پوسته نخم ضروری است.  
 (۴) روند تشکیل پوسته نخم در شب هنگام که مرغ خوارکی مصرف نمی کند، متوقف می شود.
- در مرغ نخم گذاری که کلاج های ۹ روزه دارد (۹ روز نخم گذاری و ۱ روز توقف تولید نخم)، درصد تولید نخم ماهیاته چند درصد است؟
- |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| ۹۰ (۴) | ۸۵ (۳) | ۸۰ (۲) | ۷۵ (۱) |
|--------|--------|--------|--------|
- ۱۲۲- در نگهداری نخم مرغ، چنانچه عدت انباتداری طولانی شود، چه تغییراتی در وزن نخم مرغ و وزن مخصوص آن به وجود می آید؟
- (۱) وزن نخم مرغ و وزن مخصوص آن افزایش می باید.  
 (۲) وزن نخم مرغ و وزن مخصوص آن کاهش می باید.  
 (۳) وزن نخم مرغ افزایش و وزن مخصوص آن کاهش می باید.  
 (۴) وزن نخم مرغ کاهش و وزن بدن مرغ چند درصد می تواند باشد؟
- دو هنگام تولک بری اجباری گله های نخم گذار، حداقل کاهش وزن بدن مرغ چند درصد می تواند باشد؟
- |        |        |        |
|--------|--------|--------|
| ۲۰ (۲) | ۲۵ (۳) | ۳۰ (۴) |
|--------|--------|--------|
- ۱۲۳- در مرغ های عادر گوشتی، مرحله پیش از نخم گذاری (Prelayer) چه فاصله سنی را شامل می شود؟
- |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ۱۴ تا ۱۶ هفته | ۱۶ تا ۱۸ هفته | ۱۸ تا ۲۲ هفته | ۲۲ تا ۲۴ هفته |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
- لیبید موجود در زرده نخم مرغ عمدتاً از کدام نوع است؟
- (۱) تری گلبرید  
 (۲) کلسترول آزاد  
 (۳) گلکولیبد  
 (۴) کلسترول استریده
- کدام یک از عوامل زیر موجب ایجاد فشار استاتیک بر قدرت تهیه مکانیکی آشیانه طیور می شوند؟
- (۱) موانع ورود نور و عرض آشیانه  
 (۲) ارتفاع آشیانه و موانع ورود نور  
 (۳) موانع ورود نور و بدھای سلولزی خنک کننده  
 (۴) عرض آشیانه و بدھای سلولزی خنک کننده
- کدام مورد از عوامل محیطی زیر گمترین تأثیر را در پیدایش عارضه فشار خون دیوی در جوجه های گوشتی دارد؟
- (۱) ارتفاع محل  
 (۲) درجه حرارت سالن مرغداری  
 (۳) عایق پندی سالن مرغداری  
 (۴) فرم زرده
- برای جمع آوری مرغ در انتهای دوره پرورش، استفاده از کدام طیف نور توصیه می گردد؟
- (۱) آبی  
 (۲) سفید  
 (۳) قرمز  
 (۴) زرده
- سوم قارچی (مايكوتوكسین ها) در علوفه سبلو شده کپک زده سبب افزایش بروز کدام اختلال متابولیکی مداوم می شود؟
- (۱) کد جرب  
 (۲) برگشتنی شرдан  
 (۳) اسدوزس  
 (۴) کنوزس
- کدام دسته از باكتری ها در بروز نفخ مؤثر است؟
- (۱) بوتری و بیریوپیروسولونس  
 (۲) رومیتوکوس فلام فاسیتر  
 (۳) اسپریتوکوس بوس

- چرا مصرف زیاد تفاله چفتدر قند در جیره گاوهاش شیری سبب کاهش چربی شیر آنها می‌شود؟
- (۱) به علت کربوهیدرات محلول بالای آن و کمی فیبر موثر فیزیکی آن
  - (۲) به علت پروتئین خام کم آن
  - (۳) به علت مواد معدنی بالای آن
  - (۴) به علت پکین بالای آن
- کدام یک از اصلاحات زیر معادل گوشت بز است؟
- venison (۴)      chevon (۳)      mutton (۲)      veal (۱)
- متوسط افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک در بردهای پرواری نزد ها مختلف کشور به ترتیب از راست به چپ گرم و ... است.
- ۸ - ۳۰۰ (۴)      ۱۵ - ۲۵۰ (۳)      ۸ - ۱۸۰ (۲)      ۵ - ۱۵۰ (۱)
- بز نژاد لامانش **LaMancha** یک بز با خصوصیت ..... است.
- (۱) گوشتی      (۲) سری      (۳) گرگی      (۴) پوستی
- سریع ترین روش معمول جهت خشک کردن شیر در یک گله گاو شیری کدام است؟
- (۱) مخزن بخ (۴) بیچال      (۲) بیچال (۳) بلت کولر      (۴) فن جت
- برای جبران کاهش وزن بدن گاوهاش شیری در چه مرحله ای بهتر است این جبران توسط تغذیه بهتر صورت گیرد؟
- (۱) اوائل زایش      (۲) هنگام اوج شیردهی      (۳) هنگام خشک کردن گلو      (۴) پس از حداقل تولید شیر تا قبل از زمان خشک کردن
- گوساله ها با مصرف روزانه چند گرم خوراک آغازین می توانند از شیر گرفته شوند؟
- ۱۲۰۰ (۴)      ۷۰۰ (۳)      ۹۰۰ (۲)      ۵۰۰ (۱)
- جیره کامل یک راس گاو شیرده حاوی ۲۸ درصد **ADF** و ۱۸ درصد **NDF** براساس عاده خشک است. چنانچه این گاو روزانه ۴۰ کیلوگرم خوراک به صورت **As-fed** با رطوبت ۴۰ درصد مصرف کند روزانه چند کیلوگرم همی سلولز دریافت می کند؟
- (۱) ۱۶ (۴)      ۲۹ (۳)      ۲۷ (۲)      ۴/۳ (۱)
- آخرین مرحله زایمان طبیعی کدام است؟
- (۱) خروج حفت و پرده های جنبی      (۲) خروج گوساله      (۳) خروج مابعات رحمی
- منظور از عمل کراجینگ (Crutching) در پرورش گوسفند چیست؟
- (۱) آخنه کردن پرده های نر      (۲) قطع دم یا دنه پرده های نوراد
- (۳) جیدن پشم های الوده به مدفوع در نواحی پست ران ها و زیر دنبه
- (۴) جیدن پشم های اطراف پستان و اندام تناسلی میس قبل از زایمان
- چنانچه در فصل طبیعی آمیزش از همزمان کردن محلی برای بزها استفاده می شود ، تعدا مناسب بز ماده به ازای هر رأس بز نر چند است؟
- ۲۰ - ۲۵ (۴)      ۱۵ - ۲۰ (۳)      ۸ - ۱۰ (۲)      ۲ - ۵ (۱)
- عامل ایجاد بیماری تب بر فکی در گاو کدام است؟
- (۱) وبروس (۲) باکتری (۳) فارج (۴) پاکری
- در صد چربی و **SNF** شیر گاو در کدام فصل بیشتر است؟
- (۱) بهار (۲) نیسان (۳) پاییز (۴) زمستان
- ### آناتومی و فیزیولوژی دام
- گزینه صحیح درخصوص غشای پیش سیناپسی کدام است؟
- (۱) میلنی بوده و حاوی کانال های سدیمه است.
  - (۲) فاقد میلن بوده و فقط بوسیله کانال های سدیمه دپلاریزه می شود.
  - (۳) به جای کانال های سدیمه، کانال های کلسمی حسانی به نیاز دارد.
  - (۴) ممکن است عمل کانال های موجود در آن همانند غشای پس سیناپسی است.
- هر کدام از کلیه های مرخ توسيط ..... سرخگ، خون رسانی می شود.
- (۱) یک (۲) دو (۳) سه (۴) چهار
- ادم پدیده ای است که ..... رخ می دهد.
- (۱) در اثر سوء تغذیه شدید پروتئینی و به دنبال آن کاهش پروتئین های بلاسما
  - (۲) در اثر افزایش مصرف پروتئین و به دنبال آن افزایش پروتئین های داخلی سولی
  - (۳) در اثر افزایش مصرف پروتئین و به دنبال آن افزایش پروتئین های بلاسما
  - (۴) در اثر سوء تغذیه شدید پروتئینی و به دنبال کاهش پروتئین های مابع میان بافتی

- ۱۵۴

گزینه صحیح در خصوص اتفاق خون کدام است؟

- (۱) مکانیسم خارجی اتفاق با ناس خون با هر چیزی غیر از سلول‌های اندوتلیوم آغاز می‌شود.
- (۲) مکانیسم داخلی اتفاق در اثر آزاد شدن تروموبلاستین باقی آغاز می‌شود.
- (۳) مکانیسم خارجی در اثر ناس خون با سلول‌های غیر از سلول‌های بوشی رگ آغاز می‌شود.
- (۴) مکانیسم داخلی اتفاق با ناس خون با هر چیزی غیر از سلول‌های اندوتلیوم آغاز می‌شود.

- ۱۵۵

میزان یون کلسیم در ..... غلظت یون کلسیم در ..... است.

- (۱) خارج سلول زیاد، خارج سلول زیاد، خارج سلول زیاد، مایع بینلیزی کم
- (۲) داخل سلول زیاد، خارج سلول زیاد، داخل سلول بالا

- ۱۵۶

در درجه حرارت‌های پایین به علت وجود ..... می‌تواند سیالیت غشاء سلولی را حفظ کند.

- (۱) ماهی - اسیدهای چرب غیراشتعاب
- (۲) استانداران - فسفولیپیدها

- ۱۵۷

در مجموع حدود ..... درصد وزن بدن یک فرد بالغ آب است که به دو بخش داخلی سلولی، ..... درصد وزن

- (۱) بدن و خارج سلولی، ..... درصد وزن بدن تقسیم می‌شوند. (به ترتیب از راست به چپ)

(۱) ۳۰، ۳۰، ۳۰ (۲) ۴۰، ۴۰، ۴۰ (۳) ۴۰، ۴۰، ۷۰ (۴) ۴۰، ۴۵، ۷۰

- ۱۵۸

بیشترین کاهش فشار خون در گردش عمومی در ..... رخ می‌دهد.

- (۱) ونول‌ها (۲) مویرگ‌ها
- (۳) سرجگ‌های بزرگ (۴) آرتربول‌ها

- ۱۵۹

در خصوص چربی قهوه‌ای کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) اسیدهای چرب حاصل از لیپوئز در سلول‌های چربی قهوه‌ای از سلول خارج و در جاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(۲) لیپار حساس به هورمون تحت تأثیر این تقریباً تری‌گلیسرید را به اسیدهای چرب تبدیل و اسیدهای چرب در مستوکندری آکسید و مقدار زیادی حرارت تولید می‌شود

(۳) در سلول‌های چربی قهوه‌ای، قطرات چربی به میوت کوچک و متعدد می‌باشد

(۴) چربی قهوه‌ای غنی از مستوکندری است

- ۱۶۰

در اتفاقاً ..... طول ماهیجه ..... ولی فشار آن .....

- (۱) ایزوتونیک - ثابت - افزایش می‌باشد
- (۲) ایزومتریک - ثابت - کاهش می‌باشد
- (۳) ایزومتریک - ثابت - کوهنه - افزایش می‌باشد

- ۱۶۱

در خصوص سیستم عصبی اتونومیک کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) تمامی نرون‌های پیش گرمای کلینزیک هستند

(۲) گره اعصاب پاراسیمپاتیکی از انداز عمل کننده دور هستند.

(۳) اعصاب پیش گرمای سمعیانیکی از تاچیه بست و کمر از نخاع منتهای می‌گیرند.

(۴) در قلب گیرنده‌های ماسکارنیک و در دستگاه گوارش گیرنده‌های نیکوتینیک وجود دارد.

کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) هدایت و انتقال پیام در ماده سفید انجام می‌شود.

(۲) در ماده خاکستری تراکم اجسام سلولی وجود ندارد.

(۳) در نخاع ماده سفید در خارج و ماده خاکستری در داخل قرار دارد.

(۴) در مغز ماده خاکستری در خارج و ماده سفید در داخل فوار گرفته است.

کدام یک از موارد زیر سبب انبساط مجاري تنفسی می‌شود؟

- ۱۶۲

(۱) کلوفرین

(۲) بتا آدرنرژیکها

- ۱۶۳

زیر واحد آلفا در کدام هورمون‌های زیر یکسان است؟

- (۱) hCG، FSH، TSH، LH

(۲) TSH، hCG، eCG، انسولین

- ۱۶۴

کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) استروزون تعداد گیرنده‌های خودش را افزایش می‌دهد.

(۲) بروززرون تعداد گیرنده‌های خودش و نز گیرنده‌های استروزون را کاهش می‌دهد.

(۳) کمبلکس هورمون استرونیدی و گیرنده در شرایط سرما نز می‌تواند به داخل هسته منتقل شود

(۴) پس از اتصال LH به گیرنده‌اش، کمبلکس هورمون گیرنده علی فرآیند اینترنالیزیشن به داخل سلول منتقل می‌شود

- ۱۶۵

دیابت بی‌مزه به علت ..... و یا ..... به وجود می‌آید.

- (۱) کمبود انسولین یا لاسما - کمبود ADH

(۲) ترشح نشدن انسولین - کمبود گیرنده برای انسولین

- ۱۶۶

(۳) زیادی گلوکز در خون - کمبود انسولین یا لاسما

(۴) ترشح نشدن ADH - نبود گیرنده برای ADH

- ۱۶۷

از لحاظ شباهت بین توالی آمینواسیدهای هورمون‌های زیر کدام یک باقیه متفاوت است؟

- (۱) ACTH (۲) MSH (۳) TSH



- ۱۶۸ کدام هورمون به داخل سیستم باب ترشح نمی شود؟
- (۱) آنسولین (۲) گلوكاجون
- GH (۴) GHRH (۳) در خصوص عملکرد آنژیوتانسین II کدام گزینه نادرست است؟
- (۱) باعث تنفس آرتربولها می شود. (۲) ترشح رین را تحریک می کند.
- (۳) ترشح البوسترون را تحریک می کند. (۴) مرکز تنفسی را تحریک می کند.
- تستوسترون از تماشی مواد زیر به جز..... می تواند ساخته شود.
- (۱) استروزن (۲) برگنولون (۳) برزوسترون (۴) کلسزول
- در خصوص گلوکوگورتیکوئیدها کدام گزینه نادرست است؟
- (۱) در تولید سورفاکتانت (Surfactant) (۲) دخالت دارد.
- (۳) دارای اثرات خد التهابی هستند. (۴) حساسیت بافتها را نسبت به آنسولین افزایش می دهند.
- کدام یک مربوط به دستگاه گوارش نیست؟
- (۱) استنکتاوید (۲) حفره های بپرکان
- منبع اصلی تولید آنزیم های موجود در شیره معده سلول های ..... است و مهمترین آنزیم آن ..... است.
- (۱) لاریال - پیسوئن (۲) اصلی - پیسوئن (۳) Oxyntic - تریپسینوزن (۴) Chief - تریپسینوزن
- در خصوص وظیفه براق کدام گزینه نادرست است؟
- (۱) برای اندام حس چشمی اهمیت دارد. (۲) ترکیبات براق برای جمعیت میکروبی شکمبه اهمیت ویژه ای دارد.
- (۳) در حewanat اهلی حاوی آنزیم و ترکیبات باکتریوسانسیک است. (۴) در بعضی از حewanat ترشح براق به عنوان بخشی از استرانزی کنترل درجه حرارت مطرح است.
- در گاو **Maternal recognition of pregnancy** در روز ..... رخ می دهد.
- (۱) ۱۱ (۲) ۱۶ (۳) ۲۰ (۴) ۲۴
- گزینه صحیح در خصوص تشخیص آبستنی در گاو کدام است؟
- (۱) عدم بازگشت به فحلی قطعاً نشان دهنده آبستنی است. (۲) وجود جسم زرد بر روی تخدمان دلات بر آبستنی دارد.
- (۳) بایین بودن غلظت پروزوسترون شیر صد در صد نشان دهنده عدم آبستنی است. (۴) بالا بودن غلظت پروزوسترون شیر صد در صد نشان دهنده آبستنی است.
- در خصوص «شبکه پام پیشی فرم» کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) شبکه رگی است که بوسیله سیمارگ بینه در اطراف سرخرگ بینه در قطب دیستال بینه تشکیل شده است. (۲) شبکه رگی است که بوسیله سیمارگ بینه در اطراف سرخرگ بینه در قطب پروکسیمال بینه تشکیل شده است.
- (۳) شبکه رگی است که بوسیله سیمارگ بینه در اطراف سیمارگ بینه در قطب پروکسیمال بینه تشکیل شده است. (۴) شبکه رگی است که بوسیله سرخرگ بینه در اطراف سیمارگ بینه در قطب دیستال بینه تشکیل شده است.
- مانعنت از ترشح پرولاکتین در ..... موجب قطع تولید شیر نمی شود.
- (۱) خوک (۲) گوسفند (۳) گاو (۴) مادیان
- پس روی جسم زرد نشخوار کنندگان در اثر افزایش ..... و سیمس افزایش غلظت ..... درون سلولی آغاز می شود.
- (۱) PGF<sub>2α</sub>, کلسم (۲) PGE<sub>2</sub>, کلسم (۳) Prostanoids (۴) منیزیوم، منیزیوم
- در **Ovulatory Fossa** ..... دیده می شود.
- (۱) سگ (۲) گاو (۳) انسان (۴) اسب