

بسم الله تعالى

۱۳۹۶/۱۱/۰۶

تاریخ برگزاری:

آناتومی سر و گردن پزشکی نیمسال اول ۹۵-۹۶

عنوان آزمون:

۳۳

تعداد سوالات:

A

گروه آزمون:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

۱ - شکستگی جمجمه در Foramen rotundum که عصب درون آن را تحت فشار قرار می دهد، منجر به کدامیک از موارد زیر می شود؟

(ب) ناتوانی در باز کردن دهان

(د) اختلال در حس پلک تحتانی

(الف) ناتوانی در بستن دهان

(ج) اختلال در ترشح غده سایپ لینگوآل

۲ - تمام شریان های زیر به اسکالپ خونرسانی می کنند به جز:

Infratrocchlear (ب) Supraorbital (الف)

Superficial temporal (د) Post. Auricular (ج)

۳ - در قطع شدن عصب حنجره ای فوقانی، کدامیک از موارد زیر اتفاق می افتد؟

(ب) شل شدن تارهای صوتی

(د) گشاد شدن مدخل حنجره

(الف) گشیده شدن تارهای صوتی

(ج) تنگ شدن مدخل حنجره

۴ - تمام موارد زیر در ارتباط با زنجیره سمپاتیک گردنی درست است به جز:

(الف) گانگلیون تحتانی در جلوی زانده عرضی مهره C7 قرار دارد.

(ب) گانگلیون فوقانی بزرگترین گانگلیون این زنجیره است.

(د) عصب مهره ای از گانگلیون تحتانی منشا می گیرد.

(ج) این زنجیره در قدام غلاف کاروئید قرار دارد.

۵ - اگر شی تیزی ناحیه مثلث اکسی پیتال را پاره نماید، احتمال صدمه کدام عنصر تشریحی زیر وجود دارد؟

Digastric muscle (ب) Accessory nerve (الف)

Vertebral artery (د) Hypoglossal nerve (ج)

۶ - مصدومی دچار صدمه و پارگی آنسا سرویکال شده است، کدامیک از عضلات زیر در او فلح نمی شود؟

Sternohyoid (ب) Omohyoid (الف)

Thyrohyoid (د) Sternothyroid (ج)

۷ - کدامیک از شاخه های شریان ساپکلاوین در تغذیه خونی مناطق حیاتی مغز شرکت می کند؟

Costocervical (ب) Throcervical (الف)

Dorsal scapular (د) Vertebral (ج)

۸ - همه عناصر تشریحی زیر از مثلث ساب مندیبولار عبور می کنند به جز:

- | | | | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| Facial nerve
Submandibular duct | (ب)
(د) | Facial artery
Hypoglossal nerve | (الف)
(ج) |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|

۹ - کدامیک از عضلات زیر از تنہ اصلی عصب ماندیبولار عصب دهی می شود؟

- | | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------------|--------------|
| Lateral pterygoid
Temporalis | (ب)
(د) | Medial pterygoid
Masseter | (الف)
(ج) |
|---------------------------------|------------|------------------------------|--------------|

۱۰ - سلولهای اتموئیدال خلفی در حفره بینی باز می شود به.....

- | | | | |
|-------------------------------------|------------|--|--------------|
| Superior meatus
Semilunar hiatus | (ب)
(د) | Spheno-ethmoidal recess
Middle meatus | (الف)
(ج) |
|-------------------------------------|------------|--|--------------|

۱۱ - سطح خارجی عضله بوکسیناتور با تمام عناصر زیر مجاورت دارد به جز:

- | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|--------------|
| Facial artery
Masseteric nerve | (ب)
(د) | Parotid duct
Buccal branches of facial nerve | (الف)
(ج) |
|-----------------------------------|------------|---|--------------|

۱۲ - همه گزینه های زیر در مورد غده پاروتید درست است به جز:

- | | | | |
|---|------------|--|--------------|
| در جلو با راموس ماندیبول مجاورت دارد.
حس عمومی آن از طریق عصب اوریکولوتیپور ال تأمین می شود. | (ب)
(د) | عصب فاسیال از ضخامت این غده می گذرد.
ترشح آن توسط الیاف پاراسمپاتیک زوج ۷ تأمین می شود. | (الف)
(ج) |
|---|------------|--|--------------|

۱۳ - حس کدامیک از نواحی زیر به عصب زوج ۹ مربوط نمی شود؟

- | | | | |
|--|------------|---|--------------|
| حس مخاطی سلولهای هوایی ماستوئید
سطح داخلی پرده صماخ | (ب)
(د) | حس مخاطی نازوفارنکس
حس مخاطی شبپور استاش | (الف)
(ج) |
|--|------------|---|--------------|

۱۴ - کدامیک از عناصر زیر از عمق عضله هیوگلوبوس گذشته و وارد کف دهان می شود؟

- | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| Lingual artery
Submandibular duct | (ب)
(د) | Lingual nerve
Hypoglossal nerve | (الف)
(ج) |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|


۱۵ - نقش حرکتی کدامیک از عضلات زیر در ساختمان زبان صحیح نیست؟

- ✓) جنیوگلوبوس زبان را به پایین و عقب می کشد.
- | | |
|---|-------------------|
| الیاف عضله عمودی زبان را پهن می کنند.
الیاف عضله طولی فوقانی نوک و کتاره های زبان را به سمت کام می برند.
استیلوجلوبوس زبان را به بالا و عقب می کشد. | (ب)
(ج)
(د) |
|---|-------------------|

۱۶ - همه عناصر زیر در ضخامت چین آری اپیگلوت هستند به جز:

- | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|--------------|
| الیاف عضلانی تیروایپیگلوت
غضروف کونیفورم | (ب)
(د) | عضله آری اپیگلوت
رباط هیوایپیگلوت | (الف)
(ج) |
|---|------------|--------------------------------------|--------------|

۱۷ - باز شدن شکاف گلوت بیشتر به عمل کدامیک از عضلات حنجره بستگی دارد؟



(الف) Cricothyroid

(ج) Lat.cricoarytenoid

(د)

(ب)

(د)

۱۸ - تمامی عبارات زیر در مورد لایه سطحی فاسیای عمقی صحیح به نظر می رسد به جز:

- (الف) نسبت به عضله استرنوکلینید و ماستوئید دو لایه می شود.
- (ب) ورید ژوگولار خارجی نسبت به آن سطحی تر است.
- (ج) فاسیای پاروتید را تشکیل می دهد.
- (د) کف مثلث خلفی گردن را تشکیل می دهد.

۱۹ - کدامیک از عناصر زیر از جمله عناصر تشکیل دهنده مثلث کاروتید محسوب نمی شود؟

- (الف) عضله استیلوهیوئید
- (ب) بطن قدامی دیگاستریک
- (ج) کناره قدامی استرنوکلینید و ماستوئید
- (د) بطن فوقانی اموهیوئید

۲۰ - کدامیک از عبارات زیر در مورد شریان منترآل میانی صحیح به نظر نمی رسد؟

- (الف) از فورamen اووال به جمجمه وارد می شود.
- (ب) از حلقه ایجاد شده بوسیله ریشه های عصب اوریکولومپورال عبور می نماید.
- (ج) بزرگترین شاخه مربوط به اولين قسمت شریان ماگزیلاری است.
- (د) در طی شکستگی پتریون ممکن است پاره شده و خونریزی اکسٹرادرورال را ایجاد کند.

۲۱ - کدامیک از عبارات زیر در مورد رباط ها نادرست است؟

- (الف) رباط پتریکوماندیبیولار از هامولوس پتریکوئید به انتهای خلفی خط میلوهیوئید ماندیبیول متصل است.
- (ب) رباط استیلوهیوئید از زایده استیلوئید به انتهای شاخ کوچک هیوئید اتصال دارد.
- (ج) رباط اسفنوماندیبیولار از خار اسفنتوئید به سطح داخلی زاویه ماندیبیول متصل می شود.
- (د) رباط استیلومندیبیولار از زایده استیلوئید به سطح داخلی زاویه ماندیبیول متصل می شود.

۲۲ - کدامیک از عبارات زیر در مورد عضله پتریکوئید خارجی درست است به جز:

- (الف) با کشیدن فک به باز شدن دهان کمک می کنم
- (ب) از فوسا پتریکوئید منشاء می گیرد.
- (ج) عصب آن از شاخه ماندیبیول زوج ۵ تامین می شود.
- (د) به گردن کوندیل ماندیبیول چسبندگی دارد.

۲۳ - عضله کشنده پرده کامی از تمامی موارد زیر منشاء می گیرد به جز:

- (الف) شاخ بزرگ هایوئید
- (ب) Sphenoid spine
- (ج) Pharyngotympanic tube
- (د) Pterygoid fossa
- (ج) Scaphoid fossa

۲۴ - الیاف عضله کنستیریکتور فوقانی به کدامیک از بخش های زیر چسبندگی ندارد؟

- (الف) شاخ بزرگ هایوئید
- (ب) خط مایلوهایوئید ماندیبیول
- (ج) قاعده زبان
- (د) هامولوس پتریکوئید

۲۵ - شروع شریان سابکلاوین راست از کدامیک از موارد زیر است؟

- الف) در مقابل گردن اولین دند
ج) در پشت مفصل استرنوکلاویکولار
- (ب) در کنار داخلی عضله اسکالن قدامی
(د) در پشت غضروف دنده اول

۲۶ - کدامیک از موارد زیر با ششمین مهره گردنی مناسبتی ندارد؟

- الف) محل تبدیل حلق به مری همسطح این مهره است.
ب) محل تبدیل حنجره به نای همسطح این مهره است.
ج) شریان ورتبرال ابتدا به سوراخ زایده عرضی این مهره وارد می شود.
د) دو شاخه شدن کاروتید مشترک همسطح آن است.

۲۷ - کدامیک از عناصر زیر از حدفاصل اسکالن های قدامی و میانی عبور می کند؟

- الف) شریان ساپکلاوین و تننه عصبی برآکیال
ج) شریان ساپکلاوین و ورید ساپکلاوین
- (ب) ورید ساپکلاوین و تننه عصبی برآکیال
(د) شریان سوپرا اسکاپولارو عصب فرینیک

۲۸ - بوسیله اتوسکوپ پرده صماخ شخصی معاینه می شود، در کدام حالت می توان گفت که صندوق و پرده صماخ سالم است؟

- الف) ربع قدامی فوقانی مخروط نوری را منعکس نماید.
ج) ربع خلفی تحتانی مخروط نوری را منعکس نماید.
- (ب) ربع قدامی تحتانی مخروط نوری را منعکس نماید.
(د) ربع خلفی فوقانی مخروط نوری را منعکس نماید.

۲۹ - عضله رکابی در کدام دیواره صندوق صماخ قرار دارد؟

- الف) قدامی
ج) داخلی
- (ب) خلفی
(د) خارجی

۳۰ - کدامیک در مورد اعصاب چشم نادرست است؟

- الف) عصب انمونیدال قدامی در حس پوست بینی نقش دارد.
ب) عصب انمونیدال خلفی در حس مخاط سیتوس اسفنوئید نقش دارد.
ج) عصب لاقریمال با عصب زایگوماتیکوفاسیال پیوند می شود.
د) عصب تروکله آر از دیواره خارجی سیتوس کاورنوس عبور می کند.

۳۱ - در معاینه بالینی یک بیمار مشخص شد که وی قادر نیست که کره چشم خود را به سمت بالا بچرخاند، کدامیک از عضلات زیر در او فلچ است؟

- الف) Oblique Sup
ج) Oblique Inf
- (ب) Rectus Lat
(د) Rectus Inf

۳۲ - مربوط به کدامیک از لایه های زیر است؟ Lamina cribrosa

- الف) Ant. Part of sclera
ج) Ant. Part of retina
- (ب) Post. Part of sclera
(د) Post. Part of retina

۳۳ - کدامیک از عبارات زیر در مورد گانگلیون سیلیاری درست است؟

- الف) اعصاب پاراسمیاتیک توسط اعصاب سینه‌ای بلند به آن وارد می‌شود.
- ب) در طرف داخل عصب اوپتیک قرار دارد.
- ج) منشا، پاراسمیاتیک آن از عصب زوج هفتم صفری است.
- د) الیاف پس عقده‌ای آن نهایتاً به عضله‌ای حلقوی آریس می‌رود.