

گندم نان واریته سواسون (رقم FD فرانسوی) **soisson**

سال ثبت در فهرست ملی ارقام گندم : ۱۳۶۶

بر اساس آزمایشات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در ایستگاه های : ایستگاه های مختلف سرد سیر و معتدله کشور .

بررسی های میدانی موفق در کشتزارهای کشاورزان منطقه : ایستگاه های مختلف سرد سیر و معتدله کشور .

مناطق قابل توصیه : نواحی حوزه های کاربرد آزمایشات و بررسی های میدانی.

مناطق قابل توسعه : نواحی اقلیم مشابه با مناطق قابل توصیه .

خصوصیات :

تیپ رشد : نیمه زمستانه	مقاوت به زنگ زرد : نیمه مقاوم
پنجه دهی : خیلی خوب	مقاومت به زنگ قهوه ای : نیمه حساس
طول ساقه : متوسط	مقاومت به فوزاریوم خوشه : نیمه حساس
مقاومت به خوابیدگی : خوب	مقاومت به سپتریوز : نیمه حساس
طول خوشه : متوسط تا طویل	مقاومت به سفیدک سطحی : نیمه مقاوم
مقاومت به سرمای زمستانه : خیلی خوب	----

توصیه های زراعی:

تاریخ کاشت : در نواحی سردسیر نیمه مهر تا نیمه آبان – در نواحی معتدل اوایل آبان تا ۱۰ آذر.

میزان بذر : ۳۵۰ دانه در مترمربع در نیمه مهر که تا ۴۳۰ دانه در مترمربع در اواخر فصل کاشت افزایش می یابد.

نیازهای کودی :

این واریته بسیار کود پذیر است . نیاز کودی باید بر اساس نتیجه تجزیه خاک و با هدف برداشت حدود ۱۸ تن بایوماس (Biomass) معادل حدود ۹ تن دانه در هکتار در نقاط سردسیر حدود ۱۶ تن بایوماس معادل ۸ تن دانه در هکتار در نقاط معتدل تعیین می گردد.

چنانچه این مهم میسر نگردد ، توصیه های کلی زیر در نظر گرفته شود:

فسفر قابل جذب حداقل ۱۵ ppm

پتاس قابل جذب حداقل ۳۰۰ ppm

کود از ته به با توجه به زمان کاشت در نقاط مختلف :

نقاط معتدل			کود اوره (کیلو گرم د رهکتار)	زمان کاشت در نقاط سرد سیر			کود اوره (کیلو گرم د رهکتار)
آخر فصل	میان فصل	اول فصل		آخر فصل	میان فصل	اول فصل	
۷۰	۹۰	۱۰۰	قبل از کاشت	۶۰	۸۰	۱۰۰	قبل از کاشت
۷۰	۸۰	۸۰	سرک اول (نیمه اول اسفند)	۶۰	۷۰	۷۰	سرک اول (اواسط اسفند)
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	سرک دوم (اوایل اردیبهشت)	۱۰۰	۹۰	۹۰	سرک دوم (اواسط اردیبهشت)
۷۰	۶۰	۵۰	سرک سوم (اواخر اردیبهشت)	۸۰	۸۰	۸۰	سرک سوم (دهه اول خرداد)
۵۰	۵۰	۵۰	سرک اخر (در مرحله خمیری دانه)	۵۰	۵۰	۵۰	سرک اخر (در مرحله خمیری دانه)

مواد ریز مغذی : با توجه به بالا بودن PH اکثر مزارع ، مواد ریز مغذی مورد نیاز باید بصورت پاششی در مزارع در ۲ نوبت (نوبت اول در مرحله قبل از ظهور خوشه ، نوبت دوم پس از ظهور ۷۰ درصد خوشه ها) مورد استفاده قرار گیرد.

توصیه های حفاظتی :

- مبارزه با علفهای هرز به روال معمول در محل و به موقع انجام گیرد.

- برای اطمینان از حصول به عملکرد مطلوب و بمنظور جلوگیری از شیوع زنگ زرد و فوزاریوم خوشه ۲ بار سمپاشی ، یکبار قبل از تاریخ معمول ظهور زنگ زرد در مزرعه و یکبار هنگام خروج اولین خوشه ها از غلاف ضروری می باشد. ضمناً چنانچه فصل رشد برای شیوع بیماریهای برگی مانند سفیدک و سپتوریز مساعد باشد ، باید قبل از توسعه بیماری مبارزه شیمیایی صورت گیرد .

زنگ قهوه ای معمولاً به صورت محدود ظاهر می شود ولی چنانچه توسعه یابد و برگ پرچم را تهدید کند باید مبارزه شیمیایی انجام شود.

نیاز آبی :

نیاز آبی این واریته مشابه ارقام اصلاح شده ایرانی در مناطق تحت کشت می باشد.