

دانلود جزوه فارماکولوژی پرستاری با کیفیت بالا

[برای دانلود جزوه اینجا کلیک کنید](#)

عوارض جانبی:

سیستم اعصاب مرکزی: هیجان، عصبانیت

عصبی، عضلانی و اسکلتی: لرزش

تنفسی: عفونت مجاری تنفسی فوقانی، رینیت، برونکواسپاسم (تشدید بیماری های زمینه ای ریوی)، فارنژیت، تشدید آسم

قلبی عروقی: تاکی کاردی، افزایش فشارخون، درد قفسه سینه، ادم، انقباضات زودرس، ناراحتی قفسه سینه، گرگرفتگی، تپش قلب

سیستم اعصاب مرکزی: حرکات لرزش، سردرد، سرگیجه، بی خوابی، اضطراب، آتاکسی، افسردگی، خواب آلودگی، لرز شدید، اختلال صدا، بیش فعالی، کسالت، درد، میگرن، احساسات ناپایدار، خستگی، بی قراری

پوستی: افزایش تعریق، راش پوستی، کهیر، رنگ پریدگی

غدد درون ریز و متابولیسم: افزایش قندخون، دیابت ملیتوس

گوارشی: تهوع، استفراغ، طعم ناخوشایند در دهان، گاستروانتریت، افزایش اشتها، گاستروانتریت ویروسی، اسهال، باد گلو، نفخ، التهاب زبان، خشکی دهان، علائم گوارشی، سوء هاضمه، بی اشتها



ادراری تناسلی: عفونت مجاری ادراری، سختی در دفع ادرار



### سدیم کلراید:

محلول ایزوتونیک (4/5 درصد کلرور سدیم یا محلول نمکی نرمال) به عنوان جانشین شونده در حالاتی که با از دست رفتن کلرور سدیم یا آب بدن همراه است، مصرف می شود. محلول هیپرتونیک پنج درصد کلرور سدیم، در کمی سدیم و کلرور خون به علت از دست رفتن الکترولیت ها، رقیق شدن مایعات بدن به علت مصرف بیش از حد آب همچنین در درمان فوری تخلیه شدید نمک بدن به کار می رود.

عوارض جانبی: تب، عفونت در محل تزریق، ترومبوز وریدی یا التهاب ورید در محل تزریق ،



زیادی سدیم یا کلرور خون، نشئت محلول تزریقی به بافت های اطراف رگ و زیادی حجم خون با تزریق این دارو گزارش شده است.