

۱

چسبندگی

- نیروی راباش بین مولکول های یک ماده را چسبندگی می گویند

- نیروی راباش بین دو ماده متفاوت را چسبندگی سطحی می گویند

* هر دو این نیروها از جنس نیروها استرومغناطیسی هستند

- کشش سطحی مایع همان اثر چسبندگی در سطح یک مایع است. وجود ناخالصی در مایع

کشش سطحی را تعیین می کند. هر چه مایع بالا رود کشش سطحی کم می شود.


- اثر چسبندگی یک مایع از چسبندگی سطحی آن مایع با یک سطح بیشتر باشد مایع سطح خمیری شود

(همچون روی سکه) و اگر کمتر باشد مایع روی سطح خمیری شود (آب روی سکه)

- اثر چسبندگی سطحی در یک لوله باریک را اثر موئینگی می نامیم. در موئینگی سطح مایع در لوله موئین با سطح آزاد مایع متفاوت است.

- در موئینگی اثر چسبندگی سطحی مایع بیشتر باشد ارتفاع مایع در لوله موئین بیشتر از سطح آزاد

و برعکس است و اگر چسبندگی مایع کمتر باشد ارتفاع مایع در لوله موئین کمتر از سطح آزاد مایع و برعکس است.



- در موئینگی هر چه قطر لوله موئین کمتر باشد اثر موئینگی بیشتری شود و اختلاف سطح مایع داخل لوله با سطح آزاد مایع بیشتری شود.

فشار و ویژگی های ماده

مواد به سه حالت جامد، مایع و گاز وجود دارند.

① جامد: ذرات درجا خود ثابت هستند و فقط درجا خود ارتعاش دارند اما در مایع و گاز اگر اسر ذرات کاتوره ایست و ذرات به راحتی جا جایی شوند

② به دو دسته * بلور (بسیار منظم در اثر سرد کردن) و غیر بلور (مایع منجمد آنها) و * آمورف (بسیار نامنظم در اثر سرد کردن سریع مایع منجمد آنها)
تقسیم می شود

② مایع: ① تراکم نا پذیر است و به دلیل نیروهای بین مولکولی اینها زیاد (ر) ندارند
دلیل تراکم نا پذیری نیروهای رانشی در فاصله کم بین مولکول ها
دلیل نداشتن اینها زیاد نیروها جاذبه بین مولکولی در فواصل بیشتر است

③ گاز: ① تا آن حجم ظرف را اشغال می کنند و تراکم پذیر است
② جا جایی گازها از نگاه تراکم به نگاه کم تراکم است

* در سیالات (مایع و گاز) ذرات به طور نامنظم حرکت می کنند که این حرکت منظم پدیده خشن ناگوار
* فاصله بین مولکول ها در جامدات کمتر از مایعات و در مایعات کمتر از گازهاست (فاصله مولکول ها در مایعات تقریباً همان فاصله ی مولکول ها در جامدات است که تقریباً برابر است با فاصله ی مولکول ها در جامدات است)

۳

چگالی

جرم واحد حجم را چگالی می نامند

$$\rho = \frac{m}{V}$$

ρ : چگالی - $[kg/m^3]$ - واحدها دیر $[gr/cm^3]$ و $[gr/Lit]$

m : جرم $[kg]$

V : حجم $[m^3]$ - واحدها دیر $[cm^3]$ و $[Lit]$

$cm^3 = 10^{-6} m^3$ و $Lit = 10^{-3} m^3$

$\frac{gr}{Lit} = \frac{kg}{m^3}$ و $\frac{gr}{cm^3} = 10^3 \frac{kg}{m^3}$

① چگالی به جرم و حجم ماده وابسته نیست و برابرید ماده معلوم مقدار مشخصی است.

② چگالی اغلب مواد با افزایش دما (افزایش حجم) کاهش می یابد ولی بعضی اوقات مانند آب $4^{\circ}C$ تا $0^{\circ}C$ با افزایش دما، حجم کاهش و چگالی افزایش می یابد.

③ اگر جسم دارای حفره باشد:

حجم خفیه - حجم ظاهری = حجم ماده

④ اگر دو یا چند ماده با هم بصورت فیزیکی ترکیب شوند، چگالی مخلوط برابر است با:

$$\rho = \frac{m_1 + m_2 + \dots}{V_1 + V_2 + \dots} = \frac{\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2 + \dots}{V_1 + V_2 + \dots} = \frac{m_1/\rho_1 + m_2/\rho_2 + \dots}{m_1/\rho + m_2/\rho_2 + \dots}$$

۴

فشار

انرژی نیروی قائم بر یکای سطح است.

$$P = \frac{F_N}{A}$$

P: فشار [Pa] - واحدها در هر [atm] و [cmHg]
 F_N: نیروی عمودی [N]
 A: سطح مقطع [m²]

تبدیل واحدها: $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa} = 76 \text{ cmHg}$, $\text{Pa} = \frac{N}{m^2}$

* فشار محیطی نردوای است

$$P = \frac{F}{A} = \frac{mg}{A} = \frac{\rho V g}{A} = \rho g h$$

(I) فشار در جامدها

$F = mg$ در سطح افقی (الف)
 $F = mg \cos \alpha$ در سطح شیبدار (ب)

$m = \rho V$
 جرم و حجم

* اگر یک جسم جامد را از ابعاد مختلف روی یک سطح قرار دهیم فشار در حالتی که از بعد کوچکتر روی سطح قرار می‌گیرد بیشتر است.

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{A_1}{A_2}$$

* در مقابل استوانه‌ها، فشار مستقل از زاویه آنها است:

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{\rho_1 h_1 \cos \alpha_1}{\rho_2 h_2 \cos \alpha_2}$$

* در مقابل فشار در مقابل دایره:

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{\rho_1 a_1 \cos \alpha_1}{\rho_2 a_2 \cos \alpha_2}$$

۵

II فشار در مایع ها

$P = P_0 + \rho gh$ [Pa] فشار مایع در مایع ها
 ارتفاع مایع [m] h
 فشار هوا وارد بر سطح مایع P_0
 چگالی ρ [kg/m³]
 شتاب گرانش زمین g


$\Delta P = \rho g \Delta h$ اختلاف فشار

* باید بدانیم به ازای هر m ارتفاع، یک فشار $1 atm$ زیاد می شود.

* تمام نقاطی که از سطح آزاد یک مایع، عمق یکسان دارند، هم فشارند

* فشار در یک طرف استی از یک مایع فقط به ارتفاع مایع بستگی دارد نه شکل ظرف

* رابطه نیروی وارد بر یک طرف با وزن مایع (mg)



* هر سه شکل هم ارتفاع هستند در شکل ۱ نیروی وارد از دیواره ها به سمت بالا است و بنابراین نیروی کمتری به کف ظرف وارد می کنند در شکل ۲ نیروی وارد از دیواره ها کاملاً افقی است و مولفه قائم ندارد بنابراین نیرو با وزن مایع برابر است در شکل ۳ نیروی وارد از دیواره ها به سمت پایین است بنابراین نیروی بیشتری به کف ظرف وارد می شود.

در شکل ۱ نیروی وارد از دیواره ها کاملاً افقی است و مولفه قائم ندارد بنابراین نیرو با وزن مایع برابر است

در شکل ۲ نیروی وارد از دیواره ها به سمت پایین است بنابراین نیروی بیشتری به کف ظرف وارد می شود.

* اگر در یک ظرف با سطح مقطع ثابت تا ارتفاع h از یک مایع با چگالی ρ و مساحت قاعده A و مساحت جانبی A_2 برشگاه باشد:

$F = \rho gh A_1$ (فشار بر کف)
 $P = \rho gh$ (فشار وارد بر کف)
 $F = \frac{\rho gh A_2}{2}$ (فشار بر سطح جانبی)
 $P = \frac{1}{2} \rho gh$ (فشار میانگین وارد بر سطح جانبی)

۴

- ✓ وجود به سمت عمق مایع سُر بر روی فشار بیشتر خواهد شد.
- ✓ نیروی وارد از طرف مایع به طرف همواره به سطح عمود است.
- ✓ اگر فشار روی سطح مایع را با اضافه کردن ارتفاع مایع یا توسط نیروی خارجی افزایش دهیم، این افزایش فشار برای تمام نقاط پایین تر از آن نقطه خواهد بود.

- * اگر یک ظرف حاوی مایع با شتاب a به سمت بالا داشته باشد فشار عمق h از مایع:

$$P = \rho(g + a)h$$
- و اگر مایع با شتاب a به سمت پایین داشته باشد فشار عمق h از مایع:

$$P = \rho(g - a)h$$




II فشار در ظرفها

$$P = P_0 - \rho gh$$

فشار عمودی


* تقریباً به ازای هر 10 m به بالا برویم فشار هوا 1 mmHg کاهش می یابد.

- ✓ یک جبر برابر فشار حاصل از ستون قائم جیوه است به ارتفاع 76 cm که بر سطح دریاهای و اقیانوسها می خورد.
- گاز جیوه در زیر لوله آزمایش فشار آن از سطح گاز در مشص می خورد:





✓



$$\text{ارتفاع قائم} = d \sin \alpha$$

$$P_{\text{سطح}} = 75 \text{ cmHg}$$

$$P_{\text{تک}} = 75 - d \sin \alpha = 75 - \frac{25}{100} \times \frac{1}{2} = 74,87 \text{ cmHg}$$

* گاهی اوقات می‌توانیم برای محاسبه فشار داخل لوله آزمایش در صورتی که داخل آن جیوه وجود دارد از روابط زیر بهره بگیریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} P = P_{\text{سطح}} \pm h \quad (1) \\ P = P_0 + \rho gh \quad (2) \end{array} \right. \longrightarrow \begin{array}{l} \text{فشار در 1 بر حسب cmHg بدست می‌آید.} \\ \text{و فشار در 2 بر حسب Pa محاسبه می‌شود.} \end{array}$$

* اگر در لوله آزمایش فشار بخ سرد جیوه یا آبگرم را در آن رود که ارتفاع قائم همان 76 cm شود

* اگر در فشار بخ بجای جیوه از مایع دیگری استفاده کنیم خواهم راست:

$$P_1 = P_2 \Rightarrow \rho_1 g h_1 = \rho_2 g h_2$$

$$\xrightarrow[\text{توجه شده باشد}]{\text{این لوله صاف}} \underbrace{\rho_1 h_1 \sin \alpha_1}_{\text{جیوه}} = \underbrace{\rho_2 h_2 \sin \alpha_2}_{\text{مایع جدید}}$$

* باید فقط کنیم تمامی محاسبات حسب جیوه است. هر مایع جدید باید آن را در جیوه طبق رابطه بالا برودانیم


△

تعداد سیالات مخلوط‌نشده

① لوله‌های U شش:

حقیقاً حل مسائل نقطه‌ای از یک مایع که در یک سطح افقی قرار دارند و فشار یکسان دارند، به عنوان مایع قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر نقطه تعادلی در دو طرف لوله‌های U مایع باشد.




$$P_M = P_N$$

$$\downarrow$$

$$P = P_{\text{روغن}} + P_{\text{آب}} + P_{\text{جیوه}}$$

$$\Rightarrow \rho_{\text{روغن}} g h_1 = \rho_{\text{جیوه}} g h_2 + \rho_{\text{آب}} g h_3$$

$$\Rightarrow \rho_{\text{روغن}} h_1 = \rho_{\text{جیوه}} h_2 + \rho_{\text{آب}} h_3$$



$$P_A = P_B$$

$$\downarrow$$

$$P_{\text{هوا}} = \rho g h + P_{\text{جیوه}}$$

* در این شکل اگر مایع جیوه باشد مسئله نداریم ولی اگر مایع دیگری به جز جیوه بود، ابتدا بر اساس


رابطه $\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$ ارتفاع ستون جیوه را می‌یابیم و بعد در فرمول قرار می‌دهیم.



۹

(I) در بالا برجا هیدرولیکی، جابجایی و غنی و برر ما:

به صرف نیروی کم می توانیم نیروی بزرگی تحول ببندیم



$$\text{دائم} \Rightarrow \frac{F}{A} = \frac{f}{a}$$

$$\begin{cases} A = \pi R^2 = \frac{\pi D^2}{4} \\ a = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4} \end{cases}$$

شعاع: R, r
قطر: D, d

$$\frac{F}{D^2} = \frac{f}{d^2} \Rightarrow \frac{F}{R^2} = \frac{f}{r^2}$$

همچنین از نظر ارتفاع $\Rightarrow \frac{H}{a} = \frac{h}{A}$

H : ارتفاع به لایه های پایین تر
 h : ارتفاع به لایه های بالاتر