

برنامه ی پیشنهادی واکسیناسیون طیور گوشتی

ردیف	نوع واکسن	سن مصرف	روش مصرف
۱	گامبورو	روز اول	قطره چشمی - اسپری
۲	برونشیت	روز اول	قطره چشمی - اسپری
۳	نیوکاسل (b۱)	۷ تا ۸ روزگی	قطره چشمی - اسپری
۴	گامبورو	۱۴ روزگی	آشامیدنی
۵	نیوکاسل (لاسوتا)	۱۸ روزگی	آشامیدنی
۶	نیوکاسل (لاسوتا)	۲۸ روزگی	آشامیدنی

برنامه ی پیشنهادی واکسیناسیون طیور تخمگذار

ردیف	نوع واکسن	سن مصرف	روش مصرف
۱	مارک	یک روزگی	تزریق داخل عضله
۲	نیوکاسل b۱	سه هفتگی	آشامیدنی یا اسپری
۳	برونشیت عفونی	سه هفتگی	آشامیدنی یا اسپری
۴	نیوکاسل b۱	هفت هفتگی	آشامیدنی یا اسپری
۵	برونشیت عفونی	هفت هفتگی	آشامیدنی
۶	برونشیت عفونی	۱۴ هفتگی	آشامیدنی
۷	نیوکاسل	۱۴ هفتگی	آشامیدنی هر سه ماه تکرار می شود
۸	آبله	۱۰ - ۱۲ هفتگی	تزریق با سوزن دو سر

برنامه ی پیشنهادی واکسیناسیون طیور مادر گوشتی

ردیف	نوع واکسن	سن مصرف	روش مصرف
۱	مارک	یک روزگی	تزریق داخل عضله
۲	نیوکاسل b۱	سه هفتگی	آشامیدنی یا اسپری
۳	برونشیت عفونی	سه هفتگی	آشامیدنی یا اسپری
۴	نیوکاسل b۱	هفت هفتگی	آشامیدنی یا اسپری
۵	برونشیت عفونی	هفت هفتگی	آشامیدنی
۶	برونشیت عفونی	۱۴ هفتگی	آشامیدنی
۷	نیوکاسل	۱۴ هفتگی	آشامیدنی هر سه ماه تکرار می شود
۸	آبله	۸ الی ۱۴ هفتگی	تزریق با سوزن دو سر

جدول راهنمای مایه کوبی در گاو

نام واکنش	نام محلی بیماری	بهترین وقت مایه کوبی	دفعات تزریق	مقدار تزریق و محل تزریق	سن مناسب برای تزریق	طریقه مصرف و نگهداری	شکل بسته بندی	ملاحظات
تب بر فکی	طبقه ، طبقه ، داباء ، دهن زخمی	تمام فصول	هر چهار ماه یکبار	نسبت به جثه زیر جلد غیغب	از سه ماهگی به بالا ۲ تا ۵ سی سی	داخل یخ	مایع قرمز به رنگ روشن	بهتر است قبل از جفتگیری و بعد از زایش تزریق گردد
طاعون	گاو میری	تمام فصول	دو تزریق برای تمام عمر	زیر جلد گردن	یک تزریق بین ۳ تا ۶ ماهگی و یک تزریق بالای یکسال	داخل یخ	بصورت لیو فیلپزه همراه با حلال	
شاربن	کیسه کش	۱۵ اسفند تا آخر خرداد	هر ۱۰ ماه یکبار	زیر جلد گردن	از ۳ ماهگی تا د آخر عمر	دور از نور و گرما	محلول بیرنگ	
شاربن علامتی	قنبر	اول پاییز	یکبار در سال	نسبت به جثه زیر جلد گردن	از ۹ ماهگی تا پایان عمر	دور از نور و گرما	محلول زرد روشن	
توام شاربن علامتی و پاستور لوز	ابو حینر ابو جرز	اول پاییز	یکبار در سال	نسبت به جثه در زیر جلد گردن	از ۹ ماهگی تا پایان عمر	دور از نور و گرما	محلول زرد روشن	
بروسلوز گاوی اس-۱۹	بچه اندازی	فصل معین ندارد	یکبار در تمام عمر	زیر جلد استخوان شانه	۴ تا ۶ ماهگی	داخل یخ	سفید شیری رنگ	در گاوهایی استفاده شود که موارد مثبت در آنها یا گله های مجاور دیده شده است
توبرکولین آزمایشی سل گاوی		فصل معینی ندارد	هر سه ماه یکبار	بین جلدی در وسط گردن	از سه ماهگی	داخل یخ	نوع مرغی قرمز نوع گاوی زرد	