

دانلود جزوه کامل فارماکولوژی پرستاری

[برای دانلود جزوه اینجا کلیک کنید](#)

و به عنوان داروی کمکی در درمان مننژیت لیستریایی و سوزاک مصرف می شود. به علاوه، این دارو در درمان تب تیفوئیدی و نیز در پیشگیری از عفونت دندان‌های مصرف می شود.

عوارض جانبی:

سیستم اعصاب مرکزی: سردرد

111

گوارشی: اسهال، تهوع، استفراغ

ادراری تناسلی: عفونت ولوواژینال

سایر عوارض (درصد نامشخص):

قلبی عروقی: التهاب عروق ناشی از ازدیاد حساسیت

سیستم اعصاب مرکزی: آرتاسیون، اضطراب، تغییرات رفتاری، گیجی، سرگیجه، بی خوابی، بیش فعالی برگشت پذیر، تشنج

پوستی: فوران پوستول (اگزانتوماتوز پوستولی جنرالیزه حاد)، راش اریتماتوز ماکولوپاپولار، اریتم مولتی فرم، درماتیت اکسفولیاتیو، راش پوستی، سندرم استیونس جانسون، نکروز توکسیک اپیدرمال، کهیر



112

لووتیروکسین سدیم

لووتیروکسین برای تشخیص و درمان کم کاری تیروئید، پیشگیری و درمان گواتر و سرطان تیروئید و نیز بررسی عملکرد تیروئید به کار می رود.

عوارض جانبی:

عوارض جانبی گزارش شده، غالباً به علت ایجاد پرکاری تیروئید ناشی از دوز بالای درمانی می باشد.

قلبی عروقی: آنژین صدری، آریتمی قلبی، نارسایی قلبی، گرگرفتگی، افزایش فشار خون، افزایش نبض، سکنه قلبی، تپش قلبی، تاکی کاردی

سیستم اعصاب مرکزی: اضطراب، احساسات ناپایدار، خستگی، سردرد، عدم تحمل گرما، بیش فعالی، بی خوابی، تحریک پذیری، ضعف عضلات، عصبانیت، تومور کاذب مغزی (کودکان)

پوستی: ریزش مو، افزایش تعریق، راش پوستی

غدد درون ریز و متابولیسم: گواتر (اگزوفتالمی؛ در فرم وریدی)، اختلالات قاعدگی، کاهش وزن

گوارشی: کرامپ شکمی، اسهال، افزایش اشتها، استفراغ



111

دیدانوزین

دیدانوزین یک داروی ضد ویروسی و همچنین عفونت ویروسی نقص ایمنی اکتسابی (HIV) در بزرگسالان و کودکان بالای ۱ ساله میباشد.

عوارض جانبی:

اسهال ، سردرد ، احساس مریضی ، درد شکمی ، سوزن سوزن شدن دست و پاها ، احساس بی حسی(نوروپاتی)، احساس خستگی و ضعف ، بثورات پوستی(جوش های ریز پوستی)