

جزوه فارماکولوژی پرستاری

[برای دانلود جزوه اینجا کلیک کنید](#)

کلرپرومازین در اختلالات روانی نظیر اسکیزوفرنی، جنون، مانیا و نیز بصورت دارویی کمکی در درمان هیجان شدید و اختلالات روانی- حرکتی و نیز به عنوان ضد تهوع و درمان سکسکه شدید و پورفیری بکار میرود.

عوارض جانبی:

قلبی عروقی: الکتروکاردیوگرام غیرطبیعی (تغییرات غیر اختصاصی QT)، افت فشار خون وضعیتی، سنکوپ، تاکی کاردی

سیستم اعصاب مرکزی: ادم مغزی، علائم شبه کاتاتونی، سرگیجه، خواب آلودگی، دیستونی (انقباض غیرعادی)، واکنش خارج هرمی، هایپرپیرکسی (تب خیلی شدید)، سندرم نورولپتیک بدخیم، پارکینسونیسم، علائم سایکوتیک، بی قراری، دیس کینزی تاردیو (حرکات مکرر غیرارادی)، دیستونی تاردیو

پوستی: درماتیت تماسی، لوپوس اریتماتوز جلدی، حساسیت پوست به نور، پیگمانته شدن پوست

(خاکستری تیره)

غدد درون ریز و متابولیسم: افزایش وزن

گوارشی: آتونی (ضعف) کولون، یبوست، افزایش اشتها، تهوع، یبوست شدید، فلجی ایلئوم، خشکی دهان



آمی تریپتیلین

آمی تریپتیلین برای درمان بیماری افسردگی بخصوص وقتی که تسکین روانی مورد نیاز باشد و نیز شب ادراری کودکان تجویز میشود.

عوارض جانبی:

قلبی عروقی: اختلال در هدایت دهلیزی بطنی، آریتمی قلبی، کاردیومیوپاتی، حوادث عروق مغزی، تغییرات الکتروکاردیوگرام (غیراختصاصی)، ادم صورت، بلوک قلبی، افزایش فشارخون، سکنه قلبی، افت فشارخون وضعیتی، تپش قلب، سنکوپ، تاکی کاردی

سیستم اعصاب مرکزی: اضطراب، آتاکسی، اختلالات شناختی، اغما، گیجی، هذیان، دیس اورینتیشن (اختلال در تشخیص موقعیت)، سرگیجه، خواب آلودگی، سندرم ترک دارو (تهوع، سردرد، کسالت، تحریک پذیری، بی قراری، خواب و رویای آشفته، شیدایی، هیپومانیا)، دیس آرتری (گفتار فلجی)، تغییرات الگوی الکتروکاردیوگرام، هیجان، واکنش خارج هرمی (شامل