

دانلود جزوه فارماکولوژی پرستاری

[برای دانلود جزوه اینجا کلیک کنید](#)

گوارشی: بادکردن شکم، اسهال، تهوع، احساس بادکنک در شکم
ادراری تناسلی: پاپ اسمیر غیر طبیعی، واژینوز باکتریال، حساسیت به لمس در پستان، قاعدگی دردناک، درد پستان، عفونت مجاری
ادراری، خونریزی رحمی، خونریزی واژینال

تنوفیلین

تنوفیلین برای انسداد برگشت پذیر راههای تنفسی و آسم حاد مصرف می شود.

عوارض جانبی:

قلبی عروقی: فلوتر قلبی، تاکی کاردی

سیستم اعصاب مرکزی: سردرد، بیش فعالی (کودکان)، بی خوابی، بی قراری، تشنج، صرع پایدار (غیر تشنجی)

غدد درون ریز و متابولیسم: افزایش کلسیم خون (همزمان با بیماری پرکاری تیروئید)

گوارشی: رفلاکس (تشدید)، زخم گوارشی (تشدید)، تهوع، استفراغ

ادراری تناسلی: سختی در دفع ادرار (مردان سالمند مبتلا به پروستاتیتسم)، ادرار زیاد (گذرا)

عصبی، عضلانی و اسکلتی: لرزش



سایمتیدین

سایمتیدین در کوتاه مدت زخمهای فعال دوازدهه یا زخمهای فعال و خوش خیم معده، حالات مرضی ترشح بیش از حد اسید معده مانند سندروم زولینگر-الیسون، برگشت محتویات معده به مری و سایر مواردی که کاهش اسید معده برای آن مفید است، مانند جراحی دستگاه گوارش مورد استفاده قرار می گیرد.

عوارض جانبی:

سیستم اعصاب مرکزی: سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی

غدد درون ریز و متابولیسم: ژینکوماستی

کلیوی: افزایش کراتینین سرم



لوراتادین

لوراتادین در علامت رینیت آلرژیک ملتحمه، خارش، کهیر، عطسه و آب ریزش از بینی و همچنین در کاهش علائم ناشی از آسم آلرژیک مصرف می شود.

عوارض جانبی:

سیستم اعصاب مرکزی: سردرد، سدیشن، خواب آلودگی، خستگی، عصبانیت

گوارشی: خشکی دهان، درد شکمی، استفراغ، اسهال

عصبی، عضلانی و اسکلتی: هایپرکینزی عضلات

پوستی: راش پوستی

گوارشی: گاستریت، تهوع

ازدیاد حساسیت: واکنش ازدیاد حساسیت



111

کوئتیاپین

برای کنترل و بیماری های خلقی، نارحتی های اعصاب مانند شیذوفرنی، دوقطبی، مانیا یا افسردگی کاربرد دارد. عوارض جانبی: بیوست، مشکلات گوارشی، گیجی، اضافه وزن، تاری دید و خشکی دهان از عوارض معمولی این دارو است.



فنیل افرین

قطره فنیل افرین به عنوان گشادکننده سریع مردمک چشم و ضداحتقان چشمی و بینی مصرف می شود.

عوارض جانبی:

این دارو در صورت جذب سیستمیک می تواند موجب افزایش فشار خون، سرگیجه و افزایش غیر عادی تعریق و سایر علائم تحریک سمپاتیك گردد.



تیمولول

تیمولول در درمان گلوکوم ساده مزمن، گلوکوم با زاویه باز و افزایش فشار داخلی چشم به کار می رود.

عوارض جانبی:

چشمی: احساس سوزش چشم، سوزش چشم

قلبی عروقی: آنژین صدری، برادی کاردی، آریتمی قلبی، نارسایی قلبی، ایسکمی مغزی، حوادث عروق مغزی، لنگی، سردی اندام های انتهایی، ادم، بلوک قلبی، افزایش فشارخون، افت فشارخون، تپش قلب، پدیده رینود

سیستم اعصاب مرکزی: فراموشی، اضطراب، گیجی، افسردگی، دیس اورینتیشن (اختلال در تشخیص موقعیت)، سرگیجه، خواب آلودگی، تشدید میاستنی گراویس، توهم، سردرد، بی خوابی، عصبانیت، کابوس شبانه، خواب رفتگی اندام

پوستی: ریزش مو، تشدید پسوریازیس، زخم شبه پمفیگوس، ضایعات شبه پسوریازیس، راش پوستی، کهیر

غدد درون ریز و متابولیسم: افت قندخون (پنهان)، کاهش میل جنسی

گوارشی: بی اشتها، اسهال، سوء هاضمه، تهوع، خشکی دهان

ادراری تناسلی: ضعف جنسی، بیماری پیرونی، فیروز خلف صفاقی

ازدیاد حساسیت: آنژیوادم، واکنش ازدیاد حساسیت

عصبی، عضلانی و اسکلتی: لوپوس اریتماتوز سیستمیک

چشمی: التهاب پلک، افتادگی پلک، تاری دید، آب مروارید

112

لوپرامید

لوپرامید یک آنالوگ سنتتیک اوپوئید است که تحرک روده را مهار می کند و هم چنین باعث کاهش ترشحات معده روده ای می شود و به صورت خوراکی تحت عنوان داروی ضد اسهال در درمان کمکی اسهال حاد و مزمن کاربرد دارد و جهت کاهش حجم دفعی در کلوستومی و یا ایلئوستومی کاربرد دارد .

عوارض جانبی:

سیستم اعصاب مرکزی: سرگیجه

گوارشی: بیوست، کرامپ شکمی، تهوع



احتمال تحریک مخاط معده و ایجاد ناراحتی معده ، بی اشتهاپی ، تهوع و استفراغ با مصارف زیاد آن وجود دارد . در بیماران با اختلال کار کلیه ممکن است عوارض پوستی حساسیتی افزایش یابد. این دارو همچنین به دلیل داشتن دیفن هیدرامین می تواند عوارض ضد موسکارینی از خود نشان دهد.