

دانلود جزوه فارماکولوژی پرستاری با لینک مستقیم

[برای دانلود جزوه اینجا کلیک کنید](#)

زیادی منبذیم خون، تهوع ، استفراغ ، تشنگی، برافروختگی پوست، کاهش فشار خون، آریتمی ،اغماء ، تضعیف تنفسی، خواب‌آلودگی ، توهم، فقدان رفلکس تاندونی و ضعف عضلانی از عوارض جانبی این دارو هستند.



112

### نیتروگلسیرین:

این دارو برای پیشگیری و درمان آنژین صدری حاد و درمان آنژین صدری مزمن و درمان نارسایی بطن چپ مصرف میشود. نیتروگلسیرین تزریقی برای کنترل فشار خون حین بعضی از اعمال جراحی و برای کاهش خونریزی به داخل ناحیه جراحی

مصرف میشود. نیتروگلیسرین تزریقی به عنوان داروی کمکی در درمان نارسایی احتقانی قلب هر ماه با انفارکتوس حاد میوکارد مصرف میشود.

عوارض جانبی:

سیستم اعصاب مرکزی: سردرد

قلبی عروقی: افت فشارخون، سنکوپ، ادم محیطی

سیستم اعصاب مرکزی: سرگیجه، خواب رفتگی اندام

گوارشی: درد شکمی

عصبی، عضلانی و اسکلتی: ضعف

تنفسی: تنگی نفس، فارنژیت، رینیت

قلبی عروقی: برادی کاردی، تشدید آنژین صدری، گرگرفتگی، افت فشارخون وضعیتی

پوستی: افزایش تعریق

گوارشی: استفراغ

متفرقه: تحمل به دارو



111

### کلو پیدوگرل (پلاویکس):

مهارکننده تجمع پلاکتی.

الف- دارو به فرم پروفیلاکتیک در بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس با ریسک انفارکتوس میوکارد، سکته و بیماری های عروق محیطی تجویز می شود.

ب- کلو پیدوگرل به عنوان داروی کمکی همراه با آسپرین در بیماران با آنژین ناپایدار تجویز می شود.

